LES RALLIDÉS Petits et très discrets, les râles sortent peu de la végétation dense des marais et prairies de fauche. Plus faciles à détecter à la voix au printemps, ou en migration quand ils s'alimentent le soir en bord de roselière. Corps rond, ailes arrondies, pattes hautes avec des doigts très longs.

Râle d'eau *Rallus aquaticus*



IDENTIFICATION. 25 cm. Long bec recourbé, rouge à la base. Brun rayé de noir dessus, face et poitrine gris cendré, flancs barrés de noir et blanc, blanc sous la queue bien visible quand l'oiseau s'éloigne queue relevée. Jeune : gorge et cou crème, trait sourcilier marqué, mais bec long recourbé. Ailes courtes, tertiaires recouvrant les primaires. Se tient parfois dressé, corps en poire ; surpris, court pour regagner le couvert. **VOIX.** Raille râpeux descendant répété, très sonore, de plus en plus traînant, *crûuii crûûuii crûûûiii...* **HABITAT.** Roselières, marais, canaux, denses sous-bois humides, prairies et ronciers humides. **DISTRIBUTION.** Nicheur sédentaire dans les zones humides, absent des montagnes. Des migrateurs nordiques passent l'hiver chez nous.

Marouette ponctuée *Porzana porzana*



IDENTIFICATION. 21 cm. Comme le Râle d'eau mais bec court, conique et droit, à base rouge épaisse. Dessus brun rayé de noir peu moucheté de blanc, poitrine brun-gris ponctuée de blanc, face grise avec joue brune, flancs finement barrés de brun, blanc et noir. Tertiaires barrées de blanc, primaires cachées sous tertiaires. **VOIX.** Chant : *ouit* claquant comme un coup de fouet, sonore, répété toutes les secondes. **HABITAT.** Roselières à Carex et prairies humides, phragmitaies en migration. **DISTRIBUTION.** Nicheuse localisée, en petit nombre dans les grandes zones humides. Migratrice, présente de mars à septembre, passe l'hiver au Sahel.

R Marouette poussin *Porzana parva*

IDENTIFICATION. 18 cm. Plus petite et élancée que la M. ponctuée, ailes et projection primaire longues, base du bec rouge, sous-caudales barrées de noir et de blanc. Mâle : dessous gris-bleu jusqu'aux pattes, dessus brun terne avec bretelles noires, peu marqué de blanc. Femelle : face grise, gorge et cou crème, flancs chamois, seules les sous-caudales sont barrées. Jeune semblable mais flancs barrés. **VOIX.** Chant : des *coua* répétés lentement puis rapidement en phrases parfois interminables. **HABITAT.** Vieilles roselières (phragmitaies) sur étangs peu profonds. **DISTRIBUTION.** Nicheuse très rare et localisée, quelques couples seulement ; plus commune en Europe orientale. Migratrice, présente de mars à septembre.

R Marouette de Baillon *Porzana pusilla*



IDENTIFICATION. 17 cm. Plus petite et ronde que la M. poussin, ailes courtes, projection primaire très courte, flancs barrés et bec vert sans rouge à la base. Adulte : dessous gris-bleu, dessus brun-roux rayé de noir et marqué de fins traits blancs ; flancs barrés de noir et de blanc du dessus des pattes aux sous-caudales. Femelle à peine plus terne, parfois gorge pâle et tache brune à la joue. Jeune brun grisé dessous, barré jusque sur la poitrine. **VOIX.** Chant long, crépité, répété, rappelant la Grenouille verte, dure quelques secondes. **HABITAT.** Prairies humides, inondables, avec peu d'eau, cariçaies ; phragmitaies en migration. **DISTRIBUTION.** Nicheuse très rare redécouverte dans les basses vallées angevines. Présente d'avril à septembre, passe l'hiver au Sahel.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*



IDENTIFICATION. 18 cm. Bec long, grosse tête et queue très courte. Dessus bleu métallique, dessous orange. Ailes bleu plus sombre, calotte finement barrée de noir. Joue orange, large moustache bleue. Bec tout noir (mâle) ou à base rouge (femelle). Souvent perché bas au-dessus de l'eau, à l'affût de petits poissons ; vol bas, direct, très rapide. **VOIX.** Cri suraigu et perçant, long *tsîîîîîî*. **HABITAT.** Plans d'eau, rivières, fleuves, avec des berges de terre pour creuser le terrier de nidification. **DISTRIBUTION.** Sédentaire partout mais absent des montagnes ; migrateurs nordiques hivernant en France ; fuit le gel en hiver.

Huppe fasciée *Upupa epops*



IDENTIFICATION. 27 cm. Taille d'un merle, corps beige orangé, manteau et ailes à larges barres noires et blanches, queue noire barrée de blanc. Plumes de la calotte longues, à pointe noire, formant une longue huppe, dressée quand l'oiseau est inquiet. Long bec recourbé, pattes courtes ; oiseau terrestre marcheur, se perche aussi sur les branches. Vol papillonné ondulé, ailes très rondes. **VOIX.** Chant : *oup-oup-oup* flûté, en une seconde, répété. **HABITAT.** Bocages, haies en milieu agricole, sous climat chaud. Se nourrit en sondant le sol avec son bec. **DISTRIBUTION.** Commune au Sud, présente dans les plaines agricoles de l'Ouest, rare sur la frange nord (de la Bretagne au Nord), plus localisée dans le Centre.

Rollier d'Europe *Coracias garrulus*



IDENTIFICATION. 31 cm. De la taille du Choucas, bleu avec lores noirs et manteau roux. Rémiges noires, larges coins bleus à la queue. Gros bec noir, épais. Jeune plus terne avec poitrine striée. Pattes courtes ; souvent perché sur un fil ou une branche nue. Battements d'ailes papillonnés. **VOIX.** Croassement rauque, *rak-ac*. **HABITAT.** Milieux ouverts et riches en gros insectes, avec de grands arbres à cavité pour nicher. **DISTRIBUTION.** Frange méditerranéenne.

Guêpier d'Europe *Merops apiaster*

IDENTIFICATION. 27 cm. Élancé, bec long peu recourbé, queue avec filets centraux chez l'adulte. Très coloré : gorge jaune, bandeau noir sur l'œil, dessous turquoise, couvertures alaires, calotte et manteau rouille. Mâle : filets plus longs et coloration plus intense. Jeune terne, verdâtre dessus avec épaules pâles, gorge jaune. Souvent perché bien en vue. **VOIX.** Cri : *prruuu* roulé, émis en chœur en vol, même haut dans le ciel. **HABITAT.** Milieux ouverts riches en insectes, avec perchoirs dégagés et talus sableux pour creuser les terriers de nidification. **DISTRIBUTION.** Moitié sud, plus abondant en région méditerranéenne, dans les vallées du Rhône et de la Garonne. Rare plus au Nord.

R Guêpier de Perse *Merops persicus*



30 cm. Migrateur égaré très rare, originaire d'Afrique du Nord et d'Asie centrale. Adulte vert gazon avec trait loral noir entouré de bleu azur, menton jaune et gorge rouge ; dessous de l'aile orange, bord de fuite de l'aile noir de largeur constante. Jeune plus terne.

LES BERGERONNETTES Proches des pipits, mais manteau non rayé, dessous non rayé, une longue queue souvent balancée ou hochée, noire à bords blancs. Marche sur le sol, vol ondulé. Forme des dortoirs en migration et en hiver.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*



IDENTIFICATION. 17 cm. Mâle jaune vif dessous, femelle jaune pâle avec ventre blanc. Dos vert olive, ailes noires avec larges franges blanches ou crème sur tertiaires et grandes couvertures. Le motif de la tête varie entre les races, celui de la femelle rappelle celui du mâle. Jeune plus terne, poitrine lavée de chamois avec taches noires ; parfois très gris, mais jaune au moins sur les sous-caudales. **VOIX.** Cri : *tsuip* montant, fluide. Chant : répétition lente et décousue de sons rappelant le cri, depuis un perchoir, une clôture, une plante haute. **HABITAT.** Zones humides, fossés des prairies humides, roselières, mais aussi zones agricoles, colzas et pâtures. **DISTRIBUTION.** Migratrice, passe l'hiver en Afrique. En été possible partout, sauf en montagne. **VARIATIONS GÉOGRAPHIQUES ET SOUS-ESPÈCES**. Séparées par des zones d'hybridation où les intermédiaires sont fréquents. Race *flava* en zone continentale (tête gris cendré, sourcil blanc, gorge jaune) ; race *flavissima* en Normandie, Bretagne, Nord (calotte et joues vert olive, sourcil et gorge jaunes, parfois tête presque toute jaune) ; race *cinereocapilla* dans le Sud-Est et en Camargue (tête gris foncé, gorge blanche) ; race *iberiae* près de l'Espagne (tête gris foncé, sourcil blanc, gorge blanche) ; race scandinave *thunbergi* en migration (tête unie gris très foncé, gorge jaune, cri roulé) ; race *feldegg*, appelée B. des Balkans, rare en migration, avec calotte noir profond descendant loin sur la nuque, gorge jaune, barres alaires très marquées, cri *prriié* très roulé. Intermédiaires avec sourcil courts, moustaches blanches, etc.

Bergeronnette grise *Motacilla alba alba*

IDENTIFICATION. 18 cm. Longue queue, plumage tricolore, gris, blanc et noir. Tête blanche avec calotte noire du dessus de l'œil à la nuque, manteau gris, limite avec la nuque nette (mâle) ou diffuse (femelle) ; gorge et poitrine avec plastron noir, réduit à un bandeau en hiver. Manteau gris, ailes noires et franges blanches sur couvertures et tertiaires. Bec et pattes noires. Flancs blancs ou lavés de gris clair, sus-caudales gris foncé. Femelle en hiver avec calotte grise, comme les jeunes. **VOIX.** Cri : *chilip* doux. Chant : courte phrase, parfois babillée, reprenant des cris. **HABITAT.** Nicheur rural, près des fermes, des habitations. Hiverne dans les champs, près de l'eau, dans les villes. **DISTRIBUTION.** Possible partout, des plaines aux alpages. En hiver, surtout dans les grandes vallées. Race *subpersonata*, du Maghreb : un mâle capturé le 15 mai 1997 en Corse. Motif noir et blanc de la tête différent, avec beaucoup de noir, moustaches et front blancs, croissant blanc sous l'œil, tache blanche sur le côté du cou. Manteau gris.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*

IDENTIFICATION. 16 cm. Grosse fringille dont le bec aux longues mandibules croisées lui permet d'extraire les graines des écailles des cônes. Tête, poitrine et croupion rouges (mâle) ou gris olive (femelle), sous-caudales rayées ; ailes et queue noires. Jeune : calotte et dessous rayés, franges pâles sur les couvertures alaires. Taille du bec et cri variables selon la spécialisation pour tel ou tel conifère. **VOIX.** Cri : *tip* à *tup*, selon les populations. Chant lent de notes répétées, reprenant le cri. **HABITAT.** Forêts de conifères. Grégaire, sujet à invasions. Se reproduit en fin d'hiver. **DISTRIBUTION.** Grandes forêts de montagne et de plaine ; Corse.

R Bec-croisé perroquet *Loxia pytyopsittacus*



17 cm. Rare égaré de Scandinavie. Comme le B.-c. des sapins mais bec plus gros, à arêtes parallèles, aussi haut que long ; tête et cou plus forts. Cri : *töp* plus grave. Préfère les pins.

R Bec-croisé bifascié *Loxia leucoptera*



15 cm. Rare égaré des taïgas scandinaves et russes. Comme le B.-c. des sapins mais plus petit et plus fin, barres alaires blanches de largeurs graduelles inversées, pointe blanche aux tertiaires ; mâle rouge framboise. Bec plus fin. Cris : *tèp*, mais aussi *ouin* nasillard typique. Préfère les mélèzes.

Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus*



IDENTIFICATION. 15 cm. Grand, fort bec conique gris. Mâle : tête, poitrine et croupion rouges. Femelle : gris-brun, poitrine à stries diffuses, barres alaires pâles ; ventre et sous-caudales blanc uni. Manteau à stries diffuses. Jeune en automne plus strié sur le manteau et les flancs, barres alaires plus nettes. **VOIX.** Cri : *huit* rappelant le Pouillot véloce. Chant : *tsitsévitsa* (parfois traduit par « *pleased-to-meet-you* ») caractéristique. **HABITAT.** Milieux arbustifs et buissonnants, souvent près de dunes ou de zones humides, tourbières. **DISTRIBUTION.** Nicheur très rare dans les montagnes de l'Est (Alpes, Jura), dans le Pas-de-Calais. Migrateur rare sur les côtes du Nord à la Bretagne.

Roselin familier *Carpodacus mexicanus*

14 cm. Néarctique commun en cage, échappé de captivité, égaré possible. Comme le R. cramoisi mais flancs à larges stries noires, plus rayé dessus, sous-caudales à centre noir, souvent joues et bandeau sur l'œil sombres, mâle coloré de rouge ou de jaune orangé sur calotte, gorge et poitrine. Plusieurs observations récentes en hiver à la mangeoire, d'individus d'origine douteuse.

R Roselin githagine *Bucanetes githagineus*



13 cm. Très rare égaré d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, silhouette de bouvreuil à queue courte et gros bec rouge (mâle) ou jaune ; plumage uni gris pâle et beige, face lavée de rose, franges roses (mâle) ou beiges (jeune) sur tertiaires et grandes couvertures. Cri : *chic* ou *tsèt* bourdonné.