




FAUNE-PACA PUBLICATION
Synthèse ornithologique
des Hautes-Alpes - 2019

N°110 - Janvier 2022



faune-paca.org

Portail collaboratif de données naturalistes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur



Synthèse ornithologique des Hautes-Alpes - 2019

Mots-clés : Ornithologie, Synthèse, Hautes-Alpes, Observations remarquables

Coordination : Elie DUCOS

Rédaction : Elie DUCOS, Marc CORAIL

Mise en page : Hugo OMS

Citation : DUCOS E. & CORAIL M. (2022) Synthèse ornithologique des Hautes-Alpes - 2019 . LPO PACA, Faune-PACA Publication n°110 : 68p + annexes.

Si vous souhaitez participer à la rédaction ou à la relecture des prochaines synthèses annuelles, merci de vous faire connaître et d'indiquer si vous souhaitez travailler sur certaines espèces en particulier : **elie.ducos@riseup.net**

Si vous avez des remarques à faire, des suggestions, des critiques : même adresse

Résumé


Cette première synthèse fait le point sur 64525 données saisies dans les Hautes-Alpes en 2019 et totalisant 232 espèces.

Sommaire

1. Analyse globale des données de 2019	
1.1 Analyse par mailles.....	4
1.2 Analyse par communes.....	4
2. Signification des acronymes	7
2.1 Abréviations des observateurs.....	7
3. Précisions utiles sur quelques noms de lieux	7
4. Faits ornithologiques marquants en 2019.....	9
5. Liste commentée des espèces 2019	10
6. Liste des oiseaux des Hautes-Alpes (actualisée 2021).....	57
La faune de la région PACA.....	68

1. Analyse globale des données de 2019

Les données saisies en 2019 ne se répartissent pas de la même manière dans le temps et dans l'espace, ce qui est classique.



Graphique 1. Phénologie de la saisie faune-paca 2019

Le mois de mai, qui totalise 8909 données, est le plus renseigné. Il est suivi de très près par le mois d'avril (8893 données), puis par le mois de juin (7739 données). Les mois de mars et juillet sont bien renseignés, avec respectivement 6327 et 6285 données. A eux seuls, les mois d'avril et mai totalisent 27% des données annuelles. L'abondance des migrateurs en halte et la détection facile des oiseaux chanteurs nouvellement arrivés sur leurs sites de reproduction explique notamment cette quantité de données saisies. Le mois de septembre est le moins bien renseigné, il totalise 2489 données. La fin de l'été et le début de l'automne sont classiquement très calmes dans les Hautes-Alpes, nombre de nicheurs ayant déserté. A cette époque, la migration est peu sensible.

1.1 Analyse par mailles

Le nombre d'espèces nicheuses par maille en 2019 va de 101 (Sud-Champsaur) et 100 (Guillestrois) à 1 (Bruis, Saint-Disdier, la Grave, Névache). Dans ces derniers cas, il s'agit de mailles ne couvrant que très partiellement le département, situées en périphérie, ce qui explique ce faible score. Sur les mailles situées en totalité dans le département, la moins riche est celle des Orres (10 espèces), suivie de celle couvrant la tête de Couleau et la tête de Vautisse (15 espèces), puis de celle entre Risoul et Crévoux (23 espèces).

Malgré ces biais, le département des Hautes-Alpes est prospecté de façon plus homogène que d'autres départements comme le Var ou les Alpes de Haute-Provence, par exemple.

A noter que les deux mailles les plus riches en nicheurs des Hautes-Alpes en 2019 font aussi partie du trio de tête annuel pour la région PACA. Seule une maille en région PACA affiche plus d'espèces nicheuses en 2019, celle de Saint-Paul-les-Durance et Vinon-sur-Verdon (à cheval sur le Var, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône), avec 104 espèces.

Le nombre d'espèces par maille pour 2019 va de 35 (tête de Couleau) à 173 (Guillestrois) et même 175 (Serre-Ponçon). Des mailles limitrophes affichent entre 3 et 12 espèces, mais ces scores sont peu parlants du fait notamment du manque de prospection mais aussi de la surface très partielle de la maille sur le département. Les mailles de la zone cœur du Parc National des Ecrins affichent de beaux scores de 18, 23, 34, 37 et 50 espèces nicheuses, témoignant d'un bon effort de prospection en montagne.

1.2 Analyse par communes

Les dix communes les plus renseignées des Hautes-Alpes en 2019 sont Briançon (9503 données), Eyglies (3349), Villar Saint-Pancrace (2172), Saint-Chaffrey (2080), Gap (2018), Crots (1785), Sigoyer (1699), Réotier (1646), Orcières (1373) et Saint-Bonnet-en-Champsaur (1317). Parmi ces communes, seule Réotier compte moins de 10.000 données au total, témoignant d'un effort de prospection récent, centré sur le suivi de la migration active. Parmi les communes fournissant plus de 1000 données annuelles, on trouve aussi Chorges, Embrun, Vallouise, Cervières, Saint-Crépin et Montgenèvre. Dix-sept communes totalisent moins de 10 données en 2019 : Barillonnette, Nossage-et-Bénévent, Puy-Saint-Eusèbe, Fouillouse, la Pierre, Saint-Pierre-Avez, Montclus, Esparron, Montjay, Salérans, Chanousse, Sainte-Marie, Saint-Pierre-d'Argençon, Châteauneuf-d'Oze, Montrond, Eourres, Brézières et Châteauneuf. Il s'agit sans surprise et en grande majorité de petites communes du sud du département, qui ne vivent pas du tourisme et qui sont donc peu fréquentées au cours de l'année, ne bénéficiant pas de « l'afflux » estival de « touristes-ornithos » comme les communes du Queyras, de Haute-Romanche ou de la Clarée par exemple.

Il reste vingt-sept communes haut-alpines totalisant moins de 500 données dans la base : Montclus, Saint-Auban-d'Oze, Nossage-et-Bénévent, Saint-Pierre-Avez, Saint-Pierre-d'Argençon, Sainte-Marie, Salérans, Montjay, Montrond, la Haute-Beaume, Chanousse, Chabestan,

Furmeyer, Châteauneuf-de-Chabre, Bréziers, Antonaves, le Sauze-du-Lac, Aspremont, le Saix, la Pierre, Esparron, Saléon, Barret-sur-Méouge, Fouillouse, Montbrand, Sorbiers et Saint-Jacques-en-Valgodemard.

Du côté de la richesse communale, quinze communes signalent plus de 100 espèces en 2019 : Crots (154), Eygliers (151), Embrun (139), Gap (130), Réotier (117), Briançon (114), Saint-Crépin (108), Pelleautier (105), Ancelle (105), Chorges (105), Saint-Julien-en-Champsaur (104), Villar Saint-Pancrace (104), Orcières (103), Saint-Bonnet-en-Champsaur (102) et Saint-Chaffrey (102). Sans surprise, il s'agit des communes de Haute-Durance, du Champsaur et du Gapençais, très bien prospectées par les ornithos et où nombre de migrateurs viennent gonfler les listes.

Des efforts de prospection sont à faire notamment dans le sud du département et en particulier dans les pays du Buëch : secteur de la montagne d'Aujourd, Serrois-Rosanais, val de Céans, tout autour de la montagne de Chabre, l'ensemble de la forêt domaniale de Durbon...

A noter : cette synthèse ne prend pas en compte les communes nouvelles résultant de la fusion de communes depuis 2013. La mise à jour n'étant pas faite dans faune-paca.org, l'analyse des données se fait sur la base de la carte communale d'avant 2012. Cette synthèse conserve donc les communes suivantes :

- Agnières-en-Dévoluy, la Cluse, Saint-Disdier, Saint-Etienne-en-Dévoluy, regroupées depuis 2013 au sein de la commune de Dévoluy ;

- Saint-Bonnet-en-Champsaur, Bénévent-et-Charbillac et les Infournas, regroupées depuis 2013 au sein de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur ;

- Antonaves, Châteauneuf-de-Chabre et Ribiers, regroupées depuis 2016 au sein de la commune de Val-Buëch-Méouge ;


- Eyguians, Lagrand et Saint-Genis, regroupées depuis 2016 au sein de la commune de Garde-Colombe ;

- Bruis, Montmorin et Sainte-Marie, regroupées depuis 2017 au sein de la commune de Valdoule ;


- Vallouise et Pelvoux, regroupées depuis 2017 au sein de la commune de Vallouise-Pelvoux ;

- Chauffayer, les Costes et Saint-Eusèbe-en-Champsaur, regroupées depuis 2018 au sein de la commune d'Aubessagne ;


- Abriès et Ristolas, regroupées depuis 2019 au sein de la commune d'Abriès-Ristolas.



Graphique 2. Nombre de données saisies par tranches d'altitude



Carte 1. Nombre total d'espèces nicheuses par maille



Carte 2. Nombre total d'espèces par maille

2. Signification des acronymes

N : Nicheur, M : Migrateur, H : Hivernant

2.1 Abréviations des observateurs

Pour une lecture plus claire, les noms des observateurs réguliers sont abrégés comme suit.

Nicolas Alric (NAL), Olivier Arieu-Jouglaud (OAJ), Aurélien Audevard (AAu), Jean-François Azens (JFA), Robert Balestra (RBA), Sylvie Bedjai Voisin (SBV), Eric Belleau (EBE), G. Bernard (GBE), Régis Bertolotti (RBE), Luc Bianchini (LBI), Julien Birard (JBI), Pierre Bonneau (PBO), Yvan Bonneau (YBO), Michel Bouche (MBO), Laurent Bouvin (LBO), Gérard Briard (GBR), Alex Clamens (ACI), Marc Corail (MCO), Valérie Corail (VCO), Jean-Paul Coulomb (JPC), Cyril Coursier (CCO), Michel Davin (MDA), Albert Delannoy (ADE), Grégory Dhainaut (GDH), Benoit Duchenne (BDU), Elie Ducos (EDUC), Eliane Dupland (EDUP), Brigitte Emmery (BEM), Olivier Eyraud (OEY), Thibaut Ferrieux (TFE), Vanessa Fine (VFI), Amine Flitti (AFI), Gaël Foilleret (GFO), Thomas Girard (TGI), Alain Girodon (AGI), Catherine Hubert et François Gremillard (CHUGR), Alain Hugues (†) (AHU), Aymeric Jonard (AJO), Thierry Joubert (TJO), Chloé Laffay et Thomas Michel-Flandin (CLATMI), Guillaume Laigle (GLA), Charlin Lassalle (CLA), Lény Laurenti (LLA), Annette Lebreton (ALE), François Legendre (FLE), Alain Létévé (ALÉ), Gilles Lloret (GLI), Jean-Pierre Marie (JPM), Anaïs Merdrignac (AME), Corinne Meizenq (CME), Sébastien Merle (SME), Philippe Millon (PMI), Mathis Morino (MMO), Philippe Nawala (PNA), Jean-Pierre Niermont (JPN), Claire Oddou (COD), Vincent Palomares (VPA), Aude Pappe (APA), Steeve Peyron (SPE), Philippe Poiré (PPO), Hubert Pottiau (HPO), Marc Provost (†) (MPR), Pierre-Adrien Reynaud (PAR), Henri Ripert (HRI), Philippe Rodriguez (PRO), Gérald Rouit (GRO), Pascal Saulay (PSA), Frédéric Spada (FSP), Bernard Thomas (BTH), Daniel Thonon (DTH), Diane Topham (DTO), Yves Zabardi (YZA)

3. Précisions utiles sur quelques noms de lieux

La liste suivante n'est pas exhaustive... N'hésitez pas à suggérer d'autres noms de lieux que vous pensez être importants pour l'ornithologie haut-alpine.

Alberts (les) : hameau de Montgenèvre au pied du col éponyme, comprenant une vaste plaine humide et un étang bordé de roseaux.

Baie Saint-Michel : baie du lac de Serre-Ponçon située sur les communes de Chorges et Prunières.

Bois de Saint-Joseph : reboisement de mélèze sur l'adret de Monétier-les-Bains.

Bois des Ayes : cembraie en Réserve Biologique Dirigée sur la commune de Villar Saint-Pancrace.

Bout du Plan (le) : terres agricoles de Crots, sur la partie nord du cône de déjection du torrent de Boscodon, au bord du lac de Serre-Ponçon.

Casset (le) : deux étangs sur la commune de Monétier-les-Bains en bord de Guisane, le long d'une grande plaine agricole (la Chalpe).

Céüse : vaste synclinal perché culminant à 2016 m, 10 km au sud-ouest de Gap, formant le point culminant et le point méridional du Bochain, et dont les parois sont mondialement reconnues pour la pratique de l'escalade. C'est l'un des deux seuls sites en France où le Choucas des tours, le Crave à bec rouge et le Chocard à bec jaune nichent côte à côte.

Chadenas : vasières de l'amont du lac de Serre-Ponçon sur la commune d'Embrun.

Champ du Serre : plateau agricole d'Ancelle (aussi appelé Tresserre), comprenant notamment de petites zones humides et des coteaux morainiques.

Champrouët : lieu-dit de Villar Saint-Pancrace correspondant aux terres agricoles des mines de la Tour.

Champsaur : vaste district biogéographique correspondant grossièrement au bassin-versant du haut-Drac, formant une large vallée aux pentes douces dont l'activité est majoritairement agricole, et présentant un réseau bocager dense.

Charmasses : lieu-dit de Villar Saint-Pancrace, sur un vaste espace d'agriculture paysanne.

Col de Gleize : point de passage à 1691 m entre le Champsaur (col Bayard) et la haute vallée du Petit Buëch.

Col de Manse : point de passage à 1269 m entre le Gapençais et le Champsaur, autour duquel on retrouve une belle mosaïque de milieux agricoles et humides.

Col des Guérins : col situé à 1325 m sur la commune de Sigoyer au pied de la montagne de Céüse.

Col du Lautaret : point de passage routier à 2058 m d'altitude entre la haute-Guisane et la haute-Romanche entre les communes du Monêtier-les-Bains et de Villar-d'Arène, qui marque aussi la limite entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord, et où l'on retrouve la diversité floristique la plus importante en France (plus d'un tiers des espèces françaises y sont présentes).

Combe de Malaval : gorges de la Haute-Romanche sur la commune de la Grave.

Crête des Prenetz : crête située à 2800 m d'altitude entre la tête de Vautisse (col de Rougnoux) et la tête de Fouran, entre Réotier et Saint-Clément-sur-Durance, site de halte traditionnel du Pluvier guignard.

Crots : commune des Hautes-Alpes sur les bords du lac de Serre-Ponçon, utilisée pour parler de l'amont du lac et de ses vasières.

Emparis : vaste plateau herbeux et rocheux situé sur la commune de la Grave à environ 2450 m, ponctué de plusieurs lacs et zones humides, et faisant partie d'un ensemble plus vaste de pelouses alpines entre les Hautes-Alpes et l'Isère, formant l'alpage le plus étendu d'Europe, où des milliers de brebis pâturent en été.

Espinasses : retenue sur la Durance immédiatement en aval du barrage de Serre-Ponçon, à la limite des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, point de départ du canal de la Durance.

Eygliers : base de loisirs située dans le Guillemois, en bord de Durance, où niche le Harle bièvre depuis 2014, l'un des sites les plus prospectés des Hautes-Alpes.

Germanette : base de loisirs située à Serres au bord du Buëch, proche du barrage de Saint-Sauveur.

Gouffre de Gourfouran : gorges de la Biaysse entre Freissinières et Champcella.

Ile Saint-Jean : petite zone humide en bord de Durance sur la commune de Villar Saint-Pancrace.

Isclette (l') : petite plaine agricole au pied du village de Réotier ; aussi utilisée pour dénommer les iscles de la Durance à proximité immédiate, les plus vastes et les mieux préservées de Haute-Durance.

Lac de l'Aulagnier : plan d'eau situé à 1155 m sur la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur.

Lac de Barbeyroux : lac situé à 1496 m sur la commune de Bénévent-et-Charbillac dans le Champsaur.

Lac de Curbans : retenue sur la Durance située en aval du barrage de Serre-Ponçon à la limite des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence.

Lac de l'Orceyrette : lac artificiel sur le torrent de l'Orceyrette, au pied du bois des Ayes, sur la commune de Villar Saint-Pancrace.

Lac de Mison : lac artificiel situé sur les communes d'Upaix (Hautes-Alpes) et Mison (Alpes de Haute-Provence), ceinturé d'une belle roselière, où niche notamment la Rousserolle turdoïde.

Lac de Siguret : lac naturel de Haute-Durance en rive gauche sur la commune de Saint-André-d'Embrun, ceinturé par une belle roselière et peu prospecté.

Lac des Bouchards : plan d'eau discret et difficile d'accès situé à Savines au sud-ouest du lieu-dit « Picoune », derrière la route nationale et la voie ferrée.

Lazer : plan d'eau agricole sur la commune du même nom.

Marais du Bourget : vaste zone humide gérée par le CEN PACA de part et d'autre de la Cerveyrette, comprenant tourbières à sphaignes, bas-marais et cariçaies à environ 1800 m d'altitude sur la commune de Cervières, sur la partie aval de la vallée des Fonts.

Marais de Manteyer : grande zone humide sur les communes de Manteyer et la Roche-des-Arnauds, constituée notamment d'une roselière, de prairies humides et d'eau libre.

Méreuil : lac artificiel formé par le barrage de Saint-Sauveur sur le Buëch entre Serres et Eyguians.

Mikéou : site d'observation de la migration active en Haute-Durance sur la commune de Réotier.

Pelleautier : lac artificiel situé 7 km au sud-ouest de Gap, l'un des « points chauds » ornitho du département.

Pic de Maravoise : sommet culminant à 2704 m au fond de la vallée de l'Orceyrette entre Briançonnais et Queyras où un dortoir estival de Vautours fauves est compté chaque année.

Piles (les) : zone humide co-gérée par la LPO PACA et Escota en bordure du péage de la Saulce.

Plaine d'Ancelle : plaine agricole du Champsaur située à 1300 m d'altitude, encore relativement épargnée de

l'agriculture intensive, au cortège d'oiseaux prairiaux et agricoles remarquables.

Plaine de Ceillac : terres agricoles autour de Ceillac, connues pour voir s'arrêter des incongruités durant les migrations lors des épisodes météo perturbés.

Plaine de Saint-Eyrié : vallon agricole tranquille de la commune de Prunières, sur les hauteurs de Serre-Ponçon, site de halte traditionnel du Faucon kobez.

Plan d'eau du Champsaur : lac artificiel en bord de Drac sur la commune de Saint-Julien-en-Champsaur.

Plan d'eau du Riou : lac artificiel au pied de la montagne de Saint-Genis, dans la vallée du Buëch, alimenté depuis le barrage de Saint-Sauveur à Méreuil via un canal en partie souterrain, alimentant lui-même le plan d'eau de Lazer, puis une centrale hydroélectrique relâchant ses eaux dans le canal de la Durance entre Upaix et Ventavon.

Plateau d'Herbonne : petit plateau de poudingue à l'allure de causse miniature entre la Durance et le Rabioux sur la commune de Châteauroux-les-Alpes, parsemé de cultures et de pelouses sèches.

Plateau de Bure : vaste plateau minéral en bordure méridionale du Dévoluy. Site réputé de halte migratoire du Pluvier guignard.

Puy Jaumar : lieu-dit de l'adret de Monêtier-les-Bains, vite déneigé en hiver, site d'hivernage classique du Merle à plastron.

Réservoir des Bédasses : petit réservoir agricole à bordure boisée sur la commune de Forest-Saint-Julien.

RNR des Partias : Réserve Naturelle Régionale co-gérée par la LPO PACA et la commune de Puy Saint-André sur les hauteurs de Briançon.

Rocher des Aymards : lieu-dit de Villar Saint-Pancrace, sur un vaste espace d'agriculture paysanne.

Saint-Laurent-du-Cros : commune du Champsaur, première commune des Hautes-Alpes à avoir été remembrée.

Sauze-du-lac (le) : commune surplombant Serre-Ponçon et la confluence noyée entre l'Ubaye et la Durance depuis un belvédère, d'où l'observation de la migration active est possible.

Savournon : principale commune du val de Channe.

Sentier des Crevasses : sentier de randonnée entre le col du Lautaret et le plan de l'Alpe de Villar-d'Arène via le belvédère de l'Homme, traversant une grande zone de mégaphorbiaie et aulnaie verte, où nichent le Sizerin cabaret, la Rousserolle verderolle, le Tétraz lyre et le Merle à plastron, notamment.

Serramande : adret de Prunières au-dessus de Serre-Ponçon, constitué de pelouses sèches, de cultures et de haies, site de halte du Faucon kobez.

Serre-Buzard : site d'observation de la migration active en Haute-Durance sur la commune de Châteauroux-les-Alpes.

Val d'Escreins : vallon sauvage situé 6 km au sud-est de Guillestre jusqu'aux Pics de la Font Sancte (3385 m).

4. Faits ornithologiques marquants en 2019

Nidification du Milan royal.

Nidification probable du Busard cendré.

Nidification probable de la Locustelle tachetée.

Au moins 6 couples nicheurs de Harle bièvre en Haute-Durance.

Seconde mention de la Bergeronnette citrine.

Hivernage complet de la Pie-grièche grise.

Hivernage d'un Garrot à œil d'or à Serre-Ponçon.

Première mention de l'Avocette élégante depuis 2005.

Mention d'un Roselin cramoisi au sentier des Crevasses.

Mention d'une Marouette poussin à Charance.

5. Liste commentée des espèces 2019

Cygne tuberculé *Cygnus olor* – MH, rare – 1 donnée

2 oiseaux sur le lac de Curbans sur le côté haut-alpin, mais 2 à 10 oiseaux stationnent sur l'ensemble du lac.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* – M, peu commun – 9 données

2 mentions printanières, le 26/04 à Crots (EDuc), le 10/05 à Eygliers (GBe, SPe) (unique mention hors secteur amont de Serre-Ponçon). Au passage postnuptial, noté dès le 19/08 à Crots (HRI) et sur le plan d'eau d'Embrun (NAL). Dernière mention postnuptiale le 6/09 à Crots (LBI), puis 2 oiseaux le 20/12 à Embrun.



1. Tadorne de Belon, Eygliers, 10 mai 2019. © GBe

Canard colvert *Anas platyrhynchos* – NMH, commun – 809 données

Nicheur jusqu'à 1750 m à Orcières (MCo), 1860 m à Cervières (JPN) et 1990 m à Vars (EBE).

Canard chipeau *Anas strepera* – MH, peu commun – 5 données

2 le 5/02 à Vitrolles (EDup). Une seule donnée au printemps : 1 couple à Savines le 24/03 (EDuc). Noté le 10/10 à Crots (LBI), avec un max. de 14 le 18/10 (HRI). 4 le 15/12 à Curbans (PSa).

Canard pilet *Anas acuta* – MH, rare – 4 données

1 donnée printanière le 2/04 à la Saulce (OEy). Au passage postnuptial, 1 femelle à Crots le 12/09 (EDuc). 1 mâle (échappé ?) à Charance le 7/11 puis 1 à Mison le 15/12 (MDa).

Canard souchet *Anas clypeata* – M, peu commun – 18 données

Premiers le 24/03 à Savines (EDuc), derniers le 26/04 à Mison et Embrun (EDuc, LBI). Au passage postnuptial, premiers le 7/09 sur le barrage du Guil à Guillestre (LMu) avec 5 oiseaux, puis 2 le 19/10. Derniers le 3/11 à Eygliers (LBI, SPe).

Canard siffleur *Anas penelope* – MH, rare – 10 données

Peu noté au passage prénuptial : 2 mentions à Mison les 7 et 13/03 (APa). Mentions postnuptiales du 3/11 à Eygliers (LBI). Max. de 11 oiseaux le 24/11 à Embrun (LBI, GDh). Noté à Curbans le 15/12 (PSa).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* – MH, commune – 67 données

Notée de mi-août à début avril avec une donnée isolée le 23/05 à Crots (LBI). Une trentaine d'oiseaux hivernent sur le lac de Curbans et 3 hivernants sont notés sur Serre-Ponçon à Crots le 13/01 (Michel Bouche/PNE). Les premiers oiseaux de passage prénuptial sont notés le 12 et 13/03 à Eygliers (SPe), 14 oiseaux le 19/03 sur le lac de la Roche-de-Rame (SPe, JPN). Dernières le 5/04 à Embrun (HRI). Au passage postnuptial, première le 20/08 à St-Eusèbe-en-Champsaur (TJo), puis 4 le 22/08 à Crots (HRI), puis petite arrivée avec 11 oiseaux le 27 et le 29/08 (HRI, EDuc). Par la suite, notée quasi-quotidiennement jusqu'au 8/10 en Haute-Durance, à Pelleautier, la Roche-des-Arnauds... Un oiseau à 2200 m au lac Chavillon à Névache le 26/10 (Anna Caviglione). Le passage se poursuit jusqu'à la fin novembre. Un mâle à Eygliers le 23/12 (EDuc, JPN).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* – M, peu commun – 21 données

Uniquement notée au printemps. Passe sans doute inaperçue à l'automne. Premières le 13/03 à Mison (APa), dernière le 15/04 à Crots (HRI). Max : 20 à Curbans le 2/04 (OEy), 14 à St-Julien-en-Champsaur le 20/03 (OAJ), 9 à Savines le 19/03 (OEy), 8 à Eygliers le 4/04 (SPe).

Fuligule milouin *Aythya ferina* – MH, peu commun – 74 données

Peu répandu, la majorité des données concerne le lac de Mison et le barrage de Saint-Sauveur à Méreuil ainsi que le lac de Pelleautier. 3 hivernants notés le 13/01 au Sauze-du-Lac sur le lac de Serre-Ponçon (MBo). Hors du sud du département, 1 du 2 au 20/03 à Embrun (HRI, EDuc, LBI, JPC, JPN), un couple le 24/03 à Savines (EDuc). Au passage postnuptial, 10 à Embrun le 1/11 (LBI), puis 2 le 3/11 (HRI), et 3 le 15/11 (LBI, GDh) et le 8/12 (GDh).

Nette rousse *Netta rufina* – M, rare – 13 données

1 couple à Mison du 28/03 au 26/04, 1 mâle le 8/05 à Pelleautier (PSa). 5 données au passage postnuptial du 1/09 au 16/11 : 1 oiseau du 1 au 7/09 à Lardier-et-Valença (PMi), puis 1 le 29/09 à Eygliers (GBe) et 2 le 16/11 (SPe).



2. Nettes rousses, Eygliers, 16 novembre 2019. © SPe

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* – MH, rare – 2 données

1 à Vitrolles le 5/02 (EDup), 1 à Embrun le 17/04 (HRI).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* – NMH, peu commun – 47 données

Des hivernants notés à Rousset le 11/01 (MCo) et à Mison du 7/01 au 8/04. 2 localités accueillent des nicheurs : le plan d'eau des Vivas à Lardier-et-Valença, avec une nichée de 7 poussins notée le 13/07 (PMi), et Pelleautier, avec une nichée de 9 poussins le 15 et 16/07 (GBe, PSa), puis 3 poussins le 30/08. Reproduction probable à Mison (PAR), Lazer (PAR), Rochebrune (TGi), Vitrolles (COd). Retour à Mison dès le 17/09 (PAR).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* – MH, rare – 21 données

Même individu. Une femelle découverte le 21/12 (LBi) passe l'hiver à Crots et Embrun sur l'amont de Serre-Ponçon, où elle sera vue jusqu'au 4/02/2020 (HRI). L'espèce n'avait pas été observée depuis 1998 dans le département !



3. L'une des stars de l'hiver : Garrot à œil d'or, Embrun, 23 décembre 2019. © PSa

Harle bièvre *Mergus merganser* – NMH, peu commun – 356 données

Très belle série. Le Harle bièvre niche depuis 2014 en Haute-Durance sur la Durance et le Guil. L'espèce est bien implantée, avec 6 ou 7 nichées répertoriées. Surtout notée entre mi-février et fin mai, avec un déficit de données en juin-juillet due à la discrétion de l'espèce à cette époque (fin de la nidification, départ des mâles, mue des femelles et élevage des jeunes). Retour peu marqué à partir de la mi-août, quelques hivernants. En exergue : 6 oiseaux sur le Drac à Saint-Bonnet le 16/01 (BTh), 8 à Eygliers dès le 18 (SPe). Des parades le 25/02 sur le Drac à Saint-Bonnet (Alexis Nouailhat). Max. printanier à Eygliers : 19 oiseaux (12 femelles et 7 mâles) le 26/02 (SPe). Au moins 6 et peut-être 7 nichées sont notées en Haute-Durance cette année : 3 à Eygliers, 2 sur la Durance en amont et 1 sur le lac de Saint-Crépin. Une première nichée de 12 poussins le 25/04 à Eygliers (GBe), une deuxième avec 9 poussins le 27 (SPe), une troisième avec 13 poussins le 1/05. Quatrième nichée le 9/05 à Eygliers (LBi). Cinquième nichée découverte le 16/05 sur le lac de Saint-Crépin (CHuFGr). Sixième nichée le 21/08 sur le Guil (LBi). Une femelle avec 8 poussins le 24/05 sur la Biaysse, juste en amont de la confluence avec la Durance (RBa) : nichée locale passée inaperçue ou famille d'Eygliers remontée plus en amont ? Des oiseaux stationnent aussi assez tardivement sur l'amont de Serre-Ponçon, à l'image de ce couple à Crots le 12/04 (EDuc). Nets retours de mue à partir de fin novembre : 3 à Saint-Crépin (LBi) et 3 à Savines (JPC) le 24, 4 à Eygliers le 28 (SPe). A noter une femelle blessée au bec par un fil de pêche, notée à Eygliers du 24 au 30/10 (SPe, GBe).



3. Harles bièvres, Saint-Crépin, 28 avril 2019. © EDuc

Lagopède alpin *Lagopus muta* – N, peu commun – 70 données

Aucune donnée de nidification certaine cette année. Quelques nidifications probables du côté du Galibier (AAu) et du massif de Rochebrune (BDu, EDuc). Noté dans l'ensemble des massifs élevés jusqu'au Dévoluy. Groupes notés à partir d'août, max. de 26 répartis en 5 groupes le 7/09 (Laurent Majorel) dans le Dévoluy. Max. hivernal de 5 (Jonathan Corjon).

Tétras lyre *Tetrao tetrix* – N, peu commun – 111 données

Noté dans l'ensemble des massifs mais plus souvent dans le Champsaur et Dévoluy du fait d'une pression de prospection plus importante (MCo *et al.*). 1 donnée de nidification certaine enregistrée (OAJ). Premiers chants le 23/02 (Stéphane Lucas), derniers le 20 juillet (JPM), puis encore en octobre (AFI) et en novembre (JPN). 47% des données en avril-mai.

Gélinotte des bois *Bonasia bonasia* – N, rare – 4 données

3 contacts dans le Dévoluy (FSp, VPa) et 1 dans le Champsaur (MCo). Bien qu'assez rare l'espèce est manifestement sous-prospectée dans le département du fait de sa très grande discrétion.

Perdrix rouge *Alectoris rufa* – N, peu commun – 24 données

Notée à l'unité ou par couples, dans le sud du département, jusqu'à Crots.

Perdrix bartavelle *Alectoris graeca* – N, peu commun – 32 données

Aucune donnée de reproduction certaine cette année pour une espèce discrète et farouche, peu accessible et toujours aussi difficile à contacter.

* A signaler : pour ces trois galliformes de montagne (Tétras lyre, Lagopède, Bartavelle) un important suivi réalisé par l'OFB (GPS et télémétrie) dont les données toutefois n'apparaissent pas dans cette synthèse associative.

Perdrix grise *Perdix perdix* – N, rare – 9 données

Surtout notée dans le Champsaur où elle semble nicher dans les prairies remembrées de Saint-Laurent-du-Cros (PMi), et niche avec certitude aux Costes à Aubessagne (PMi), avec une nichée observée le 18/08. 1 à Chorges le 8/09 (JFA), 3 au Poët Morand à Briançon le 27/09 (JPN). Max. de 21 oiseaux à Crévoux le 17/09 (HRi).

Caille des blés *Coturnix coturnix* – N, commun – 132 données

Notée dans l'ensemble du département. Première le 16/04 à Savournon (GLI). Souvent notée à Prunières à partir du 9/05 (OEy, EDup, GBr, HRi). Surtout notée en juin et juillet, entre 600 et 2400 m, en particulier autour de 1000 et 2000 m. L'espèce est bien présente dans le val de Channe à Savournon (GLI), dans le Champsaur et ses grandes prairies (plaine d'Ancelle, autour du col de Manse, etc.) (MCo), autour de Villar Saint-Pancrace (JPN, EDuc), autour du col du Lautaret, en haute vallée de la Cerveyrette... bref, partout où subsistent de belles prairies. Derniers nicheurs le 23/08 à Ancelle (AJo) et le 8/09 à Chorges (JFA). Dernière migratrice le 22/11 à Eygliers (GDh), individu trouvé mort, une date particulièrement tardive.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* – N, peu commun – 59 données

Surtout noté dans le Gapençais et le Champsaur, ponctuellement ailleurs.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* – MH, rare – 2 données

Un jeune oiseau à Crots du 19 au 24/10 (HRi). C'est tout !

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* – NMH, peu commun – 102 données

Des nicheurs probables notés à Rochebrune (TGi) et la Roche-des-Arnauds (Fabien Garcia). De possibles

reproductions également à Upaix/Mison (GBe, TJo, GLI), Saint-Bonnet-en-Champsaur (MCo). Nidification notée avec certitude à Méreuil le 4/08 (GLI). Quelques hivernants notés à Rousset sur le lac d'Espinasses (TFe, MCo), à Serres (APa), Méreuil (GLI)... 1 à Embrun le 2/10 (HRI), puis 1 (le même ?) à Eygliers du 10/10 au 30/12 (GBe, SPe, GDh, Jean-François Baudin *et al.*), rejoint par un second du 13 au 17/10 (PMi, SPe, GBe). Mentions automnales à Saint-Bonnet sur le plan d'eau du 13/10 au 26/12 (OAJ, ACI, BTh).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* - NMH, peu commun - 207 données

Six localités accueillent des nicheurs, toutes dans le sud du département : le lac de Pelleautier (PSa), le plan d'eau du Riou à Eyguians (APa), le plan d'eau de Lazer (APa), le plan d'eau de la Pradelle à Vitrolles (TGi), le barrage de Saint-Sauveur à Méreuil (GLI), et le plan d'eau des Vivas à Lardier-et-Valença (TGi). Des nicheurs probables sont notés à Upaix (APa), la Freissinouse (COd) et à Rochebrune (SBV). Une nidification possible est signalée en milieu d'été à la Roche-des-Arnauds (Fabien Garcia). La majorité des hivernants est concentrée sur le lac de Serre-Ponçon, notamment en aval du pont de Savines, avec 145 oiseaux comptés lors du comptage Wetlands (MBo). Quelques oiseaux passent l'hiver à Rousset (TFe, MCo), à Lazer (APa), à Upaix (APa, ADe)... 1 oiseau stationne à Eygliers du 18 au 27/04 (SPe, GBe, GDh, JPN, APa *et al.*). Premiers retours à Serre-Ponçon le 4/09 (LBi).

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* - MH, commun - 391 données

Pas nicheur dans le département, surtout noté entre octobre et avril. Seulement 48 données entre mai et septembre. Pic d'observations fin décembre puis entre fin mars et mi-avril. Quasi-exclusivement noté le long de la Durance (Serre-Ponçon, Curbans, etc.). Quelques données sur le Buëch et le Drac (Champsaur). En migration, max. de 14 à Saint-Martin-de-Queyrières le 27/04 (EDuc).

Butor étoilé *Botaurus stellaris* - NM, rare - 11 données

Un chanteur contacté à Pelleautier du 7 au 23/04 (PSa, OEy, HRI), puis un à Saint-Julien-en-Champsaur le 8/05 (TJo). Une donnée estivale : un chanteur isolé entendu en bord de Durance entre Valserres et Piégut (04) le 11/07 (MCo, EDuc).



4. Butor étoilé, Pelleautier, 9 avril 2019. © PSa

Blongios nain *Ixobrychus minutus* - NM, rare - 27 données

Une femelle en halte à Eygliers du 19 au 22/05 (SPe, GBe, APa). Nicheur uniquement sur Pelleautier, premiers chanteurs le 23/05 (PSa), un jeune et trois adultes dont deux mâles observés les 3 et 11/08 (PSa). L'enquête Blongios coordonnée par la LPO PACA a permis de contacter deux oiseaux sur deux nouveaux sites à Vitrolles (TGi). Dernier oiseau le 22/08 à Pelleautier (EBE).



5. Blongios nains, Pelleautier, 21 juillet 2019. © PSa

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* - M, peu commun - 32 données

Premiers le 5/03 avec 4 oiseaux en migration active au-dessus de Briançon (JPN). Un le 10 et le 16/04 à Embrun (HRI), visiblement épuisé (récupéré par l'OFB). Contacté presque quotidiennement en avril sur les sites classiques : 2 à Eygliers (SPe, GBe) jusqu'au 29/05, 2 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ), 1 à Charance (RBe), 1 à Neffes (AHu)... Quelques données estivales : 1 à Crots le 2/06 (LBi), 2 à Gap le 10/06 (RBe), 1 adulte le 7/07 à Eygliers (GBE), puis des jeunes : 1 le 8/07 à Vitrolles (TGi), 1 le 3/08 à Pelleautier (PSa), 1 le 26/08 à Upaix (MCo).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* – M, peu commun – 35 données

Dont 31 données printanières. Premier le 2/04 au Bersac (GLI), un autre le lendemain posé dans un arbre en plein centre-ville de Guillestre (Gwladys Mathieu Kostrzewa). Noté à l'unité à Eygliers du 7/04 (JPN) au 15/05 (GBe), 2 le 16/04 (SPE). Noté aussi au bord de Serre-Ponçon du 7/04 (LBI) au 19/05 (GDH). 1 à Montgardin le 16/04 (Christophe Albert), 5 à Crots le 9/05 (LBI), 6 à Baratier le 10 (JPC) puis 7 le 11 au Liou (HRI) et 3 à Baratier (JPC), 4 à Embrun sous le roc le 15/05 (HRI). 4 données postnuptiales : 1 le 13/11 à Neffes (EDup), 1 le 16 à Eygliers (SPE), 1 du 19/11 au 1/12 à Baratier (Paul Sarlin), un dernier à Baratier le 5/12 (JPC).



7. Héron garde-bœufs, Eygliers, 9 avril 2019. © GBe

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* – M, rare – 5 données

Sur sites classiques : 1 sur la zone du Liou le 24/04 (HRI), puis 1 (le même ?) le 11/05 (HRI), puis à Eygliers le 15/05 et le 21/06 (GBe).



8. Crabier chevelu, Eygliers, 15 mai 2019. © GBe

Aigrette garzette *Egretta garzetta* – M, commun – 93 données

Très belle série de 89 données printanières. Surtout notée autour de Serre-Ponçon et en Haute-Durance, un peu moins dans le Champsaur. Première le 7/02 à Châteauneuf-de-Chabre (Laurent Mifsud), 1 le 4/03 au Riou à Eyguians (EDup). Début du pic de passage le 31/03 : 10 à Réotier (JPN), 10 à Saint-Crépin (JPN, AME) et 13 à Crots (GLA). Passage plus éparé dans la première quinzaine d'avril : 1 à Eygliers le 4 et le 16 (SPE), 2 à Crots le 7 (LBI) et le 16 (Paul Sarlin). Intensification du passage à partir du 19/04 : 7 à Eygliers (SPE, JPN, GBe, SME), puis 4 les jours suivants (SPE, GBe...) ; 4 à Saint-Bonnet le 21/04 (MCo) et 17 à Crots (LBI, JPC) le 21 et 22/04, puis 26 à Baratier et 25 à Crots le 23 (HRI), 13 le lendemain (HRI), à la faveur d'un épisode météo perturbé. Notée à l'unité ou en petits groupes entre Eygliers et Saint-Crépin jusqu'au 16/05 (GBe), à noter un groupe de 10 à Saint-Crépin (CHuFGr) et 6 sous le roc d'Embrun le 15 (HRI). 1 à la Saulce le 27/04 (AHu), 1 à Théus le 29 (TGi), 1 en migration active le 1/05 le long du Guil à Aiguilles, Queyras (Michel Colombe) à 1500 m, 1 à Neffes le 2/05 (AHu), 1 à Saint-Bonnet le 5 (TJo), 2 à Rochebrune le 9 (EDup), 1 à Saint-Julien-en-Champsaur le 10 (OAJ), 3 à Pelleautier, 3 à Chorges et 1 à Serres le 18 (PSa, JFA, BGr), 1 à Méreuil le 19 (BGr). Encore notée en Haute-Durance à l'unité : 3 à Crots le 21/05 (HRI), 1 à la Roche-de-Rame le 24 (RBa), 5 à Crots et 3 à Réotier le 2/06 (HRI, GBe, LBI). En été, 1 à Rochebrune le 13/06 (TGi), 1 à Crots le 28/07 (JPC). La donnée suivante concerne 2 oiseaux le 8/10 à Crots (HRI), dernière le 19/10 à Crots (LBI).

Grande Aigrette *Casmerodius albus* – MH, peu commun – 40 données

Petite année, toujours notée à l'unité ou par deux. 1 le 5/01 à Saint-Crépin (LBI), 1 le 6 à Ventavon (RBe), 1 le 14 à Eyguians (BEm), 1 le 15 à Mison (GBr)... Passage à partir de fin février : 2 à Savines le 21/02 (JPC), 1 à Réotier le 4/03 (LBI), 2 le 24 à Savines (EDuc). Dernières printanières en Haute-Durance le 17/05 à Eygliers (SPE) et le 20 à Saint-Crépin (LBI). 1 à Neffes le 27/05 (AHu), 1 à Espinasses le 1/06 (EDup), 1 à Méreuil le 3/06 (PAR). La suivante le 5/09 (!) à Crots (HRI), dernière le 10/12 à Montgardin (HRI). Notée tout le mois de septembre sur sites classiques (Crots, Mison, Méreuil...) (JPC, ADe, GLI...) et moins classiques : 1 le 29/09 à 2280 m à Cervières (Fabrice Mélet).

Héron cendré *Ardea cinerea* – NMH, commun – 434 données


Aucune donnée de nidification certaine cette année. Noté principalement entre janvier et fin avril, creux entre mai et début septembre, retours plus marqués à partir de la deuxième décade de septembre. Observé partout sauf en Haute-Romanche. A noter un oiseau en vol nocturne vers le nord le 16/06 au-dessus de Briançon (EDuc). Max atteints à partir de fin août : 7 le 27 à Crots (HRI), puis 10 le 14/09 (HRI), 13 le 15 (SPe), 17 le 18 (LBI), 18 le 19 (LBI), et jusqu'à 20 le 22 à Chadenas (HRI). Encore 12 le 20/10 à Saint-Julien-en-Champsaur (ACI). Du côté des altitudes élevées, signalons 1 oiseau le 5/04 à Ristolas (Anthony le Nozahic) à 1700 m, probablement en migration ; 2 le 15/07 à Abriès (Frédéric Masson) à 1770 m, et 1 le 7/07 au lac de Roue (PBo) à 1850 m.

Héron pourpré *Ardea purpurea* – M, peu commun – 21 données

Petite année, avec uniquement des données printanières. Premier le 19/04 à Eygliers (GBE), suivant le 21 à Chadenas (HRI), puis 1 le 23 à Embrun (HRI, JPC). Noté à Eygliers du 26/04 (EDuc, GDh) au 11/05 (OEy), puis le 18/06 (GBE). 1 le 17/05 à Charance (RBe), 1 le 23/05 à Pelleautier (PSa). Deux données douteuses de fin novembre à Eygliers ne sont pas prises en compte ici.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* – M, peu commun – 28 données

Première le 18/02 à Ventavon (EDup), 1 oiseau stationne à Embrun du 18 au 26/03 (HRI *et al.*). A Gap, 3 oiseaux en halte sur le toit d'un immeuble le 17/03 (RBe), puis 1 sur le clocher de la cathédrale le 10/04 (BEm). 4 le 16/04 à Saint-Bonnet (Sylvie Joubert), 1 le 20/05 à Saint-Laurent-du-Cros (Gerald Dielen), puis 8 le 30/05 à Saint-Bonnet (BTh). Encore 5 à Ventavon le 4/06, et 1 du 10 au 15/07 sous le roc d'Embrun (HRI).



9. Cigogne blanche sur la cathédrale de Gap, 10 avril 2019. © BEm

Cigogne noire *Ciconia nigra* – M, rare – 4 données

Pour 4 oiseaux différents : 1 en halte le 12/04 à Crots (EDuc), 1 en migration active le 19/04 à Eygliers (GBE), 1 autre en migration à Saint-Sauveur le 4/05 (Serge Allemand), et la dernière le 30/05 à Laragne (APa). On constatera que 3 données sur 4 en 2019 ont été renseignées en Haute-Durance. La Cigogne noire ne rechigne pas à traverser les reliefs. Le passage de cette espèce dans le département, bien que minime, y est probablement sous-estimé.



10. Cigogne noire, Eygliers, 19 avril 2019. © GBE

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* – M, peu commun – 53 données

Observations régulières en Haute-Guisane et sur le canton de la Grave (couple installé en Isère tout proche), par exemple 4 observations en une journée entre le Lauzet (Haute-Guisane) et la combe de Malaval (la Grave) le 20/02 (Erwan Leneveu). Observations régulières également de plusieurs individus dans le Valgaudemar,

qui fournit une très belle série de données, le Queyras (où il reste rare), la vallée de Molines-en-Champsaur et à Champoléon. Les individus déterminés sont Mistral et Simay (lâché dans les Baronnies en 2018). Simay observé le 4/04 dans le Valgaudemar (PSa). A noter un adulte et un jeune à Ristolas le 4/04 (Anthony Le Nozahic). Pour le moment, les Hautes-Alpes sont le dernier département des Alpes françaises où le Gypaète n'est pas nicheur ! Aucune donnée en vallée Etroite cette année...



11. Ambiance hivernale pour ce jeune Gypaète barbu (Simay, oiseau de deuxième année lâché en 2018 dans les Baronnies), la Chapelle-en-Valgaudemar, 4 avril 2019 © PSA

Vautour fauve *Gyps fulvus* – M, commun – 452 données

2 données en janvier, aucune en février. Arrivées notables à partir de fin mai, nouvelles arrivées début juillet, pic à la mi-août, encore quelques-uns en septembre puis octobre, par la suite quelques données isolées. La phénologie est globalement calquée sur celle des troupeaux. Les données hivernales sont surtout obtenues dans le sud-ouest du département, proche des sites de nidification drômois : 30 le 2/03 à Ribeyret (FLe), 20 le 10 à l'Epine (PRo). Premier hors de ce secteur le 27/03 à Châteauroux (MCo, PSa). 1 en déplacement le 28/04 à Réotier (EDuc), lors d'une séance de suivi de migration. Quelques beaux effectifs : 34 le 3/07 à la Roche-de-Rame (Anne Lozé), 45 le 4 à la Grave (Marie Françoise et James Illand) puis 50 le 6 (Willy Hudedet) et 60 le 14 (Jean-Marc Taupiac), des oiseaux prospectant le plateau d'Emparis, issus du dortoir estival des Quirilies. 25 oiseaux le 30/07 à Molines (Marie-Pierre Fache), 65 à Cervières le 2/08 (SMe)... Des curées

rassemblent jusqu'à 70 oiseaux le 6/08 au Goléon à la Grave (Antoine Marnat) et au moins 81 à Villar-Saint-Pancrace le 17/08 (EDuc) pour au moins 89 oiseaux au dortoir du pic de Maravoise. L'autre dortoir important du département est à Réallon avec 54 oiseaux le 17/08 (Daniel Aubert). Derniers gros effectifs le 24/09 à Champoléon avec une quarantaine d'oiseaux sur une brebis près du refuge du Tourond (Yvan Matthey). Encore quelques oiseaux en haute-Guisane le 26/10 (JPN, AMe). Un oiseau visiblement en difficulté, vu à plusieurs reprises du 14 au 24/12 en fond de vallée à Saint-Clément-sur-Durance, posé au bord de la route puis sur un pylône (Guy Calvet, ALe, SPe).



12. Vautour fauve et Chamois, Saint-Clément-sur-Durance, 24 décembre 2019. © SPe

Vautour moine *Aegypius monachus* – M, rare – 23 données

Données hivernales dans le sud du département, proches des sites de réintroduction drômois. 2 à Saint-André-de-Rosans le 11/01 (GFo), puis 2 les 7 et 21/12 autour de la décharge de Sorbiers (PMi). Noté en été dans le reste du département : 1 le 17/06 à Gap (GLa), 2 le 20 à Ribeyret (GFo), 1 le 3/07 près des chalets de la Taure à Villar-Saint-Pancrace (Anne Lozé), 2 sur une curée à Orcières (Sylvain Bouget) et 2 dans le Valestrèche à Champoléon le 19 (BTh) (les mêmes ?), puis 1 le 3/08 à Champoléon encore (ACI) ; 1 le 20/07 à Montmorin (Martial Botton), 1 le 10/08 sur le plateau d'Emparis à la Grave (Bruno Veillet), 1 le 13 à Éourres (Tom Vellard) (Absinthe, oiseau né en 2014 dans les Baronnies), 1 le 20 à la Cluse (HPo), 1 le 21 à la Motte-

en-Champsaur (TJo) et 1 à Montmaur le même jour (HPo), 1 le 25 à Névache (Joel Zerbib), 1 le 2/09 à la Faurie (Simon Milliet), encore 2 le 18/09 sur le plateau d'Emparis (Jean Deschâtres) et 1 le 29/10 à Ribeyret (GFo).

Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* – M, rare – 3 données

3 mentions dans le Rosanais entre mai et août, concernant des oiseaux probablement issus des sites de reproduction drômois.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* – M, rare – 4 données

A Eyglis : 1 le 25/04 (GBe), 1 le 27/04 (LBi), puis 1 le 2/05 (GBe). 1 le 7/05 en migration active dans le Champsaur à la Motte (TJo).

Aigle royal *Aquila chrysaetos* – NH, commun – 530 données



13. Aigle royal harcelée par une Corneille hybride noire x mantelée, Gap, 19 janvier 2019. © PSa

8 couples ont été observés fréquentant une aire en 2019 mais la reproduction n'a pu être confirmée que sur 4 avec 1 jeune à Champoléon (MCo, BTh), 1 jeune à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), 1 jeune à Trescléoux (APa, PAR), 2 jeunes à Réallon (HRI, GDe). Parades observées dès le 28/02 dans l'Embrunais (HRI). Une aire occupée du 29/03 au 26/04 dans le Rosanais (Andrew Hargreaves). Max. : 5

ensemble le 24/08 à Champcella (Simon Clavel). A noter la prédation d'un très jeune chamois observée le 10/05 dans le Champsaur (TJo), et l'observation d'un oiseau équipé d'un émetteur (posé par Envergures alpines) le 27/04 à Saint-Martin-de-Queyrières (EDuc).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* – NM, commun – 369 données

Premiers le 15/03 à Lazer (EDup), à la Freissinouse (RBe) et Tallard (RBe). Construction d'une aire le 17/03 dans le Gapençais (AHu). Premiers en Haute-Durance le 20/03 à Eyglis (SPe), puis le 22 et 23 à Réotier (LBI, DTo). Accouplements le 20/03 dans le Gapençais (EDup), le 21 autour de Veynes (AHu, RBe, MCo), une aire en construction dans le Champsaur le 22 (MCo). Reproduction suivie sur 13 nids : 5 dans le Gapençais, 2 dans le Champsaur, 1 dans le Rosanais, 4 dans le Buëch et 1 dans le Briançonnais mais avec seulement 5 jeunes avérés à Neffes (AHu), Sigoyer (EDup), Buissard (MCo), Savournon (GLI) et Lazer (APa). Il est probable que des données supplémentaires (PN Ecrins, CEN PACA, OFB) viennent compléter ce bilan pour la synthèse Rapaces nationale. Derniers oiseaux le 29/09 et 13/10 à Savournon (GLI).



6. Circaète Jean-le-Blanc, Tallard, 7 avril 2019. ©PSa

Aigle botté *Aquila pennata* – M, rare – 1 donnée

1 adulte clair le 10/08 à Ventavon (PMi).

Milan royal *Milvus milvus* – NMH, peu commun – 113 données



15. Milan royal, un bel oiseau de première année. Sorbiers, 9 novembre 2019. © PMi

Très belle série de données. 5 en migration active à Mikéou le 29/04 (EDuc), quotidien au passage dans la vallée à cette époque. Le Milan royal est nicheur dans les Hautes-Alpes depuis 2018. Le site de reproduction de 2018 dans le Gapençais est fréquenté à partir du 1/03 (EDup, COd). La femelle couve le 29/03 (AHu) et encore le 25/04, puis 2 poussins à l'aire à partir du 2/05 (OEy) et jusqu'au 6/07 (AHu). Reproduction possible dans le Champsaur mais rien à l'aire découverte en 2018 (MCo). Hors nidification, bien présent en Haute-Durance et dans le Rosanais, fixés par les décharges de Pralong et de Sorbiers : 6 à Pralong le 15/04 (GDh), 8 à Sorbiers le 26/10 (PMi), puis 12 le 9/11 (PMi), encore 10 le 21/12 (PMi), mais rien le 26 (RBe).

Milan noir *Milvus migrans* – NM, commun – 450 données

Premier le 9/03 à Embrun (HRI), puis le 12 à Rosans (GFo), le 13 à Bénévent-et-Charbillac (BTh) et 8 à Crots (JPC). Premier nid en construction le 17/03 à Neffes (AHu), puis un couple à l'aire le 20 à Saint-Bonnet-en-Champsaur (Philippe Pages), une aire en construction le 1/04 à Pelleautier (AHu), le 5 à Saint-Bonnet (OAJ), du 20/04 au 3/05 à Eygliers (GBe, JPN, APa). Encore un en migration active le 11 à Guillestre (EDuc), puis 17 à Mikéou le 14, 8 le 28, 10 le 29 (EDuc). Des nicheurs probables contactés à partir du 25/04 à Briançon (EDuc) et jusqu'au 15/08 (JPN) pour la deuxième année consécutive. L'espèce a tendance à coloniser la Haute-Durance depuis plusieurs années. Reproduction signalée à Saint-Eusèbe-en-Champsaur avec une aire occupée le 8/05 (TJo), à Eygliers avec une aire occupée du 21/05 au 26/06 (GBe), à Savournon, des jeunes au nid le 10/06 (GLI). Toujours d'importants rassemblements à la décharge de Ventavon, par exemple

40 le 10/08 (PMi) ainsi que 49 individus à Ribiers sur des fenaisons le 13/06 (APa). 34 en migration à Ristolas le 3/08 (Xavier Dolbeau). Derniers le 25/08 sur la décharge de Sorbiers (PMi). Une donnée hivernale le 6/12 à Avançon, non validée pour le moment.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* – M, peu commun – 13 données

Surtout contacté en migration au printemps (11 données). Premier le 26/03 à Gap (RBe), 1 à Curbans le 2/04 (OEy), 1 à Chorges le 4 (GLa), 1 à Mison le 8 (GBe) et le 25 (Georges Papegay). 1 mâle en migration active le 11/04 en Haute-Durance à Réotier (EDuc). Une femelle le 29/04 à Savournon (GLI), une autre le 1/05 à Saint-André-de-Rosans (Jean-François Gaberan), 1 mâle à la Motte-en-Champsaur le 10/05 (TJo), puis encore une femelle le 18/05 à Chorges (LBi) et un mâle à Eygliers le 20/05 (EDuc), dernier du printemps. Au passage postnuptial, 1 mâle à Champcella le 3/09 (LBi) et 1 mâle à Saint-André-de-Rosans le 16/09 (GFo).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* – M, rare – 5 données

Uniquement contacté au passage postnuptial : 1 mâle le 3/09 à Savournon (GLI), le suivant le 12/10 dans les cultures de Saint-Laurent-du-Cros (PMi). Une femelle le 19/10 sur l'aérodrome de Saint-Crépin (LBi), puis le dernier mâle le 25/11 à Upaix (Patrick Labour).

Busard cendré *Circus pygargus* – NM, rare – 13 données

Belle série de données printanières. 2 oiseaux le 20/04 à Prunières (APa), puis 1 femelle à la Rochette le 21 (COd). 3 mâles en chasse sur le plateau d'Herbonne à Châteauroux le 22/04 (APa), encore 1 le 24 dans les prairies alentour (Marjorie Tritz). 1 mâle à Laragne le 5/05 (Laurent Mifsud), 1 à Prunières le 9 (OEy). 1 femelle le 9/06 à la Bâtie-Montsaléon (PPro) : les milieux alentour sont favorables. Un couple détecté le 5/07 à Saint-Laurent-du-Cros (COd), avec un jeune volant vu le 6/08 (Philippe Millon), puis un couple et deux jeunes volants sur le même site le 8/08. Ces observations laissent penser que le Busard cendré a niché avec succès dans le département ! Les grandes prairies et cultures remembrées de Saint-Laurent-du-Cros sont tout particulièrement favorables à l'espèce.



16. Busard cendré 1a, Champsaur, 8 août 2019. Un oiseau né localement ? Il était accompagné d'un autre jeune et d'un couple... © PMi

Buse variable *Buteo buteo* – NMH, commun – 491 données

Premières parades les 1^{er} et 2/03 à Saint-Apollinaire et Ribeyret (FLe), les 13 et 15/03 à Gap et Sigoyer (EDup). Accouplement noté le 20/03 à Avançon (RBe), encore des parades le 13/04 à la Bâtie-Neuve. 1 femelle couve le 16/04 à la Salle-les-Alpes (RBa). Un oiseau construit un nid le 6/05 à Saint-Disdier (Aurélien Gaunet). Des jeunes juste volants les 21 et 23/08 à Sigoyer (EDup). Hors période de reproduction, notée dans l'ensemble du département, notamment Champsaur, Laragnais, Gapençais et Haute-Durance.

Bondrée apivore *Pernis apivorus* – NM, commun – 95 données

Première le 25/04 à Mison (Georges Papegay), puis le 3/05 à Oze (GLI), et de nettes arrivées à partir du 7 : 24 à Saint-Laurent du Cros (TJo), puis 16 le 9/05 à la Motte (TJo), 8 en migration active à Mikéou le 10 (EDuc). Un couple parade à Rabou le 22/05 (Claude Mauroy), un autre à Château-Ville-Vieille le 23 (APa), une autre le 2/06 à Saint-Firmin (EDup). Encore des parades le 26/07 à Orcières (Sylvain Bouget), le 28 à la Beaume (Sylvain Henriquet). Une donnée de reproduction certaine à Chabestan le 18/08 (GLI). Déjà 19 oiseaux en migration active le 11/08 à Puy-Sanières (HRI), puis 21 à Embrun le 30 (HRI), 18 le 5/09 (HRI). Dernière le 17/10 à Chabestan (GLI).

Epervier d'Europe *Accipiter nisus* – NMH, commun – 180 données

Noté partout et toute l'année. Premières parades le 28/03 à Châteauneuf-de-Chabre (Vianney Bajart). Seulement deux données de nidification certaine : 1 jeune au nid ou tout juste volant entendu le 7/08 à Monêtier-les-Bains

(Stéphane Thomin), 1 autre le 15 au Casset (Stéphane Thomin). Espèce toujours aussi discrète, la majorité des observations concernent des oiseaux en déplacement en plein ciel ou aux mangeoires en période hivernale.

Autour des palombes *Accipiter gentilis* – NMH, peu commun – 36 données

3 reproductions avérées avec 3 jeunes en Clarée (RBa), 2 jeunes en Guisane (RBa, EDuc) et un nourrissage dans l'Embrunais le 11/05 (EDuc). Un territoire occupé à Réotier (EDuc), comportements de parade observés du 14 au 29/04.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* – NMH, commun – 590 données

Premier accouplement le 16/01 à la Roche-des-Arnauds (EDup), des parades à Sigoyer le 15/03 (EDup) et le 20/04 à Freissinières, avec la femelle toujours au nid le 14/06 (RBa). Un nid occupé le 29/04 à la Bâtie-Neuve, 1 autre à Neffes le 1/05 (AHu +). Des transports de nourriture le 27/05 à Villar-Saint-Pancrace (RBa). Un nid occupé à Montmaur le 1/06 (VPa), un autre le 3/06 à Briançon, toujours occupé le 26 et le 10/07 (JPN), encore un le 17 à Ailefroide (RBa), le 24 à Saint-Martin-de-Queyrières (JPN) et le 15/07 à Villar-Saint-Pancrace (JPM). Un nid occupé sur un télésiège le 21/07 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (Vincent Lemoine). Dernière fréquentation de site de reproduction notée le 9/08 à Saint-Disdier (Alex Siciliano), et une famille le 11 à Champoléon (BGr). Peu de données hivernales (79) : sporadique en Haute-Durance, plus régulier dans le Laragnais, le Gapençais et l'Embrunais.

Faucon kobez *Falco vespertinus* – M, peu commun – 34 données



17. Faucon kobez mâle, Prunières, 20 mai 2019. © EDuc

Belle série de données uniquement printanières. Premier mâle précoce le 23/04 à Savournon (GLI), derniers le 23/05 à Savines (JPC). Contacté sur les sites classiques : 5 du 26 au 28/04 à Pelleautier (Thierry Vallée *et al.*), 4 à la Freissinouse (LBI) et 2 à Tallard (AHu) le 29/04, 2 le 30 à la Bâtie-Neuve (OEy). 1 femelle à Montgardin le 7/05 (APa), 1 femelle au Bersac le 17/05 (Pascal Rochas), 1 mâle à Saint-Crépin le 19 (LBI). Observé à Prunières à partir du 6/05 avec 2 femelles (JPC), puis 3 le 7 (APa), 4 le 10 (EDuc, APa, GBr). Nouveaux individus sur le même site à partir du 20/05 : 1 mâle adulte, 1 femelle adulte et 2 mâles 2a (EDuc, JPC), avec 4 oiseaux (3 femelles et 1 mâle) à Savines sur le site de Saint-Eyrié, tout proche, le même jour (JPC). Maximum du passage le 21/05 : 10 à Saint-Eyrié (GDh, APa), 5 à Serramande/Prunières (GDh, APa), 1 mâle 2a à Saint-Crépin (GDh) et 1 autre à Eygliers (GBE, GDh). Fin du passage brusque : derniers le 23/05 à Savines (JPC).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* – NM, peu commun – 33 données

Premiers le 23/04 à Crots (HRI), le 27 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ) et le 30 à Chorges (OEy). 2 probables reproductions à Savournon (GLI) et dans le Buëch aval (APa, VCo, MCo). Des oiseaux le 21/07 à Etoile-Saint-Cyrice (VCo, MCo). Derniers le 22/09 à Eyguians (APa) et le 27 à Savournon (GLI).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* – NM, peu commun – 69 données

7 territoires occupés en 2019 dont 3 dans le Champsaur (MCo), 1 en Haute-Durance (RBa, SPE), 1 à Réotier (EDuc), 1 à La Roche-de-Rame (EDuc), 1 à Saint-Clément-sur-

Durance (HRI) et 1 à La Bâtie-Neuve (MPe, OEy) produisant 3 jeunes à l'envol près de la ligne THT RTE. Accouplements notés le 22 et 28/02, le 4/03 (MCo), le 9/03 (HRI). Première aire occupée le 26/03 (RBa). Jeunes envolés notés à partir du 20/06 (anonyme).

Faucon émerillon *Falco columbarius* – MH, rare – 4 données

Trois données, un même lieu (le Bout du Plan à Crots) finalement « classique » pour cette espèce dans le département, et un même observateur (OEy) : 1 femelle le 29/03, un oiseau le 8/04 et un mâle adulte le 29/11. Bien que discret et passant sans doute inaperçu, l'émerillon semble être une vraie rareté dans le département.

Râle d'eau *Rallus aquaticus* – NMH, peu commun – 23 données

Des hivernants : 4 à Curbans le 13/01 (EDup), 1 le 21 à Valserres, recontacté le 24/03 (TFE), 1 à Mison le 27/02 (MDa), 1 à Pelleautier le 3/03 (EDup). Dernier de l'hiver me 31/03 à Mison (ADe). Un oiseau transporte des matériaux le 19/05 à Pelleautier (PRO). Seulement 3 autres données se rapportant à de potentiels nicheurs : 1 chanteur le 22/05 à Saint-Crépin (CHuFGr), 1 le 27 à Avançon (MCo), 1 le 2/06 à Saint-Eusèbe-en-Champsaur (MCo). Rien en juillet et août, premiers de l'automne le 17/09, deux oiseaux à Mison (PAR), vus au moins jusqu'au 15/12 (MDa, PNa). 1 le 12/12 à la Roche-de-Rame (GDh), revu le 28 (SPE).

Marouette poussin *Porzana parva* – M, rare – 1 donnée

1 femelle à Charance le 15/04 (RBe). Unique espèce de marouette notée en 2019, en un site pour le moins inattendu !



18. Marouette poussin femelle, Gap, 15 avril 2019. © RBe

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* – NMH, peu commun – 37 données

Deux sites de reproductions. A Charance : un couple avec 8 poussins le 15/04, plus que 3 le 19 (RBe), puis une seconde nichée, un couple et 5 poussins le 10/06 (RBe), notés jusqu'au 17 (plus que 3 poussins). A Pelleautier : 1 jeune le 21/07 (PSa). Hors période de reproduction, notée un peu partout où il y a de l'eau et de la végétation. 1 le 31/01 à Pelleautier (Yannick Queyras), 1 oiseau le 10/02 à Embrun (SPe), 1 (le même ?) le 21/03 (JPC), encore le 05/04 aux côtés d'une femelle de Harle bièvre (JPC). 1 le 26/04 dans l'adoux d'Eygliers (EDuc). Nicheurs possibles à Neffes le 2/05 (AHu +), Saint-Crépin le 29/05 (SPe)... Premiers migrateurs en halte le 28/08 à Réotier (RBa), le 1/09 à Méreuil (GLI), le 14/09 aux Alberts à Montgenèvre (JPN), 1 le 10 et le 30/10 à Eygliers (SPe, GBe), et plus classiquement au cours de l'automne à Mison (ADe). Un oiseau stationne aux Alberts du 24 au 29/11 (JPN).



19. Gallinule poule-d'eau et Harle bièvre, Embrun, 5 avril 2019. © JPC

Foulque macroule *Fulica atra* – NMH, commun – 318 données

Localisée. Niche depuis (au moins) 2010 en Haute-Durance sur le plan d'eau d'Eygliers. Premiers jeunes le 31/03 à Mison (ADe). Construction de nids le 17/04 à Eygliers (GBe, JPN), un nid garni le 26/04 à Eygliers (EDuc). 1 poussin à 1100 m à Saint-Eusèbe-en-Champsaur le 8/05 (TJo), des jeunes à Eyguians le 11/05. Premières nichées à Eygliers le 14/05 (GBe), encore un couveur le 19 (GDh), et des jeunes à Pelleautier le même jour (PRo). Des jeunes à Lardier-et-Valença le 30/05 puis le 13/07 (Valerie Enfoux, PMi), le 31 et le 13/06 à Rochebrune (EDup, TGi), le 22/06 à Vitrolles (COd). Encore des jeunes (4^{ème} nichée) le 26/06 puis le 21/07 à Eygliers (GBe, Solène Baguet), Pelleautier (PSa), Eyguians (MCo), le 4/08 à Méreuil (GLI), derniers le 28/08 à Eygliers (RBa) et à Eyguians (Adrien Charbonneau). En hiver, surtout à Mison et Curbans, Pelleautier aussi, Eygliers et ponctuellement autour de Serre-Ponçon. 10 oiseaux à Pelleautier le 3/01 malgré le gel quasi-intégral du lac (PSa), 1 le 5 à Eygliers dans les mêmes conditions

(LBi). 34 oiseaux à Rousset au pied de Serre-Ponçon le 11/01 (MCo), 63 à Lazer le 12/01 (APa), 32 le 5/02 à Vitrolles (EDup). Premiers mouvements postnuptiaux décelés dès fin juin : 2 le 25/06 à Saint-Julien-en-Champsaur (Gilbert Billard), puis 1 à Crots le 31/07 (NAL), 1 à Siguret et 1 à Embrun le 6/08 (Yannick Mourgues, NAL), 2 à l'étang du Laus (Saint-Eusèbe-en-Champsaur) le 20/08 (TJo). Retours massifs dans la première décade de septembre avec déjà une centaine à Pelleautier le 3/09 (GBe). 1 jeune en halte le 4/09 aux Alberts (JPN). Notée tout l'hiver en petits groupes à Eygliers. Max. de milieu d'hiver : 200 à Mison le 7/01 (APa, ADe). Max. atteint en milieu d'automne : 250 à Mison le 16/10 (MDa, PNa).

Grue cendrée *Grus grus* – M, rare – 10 données

Au printemps : 38 en migration au col Bayard (Sylvie Boyer) le 26/02 et 1 à Charance le même jour (PSa), 2 le 27/02 à Chorges (GLa), 200 le 3/03 à Tallard (Thierry Vallée). A l'automne : 1 migrateur nocturne passe devant la Lune le 5/10 à Crots (MDa), 6 à Sigoyer le 5/11 (EDup), le 6/11, 12 à Pelleautier (PSa), 6 à Sigoyer (Thierry Vallée), 12 à la Freissinouse dans un champ inondé (Etienne Trautmann). 3 dernières le 23/11 à la Bâtie-Neuve (Léa Roux).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* – M, rare – 1 donnée

5 oiseaux sur les vasières (exceptionnellement exondées à cette époque) de Serre-Ponçon à Crots le 25/08 (EDuc). Les dernières données de cette espèce dans les Hautes-Alpes remontent à 2005 et 1992 !

Echasse blanche *Himantopus himantopus* – M, peu commun – 17 données

Première le 4/04 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ), puis 5 le 16/04 (OAJ, AJo). 1 à Eygliers le 6/04 (LBi, GDh), 4 à Mison (ADe) et 2 à Crots (EDuc) le 26/04, puis 1 du 17 au 20/05 à Crots, Embrun et Puy-Sanières (HRi, EDuc, GDh). Encore 6 à Réotier (LBi) et 4 à Eygliers (SPe) le 12/06. 6 le 20/07 à Crots (JPC), 2 le 21 à Pelleautier (PSa), dernière donnée le 3/08 à Crots (Pierre-Louis Gamelin).

Petit Gravelot *Charadrius dubius* – NM, commun – 109 données

Premier le 9/03 au plan d'eau du Champsaur (MCo), le suivant le 17 à Saint-Bonnet (OAJ), puis le 20 (Philippe Pages), le 27 à Saint-Laurent-du-Cros et à Saint-Julien (OAJ). Plus précoce dans le Champsaur qu'en Haute-Durance, les oiseaux précoces sont probablement des

migrateurs en halte utilisant le sillon alpin comme couloir de migration. Premier en Haute-Durance le 28/03 à Chadenas sur les vasières de Serre-Ponçon, puis 4 le 30 (HRI). Nicheurs installés dès le 31/03 en Haute-Durance (EDuc), avec un accouplement le 23/04 (GBE). Des nicheurs notés dès le 16/04 sur le Drac (OAJ, AJo). Encore des petits groupes de migrateurs en halte fin avril : 10 à Crots et 12 sur l'aérodrome de Saint-Crépin le 26 (EDuc). Un mâle territorial le 20/05 à Saléon sur le Buëch et le Céans (APa), un oiseau le 31/05 à Théus et un le 1/06 à Espinasses (EDup). Des oiseaux cantonnés sans preuve de reproduction sur le Drac en mai-juin (ACI, OAJ...). Des nicheurs tentent de s'installer sur les grandes vasières sèches de l'amont de Serre-Ponçon, entre Chadenas et le Liou, à la faveur d'un niveau du lac exceptionnellement bas pour la saison (-13 mètres). Des coquilles d'œufs éclos et 2 poussins sont notés le 1/06 (HRI), un nid avec adulte couvant est découvert le 27/06 (JPC), avec crainte de noyade du nid suite à l'augmentation du niveau de l'eau, mais finalement, 1 poussin noté le 6/07 (HRI), près d'un nid avec œufs et un autre nid avec des coquilles. Derniers le 30/09 à Crots. Le Petit Gravelot ne niche plus dans le Briançonnais depuis plusieurs années, l'unique site de reproduction sur la Durance (île Saint-Jean à Villar-Saint-Pancrace) ayant été profondément altéré par les multiples activités voisines.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* – M, rare – 14 données

Sur 2 sites. 3 données à Saint-Julien-en-Champsaur : 4 le 8/05 (TJo), 2 le 10 (OAJ) et le 11 (TJo). Belle série de 11 données dont 9 printanières à Serre-Ponçon : 3 (précoces !) le 19/03 à Savines (OEy), 2-3 oiseaux à Crots du 9 au 11/05 (HRI, EDuc), puis 1-2 oiseaux du 17 au 21/05 (HRI, EDuc). 1 le 5/08 à Crots (NAL), 1 le 5/09 (HRI).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus* – M, peu commun – 7 données

Toute petite série : premier (ad.) le 21/08 à Montmaur (HPo), 7 le 27/08 à Réotier, 2 le 28/08 à Saint-Chaffrey, et 4 le 7/09 sur le pic de Bure. L'attrait de l'espèce en halte migratoire pour les sites d'altitude la rend sous-détectée. A noter tout de même une remarquable donnée printanière et qui plus est en vallée : 1 adulte le 5/05 sur l'aérodrome de St-Crépin (LBI).

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* – M, peu commun – 20 données

Au printemps, premier le 11/02 à Chorges (APa), puis 5 à Ventavon le 18 (EDup), 16 à Chorges le 25 (GLa) et les 2

derniers à Méreuil le 30/03 (GLI). Premier automnal le 8/09 à Eygliers (LBI). Quelques oiseaux stationnent à Serre-Ponçon du 23/09 au 25/10, avec en exergue 5 à 7 le 26 (HRI, JFA), 15 le 6/10 (HRI) et 7 le 8 (HRI). Max. de 100 oiseaux à Eygliers le 3/11 (CCo). Un migrateur en halte le 16/11 au col du Festre (Agnières-en-Dévoluy) à 1440 m au bord de la route, sur le seul endroit déneigé (Thierry Vallée). Dernier le 23/11 à Eygliers (GDh).

Combattant varié *Philomachus pugnax* – M, rare – 4 données

1 le 16/04 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ, AJo), 1 le 13/05 à Crots (LBI), et 1 le 10/09 à la Freissinouse (LBI).

Bécasseau sanderling *Calidris alba* – M, rare – 1 donnée

1 le 10/09 à Crots (HRI). Sixième donnée pour le département, la dernière en 2017.

Bécasseau variable *Calidris alpina* – M, rare – 6 données

Données exclusivement postnuptiales. 1 oiseau noté dès le 4/08 puis le 19/08 à Crots (HRI), 1 adulte au même endroit le 25/08 (EDuc) et le 27 (HRI). Encore 1 jeune à Crots le 22/09, puis un dernier oiseau le 2/11 à Pelleautier (PSa).

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* – M, rare – 3 données

1 du 19 au 21/05 à Crots, sur les vasières de Chadenas (HRI), 1 jeune le 25/08 au même endroit (EDuc).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* – M, rare – 2 données

2 jeunes oiseaux sur les vasières de Serre-Ponçon à Crots du 29/08 (EDuc) au 5/09 (HRI).

Bécasseau minute *Calidris minutus* – M, rare – 1 donnée

2 le 21/05 à Embrun sur les vasières de Chadenas (GDh).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* – M, peu commun – 31 données

Noté sur 4 sites. Belle série de données printanières, plus discret en été. Premier le 11/04 à Eygliers (SPe, JPN), suivant le 15 à Crots (HRI). A Eygliers : 1 du 16 au 20/04 (SPe, GBE, JPN), 1 le 25-26/04 (GBE, GDh, EDuc). 4 au plan d'eau du Champsaur le 16 (OAJ, AJo), puis 12 et 3 le 22 (OAJ), encore 2 le 8/05 (TJo). 6 oiseaux à Crots le 26/04 (EDuc), puis 2 le 20/05 (HRI, EDuc), derniers du printemps.

Rien en juin, premiers retours fin juillet : 3 à Arvieux au lac de la Favière, près du col de Néal, le 25/07 à 2500 m (BDu). Peu noté par la suite : 1 oiseau stationne à Crots du 25/08 (EDuc) au 5/09 (HRi).



20. Chevalier sylvain, Eyglies, 25 avril 2019. © GBe

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* – M, commun – 69 données

Premiers le 7/03 à Embrun (LBi) et Saint-Bonnet (OAJ), suivan le 14 à Eyglies (GBe) puis le 19 à la Roche-de-Rame (JPN). Intensification du passage à partir de la troisième décade de mars : 1 à Eyglies (SPe) et 1 à Crots (HRi) le 20 et le 21 (Gaëtan Jouvinez), 3 à Saint-Crépin le 26 (CHuFGr), 1 à Saint-Laurent-du-Cros le 27 (OAJ), 2 à Curbans (OEy) et 3 à Chadenas (HRi) le 2/04, 2 sur le lac de la Roche-de-Rame le 3 (SPe)... A noter 4 au lac de Roue à Arvieux le 19/04 (Florian Ehmke). Derniers du printemps le 27/04 à la Saulce (AHu †). Rien en mai. Premiers retours dès le 3/06 : 1 à Mison (PAR). Suivant le 3/07 à 2270 m au Refuge de Vallonpierre à la Chapelle-en-Valgaudemar (Willy Hugedet). Classiquement noté à haute altitude en été, surtout en août : 2 à 2220 m dans le vallon d'Arsine le 30/07 (EDuc), 1 à Orcières le 8 (Caryle Charton), 1 au pied du col à Villar-d'Arène le 9 (Stéphane Ledauphin). 2 le 25/08 à Crots (EDuc), 4 en bord de Durance à Upaix le 27 (MCo), dernier le 28/09 à Crots (LBi).

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* – NM, commun – 255 données

Des hivernants ! 1 à Crots et 1 à Rousset le 13/01 lors du comptage Wetlands (Michel Bouche/PNE). Premiers retours début avril : 1 le 4 à Saléon (APa), 1 le 5 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ), 2 à Savines le 7 (LBi). Premiers nicheurs possiblement cantonnés le 11/04 à Réotier (EDuc). Noté quotidiennement en avril, nettes arrivées à partir de la troisième décade : 4 à Eyglies le 19 (SMe), 4 à Saint-Bonnet le 21 (MCo, BTh), 9 autour du plan d'eau du Champsaur (OAJ) et 4 à la Roche-des-Arnauds le 22 (Fabien Garcia), 4 à Embrun (HRi) et 1 à Champoléon (BTh) le 23, 4

à Saint-Crépin (JPN) et 5 à Crots (HRi) le 24. Blocage météo le 26 : au moins 35 à Crots (EDuc). Comportements territoriaux plus marqués à partir de fin avril : un couple à Serres (Thomas Ruckli) et des parades à Eyglies le 27 (GBe). Bien présent aussi en Moyenne-Durance (Remollon, Rochebrune, Théus) : nombreux oiseaux, probablement cantonnés, le 29/04 (TGi). Des nicheurs sur le Drac autour de Saint-Bonnet le 5/05 (TJo), en Clarée aussi : 2 le 12/05 à Val-des-Prés (JPN) et 1 les 14 et 15/07 à Névache (Jean-Pierre Van Wambeke). Des poussins notés le 5/07 à Réotier sur la Durance (Eliane Manière). Premiers mouvements et regroupements postnuptiaux à partir de début août : 8 à Crots le 3/08 (Pierre-Louis Gamelin), 6 le 7/08 (EDuc), 15 le 19 (HRi) puis 26 le 22 (HRi), encore 12 le 25 (EDuc), puis 17 le 27 (HRi), 11 le 10/09 (HRi), 17 le 12 (EDuc) et encore 15 le 21/09 (OEy). Derniers : 1 le 24/09 à Pelleautier (PSa), 1 le 29 à Eyglies (GBe), 1 le 6/10 à Briançon (JPN). Une donnée encore très hivernale : 1 le 15/12 à Crots (LBi).



21. Chevaliers guignettes en parade, Eyglies, 12 mai 2019. © GBe

Chevalier gambette *Tringa totanus* – M, rare – 10 données

Uniquement des données printanières, s'étalant du 26/04 au 23/05. 1 à Eyglies (SPe) et 1 à Crots (EDuc) le 26/04. Contacté uniquement sur Crots par la suite avec un maximum notable de 10 oiseaux le 21/05 (HRi, GDh).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* – M, peu commun – 26 données

Une série correcte de données printanières : premier le 14/04 à la Roche-des-Arnauds (Fabien Garcia), puis 8 le 16 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ, AJo), 2 le 17 à Eyglies (SPe, GDh, GBe), 1 à Crots du 20 au 24 (LBi, HRi) puis 4 le 26 (EDuc), 1 le 22 à Saint-Laurent-du-Cros (OAJ). Encore 1 le 5/05 à Crots (HRi), 1 à Guillestre le 6 (LBi), dernier du printemps le 7 à Saint-Laurent-du-Cros (COd). Premier de l'automne le 25/08 à Crots (EDuc), noté régulièrement par

la suite (sans doute pas le même oiseau) sur le même site jusqu'au 2/10 (HRI).

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* – N, peu commun – 7 données

Une seule donnée de reproduction possible obtenue cette année provenant d'un mâle en croule à Saint-Jean-Saint-Nicolas le 20/04 (MCo). 1 à Pelleautier le 8/01 (TVa), 1 à Neffes le 10 (AHu), puis encore 1 à Pelleautier le 8/03 (AHu). Un oiseau le 26/10 au Bersac (GLI) et le 1/11 à Arvieux (Charlie Bodin). Un oiseau mort trouvé le 18/02 à Ventavon (EDup). Les données des chasseurs ne sont pas prises en compte ici.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* – MH, peu commun – 13 données

Première migratrice le 20/03 à Saint-Bonnet (Philippe Pages), puis 2 le 4/04 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ) et 1 à Crots le 13 (HRI). Dernière le 27/04 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ). Retours dès le 5 septembre, 1 à Crots (HRI), qui stationne jusqu'au 22 (HRI). 2 à Mison le 26/09 (ADe). C'est tout !

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* – M, commun – 110 données



22. Mouette rieuse et Garrot à œil d'or, Embrun, 29 décembre 2019. © GBe

Très rare cette année hors Serre-Ponçon, où elle est notée toute l'année. 46 hivernantes le 13/01 à Crots (Michel Bouche/PNE). Maximums hivernaux : 55 le 21/01 (JPC), 40 le 29/12 (GDh). En migration, 45 le 18/10 puis 57 le 24 (HRI), encore 37 le 8/11 et 34 le 17, puis 27 le 26 (HRI), encore 22 le 27 (EDuc). Au printemps, max. de 78 le 3/03 (LBi). Maximums estivaux : 29 le 6/07 à Crots, 34 le 4/08, 32 le 19 (HRI). Dans les observations notables : 1 au plan d'eau du Champsaur le 7/03 (OAJ), 1 à Eygliers le 26/04 (SPe), 2 à Pelleautier le 28/05 (PPro), 1 en halte à Eygliers le 17/09 (SPe, GBe).

Goéland cendré *Larus canus* – MH, rare – 4 données

Toujours très rare dans le département. 4 oiseaux (1 imm. et 3 ad.) le 10/01 à Crots (LBi), puis 1 adulte entre Serre-Ponçon et la décharge de Pralong les 12 et 13/01 (LBi).

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* – M, rare – 1 donnée

1 adulte le 12/06 à Eygliers (SPe) sur une isle de la Durance aux côtés d'une Échasse blanche et d'une femelle de Harle bièvre, pour une vision totalement improbable dans les Hautes-Alpes !



23. L'une des images les plus marquantes de cette année ornithologique 2019. Mouette mélanocéphale, Échasse blanche et Harle bièvre (si, si !), Eygliers, 12 juin 2019. © SPe

Goéland leucophée *Larus michahellis* – NMH, commun – 286 données

Un couple nicheur noté du 8 au 12/05 sur une isle du Drac à la Fare-en-Champsaur (TJo), probablement déjà cantonnés dès le 15/02 (GLa). Au moins 500 à 700 hivernants sur Serre-Ponçon (LBi, Michel Bouche/PNE). De gros effectifs à Serre-Ponçon en fin d'été : 580 le 19/08, 630 le 22 (HRI), 650 le 26 (JPC), 760 le 6/09 (LBi). La présence de telles densités dépend de décharges : les oiseaux de Serre-Ponçon s'alimentent sur la décharge de Pralong en amont d'Embrun. Des centaines d'oiseaux à Ventavon autour du centre d'enfouissement des déchets du Beynon : 500 le 6/01 (APa, ADe), 2000 le 12/10 (APa) par exemple.

Goéland pontique *Larus cachinnans* – MH, rare – 6 données

Même si elle est probable, la présence du Goéland pontique n'a pour l'instant jamais été établie avec certitude dans le département. Toutes les données de 2019 sont douteuses et se rapportent à des oiseaux immatures observés dans l'Embrunais (Serre-Ponçon et décharge de Pralong).

Goéland brun *Larus fuscus* – MH, peu commun – 22 données

Uniquement sur Serre-Ponçon. Noté en hiver et au printemps, dernier le 1/06 à Puy-Sanières (HRI). Premier de l'automne le 4/09 à Crots (LBI).

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* – M, rare – 2 données

6 oiseaux en halte sur Serre-Ponçon le 10/09 (HRI) : 4 à Crots et 2 à Puy-Sanières.

Guifette noire *Chlidonias niger* – M, peu commun – 21 données

Première le 16/04 sur le plan d'eau du Champsaur (AJo). 11 à Embrun le 24/04 (HRI) puis 15 à Crots le 26, sous la neige (EDuc). 5 à Mison le 25 (APa, ADe). Dernière du printemps le 27/04 à Mison (GLI). En fin d'été, 4 à Pelleautier le 22/08 (EBe), puis 4 le 30 (PSa, OEy), et 2 le 3/09 (GBe), et encore 5 le 13 (LBI). 2 sur le plan d'eau d'Embrun le 11 (LBI), 1 jeune à Crots le 12 (EDuc), puis quelques oiseaux notés sur le secteur du 26/09 (HRI) au 2/10 (HRI), dont 3 le 29/09 (MMo).

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* – M, rare – 2 données

1 le 21/05 à Crots et Embrun (HRI, GDh).

Pigeon biset domestique *Columba livia domestica* – NH, commun – 219 données

Toujours localisé dans le département. L'espèce a fortement progressé à Briançon ces dernières années. Nourrissages de jeunes du 4 au 7/06 à Briançon (JPN), puis le 25 (EDuc). Quelques données d'altitude, hivernales qui plus est : une quarantaine à la station des Orres (1700 m) le 11/02 (Brigitte Iozia), 4 à Abriès (1550 m) le 13 (Laurent Mifsud), 2 à Névache (1600 m) le 28 (FLe). D'autres données estivales d'altitude : 2 le 20/04 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (1300 m) (PFo), 3 aux Terrasses à la Grave (1760 m, Haute-Romanche) le 12/08 (EDuc), 6 à Abriès (1580 m) le 20/08 (Laurent Mifsud). Outre Briançon, présent à Embrun, à Gap, à Saint-Bonnet, Rosans, Sigoyer, Chorges, la Bâtie-Neuve, Serres, Barret-sur-Méouge, Veynes... On notera que c'est le rigoureux Jean-Pierre Niermont qui fournit l'immense majorité des données de cette espèce...

Pigeon colombin *Columba oenas* – NM, rare – 4 données

Migrateurs : 2 le 1/03 à Réallon (FLe) et 1 tardif le 29/04 à Réotier (EDuc). A l'automne, 1 à Eygliers le 6/10 (LBI). Une seule donnée de nicheur possible : 1 mâle chanteur au Noyer le 29/03 (MCo).

Pigeon ramier *Columba palumbus* – NMH, commun – 429 données

Réandu dans le Laragnais, et surtout le Gapençais et le Champsaur, bien plus localisé ailleurs. Premiers chanteurs le 23/02 à Ventavon (APa) et Gap (Sébastien Bara), puis le 28 à Saint-Michel-de-Chaillol (Sébastien Bara). Des chanteurs notés dès lors un peu partout, par exemple le 3/03 à Chaudun (MCo), le 5 à Sigoyer (EDup) et Remollon (ALé), le 8 à Champoléon (BTh), le 12 à Montmorin (GFO), le 14 à Manteyer (RBe), le 16 à Saint-Léger, Chabottes, Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), le 22 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (MCo), le 23 au Glaizil (VCo), à Poligny et Ancelle (MCo)... Bien plus tardif (d'un bon mois) côté Haute-Durance et Briançonnais : premier chanteur le 24/03 à Saint-Chaffrey (SPe), 1 à la Roche-de-Rame le 31 (SPe), 1 à Eygliers le 2/04 (JPN), 4 à Freissinières le 20 (RBa)... Un nid en construction le 6/05 à Remollon (ALé), un œuf éclos le même jour à Trescléoux (APa). 2 à Montgenèvre le 12/05 (JPN) et 1 jusqu'au 3/07 (JPN), probablement des nicheurs locaux, 1 à Saint-Chaffrey et 1 à Saint-Martin-de-Queyrières (JPN, RBa) le 14... A noter 2 oiseaux le 18/06 à 1750 m à Château-Ville-Vieille (Françoise Chevalier) (seuls nicheurs possibles notés dans le Queyras cette année), 1 le 5/07 à Entre les Aygues (1600 m) à Vallouise (MCo), 1 le 10/07 à 1700 m à Monétier (EDuc), puis un chanteur le 16 à 2120 m (EDuc) dans le même secteur. Un jeune juste volant avec des adultes le 29/06 à Savournon (GLI). Encore des chanteurs le 20 et 21/03 à Etoile-Saint-Cyrice (VCo, MCo), jusqu'au 12/08 dans le Valestrèche (1700 m) à Champoléon (MCo), dernier chanteur le 19/08 à Rochebrune (Sylvie Bedjai Voisin) et dernier couple cantonné le 20 à Châteauneuf-de-Chabre (APa). Hors nidification, noté à l'unité ou en petits groupes. Quelques migrants printaniers : 3 à Saint-Martin-de-Queyrières le 27/04 (EDuc), mieux noté à l'automne : 30 migrants le 12/10 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (AFI), au moins 500 à Sorbiers le 26 (PMi).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* – NH, commun – 624 données

Premiers chanteurs le 12/02 à Briançon (JPN), puis le 15 à Baratier (Paul Sarlin) et Chabottes (MCo). Une seule donnée de nicheur : un oiseau couve le 22/04 à Gap (Marie-George Serie). Hors nidification, max. de 16 à Briançon le 1/01 (Benjamin Bruno), 19 à Saint-Julien-en-

Champsaur le 30/01 (OAJ), 25 à Eyguians le 14/12 (APa). Notée sur Briançon, l'Embrunais et le Gapençais, principalement, mais là encore, une grande partie des données provient du même observateur, traduisant un faible effort de renseignement général pour cette espèce...

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* – NM, peu commun – 96 données

Premières le 28/04 à Saint-Firmin (Yannick Bouvet) et à Neffes (AHu), 1 le 29 à l'Epine (Rémi Metais), 1 à Chorges le 30 (OEy). Notée quasi-quotidiennement en mai et juin, bien présente hors des massifs internes : des chanteurs à Neffes (AHu), à Eyguians dès le 2/05 (APa), à Sigoyer dès le 4 (EDup), à Savournon le 7 (GLI), à Lazer le 11 (APa), à Laragne le 15 (APa), à Trescléoux le 18 (APa), au Poët le 21 (TGi)... Un couple au Bersac le 27 (GLI), un autre à Lardier-et-Valença le 30 (Valerie Enfoux), 2 à Ribeyret le 11/06 (GFo), 2 chanteurs à Aspres-s/-Buëch et 1 à Aspremont le 30 (MCo)... Encore des migrateurs de passage en mai : 1 à Embrun le 9 (HRI), 1 à Eygliers (GBE) et à Prunières le 10 (GBr). Quelques nicheurs semblent remonter de la Moyenne-Durance jusque dans le pays Caturige, l'Embrunais et le Guillestrois : 2 chanteurs à Crots du 12/05 au 14/06 (JPC, CME), probablement jusqu'au 24 (HRI), 2 puis 1 à Chorges du 22/05 au 3/08 (GLa), possiblement le même observé le 4/08 et le 1/09 (JFA), 1 à la Bâtie-Vieille le 30 (JFA), 1 à Théus le 13/06 (TGi), 1 chanteur à Remollon le 18 (ALÉ), 1 à Rochebrune le 11/07 (EDuc, MCo). Un oiseau le 27/07 à Embrun (HRI), dispersant ? Migrateur ? Une famille probable notée le 31/07 à Trescléoux (APa). Passage postnuptial peu marqué, 1 à Embrun le 4/08 (HRI), 1 à Sigoyer le 9 (Mathieu Robert), 1 à Lardier-et-Valença le 1/09 (PMi), dernière le 15 à Briançon (JPN).

Coucou gris *Cuculus canorus* – NM, commun – 537 données

Premiers fin mars, mais de nettes arrivées dans les derniers jours d'avril. Premier le 30/03 à Neffes (AHu), puis 1 le 31 à Savournon (GLI), à Saint-Michel-de-Chaillol (MCo) et à Chorges (OEy), ou encore 1 à Bruis le 8/03 (GFo). Première vague d'arrivées décelable à partir du 11/04 : 2 à Gap (AGi), 1 à Sigoyer (EDup), le 12, 1 aux Vigneaux (Brice Olivero), 1 à Jarjayes (RBe)... Arrivées nettes le 19/04, puis noté vraiment partout à partir du 26/04. En dessous de 1300 m, pic durant la première décade de mai, 1 mois plus tard au-dessus de 1300 m. A partir de fin mai, moins noté à basse altitude. Très présent dans le Champsaur, le Gapençais et le Briançonnais. Dernier chant le 24/07 à Abriès (BDu), 1 migrateur en halte le 5/08 à 2600 m à Embrun (RBa), 1 le 17/08 au Casset (Stéphane Thomin). Dernier le 29/08 à Gap (MCo).



7. Jeune Coucou gris, le Casset, Monêtier-les-Bains, 17 août 2019. © Stéphane Thomin

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* – N, peu commun – 35 données

8 territoires occupés en 2019 avec une seule reproduction avérée à Briançon (EDuc, AMe, BDu) et une présence régulière à Orcières (GRo), Mont-Dauphin (LBI, SPe). Des contacts ponctuels à La Roche de Rame (SPe), Savournon (MCo), Saint-Jean-Saint-Nicolas (P. Tirefort). A noter une donnée très intéressante d'un oiseau en falaise à 2055 m en Haute-Guisane le 17/08 (RBa), sans suite. Nicheur potentiel ou jeune oiseau déjà en dispersion ? En France, la nidification du grand-duc n'est pas connue au-delà de 2000 m...

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* – N, rare – 92 données

Un bilan complet est disponible sur le site du réseau national de conservation "Petites chouettes de montagne" https://issuu.com/lpomissionrapaces/docs/tengmalm_chevec_hette_29_30_web

71 contacts positifs répartis sur 36 sites ont été réalisés sur la période août 2018-juillet 2019. 5 nouveaux sites ont été découverts portant le nombre total connu à 144. La plupart des contacts sont printaniers parmi lesquels 9 nidifications relevées mais seulement 3 pour lesquelles des jeunes ont pu être confirmés. L'essentiel des données se concentre dans le Champsaur, le Dévoluy et le Guillestrois, seulement une donnée dans le Briançonnais cette année ! En 2019 : 36 contacts négatifs, 56 contacts positifs. *Bilan rédigé par Marc Corail.*



25. Chouette de Tengmalm, Saint-Michel-de-Chaillol, 19 juin 2019. © AHu



26. Jeunes Chouettes de Tengmalm au nid, Champcella, 3 août 2019. © RBa

Chevêchette d'Europe *Glaucidium passerinum* – N, peu commun – 217 données

Un bilan complet est disponible sur le site du réseau national de conservation "Petites chouettes de montagne"
https://issuu.com/lpomissionrapaces/docs/tengmalm_c_hevechette_29_30_web

131 contacts positifs répartis sur 51 sites ont été réalisés sur la période août 2018-juillet 2019. 4 nouveaux sites ont été découverts portant le nombre total connu à 162. Sur les 51 sites relevés positifs, 20 ne sont concernés que par des contacts automnaux. Parmi les 31 autres sites recensés en période de nidification, 9 reproductions ont pu être confirmées totalisant au moins 25 jeunes envolés. En 2019 : 117 contacts négatifs, 100 contacts positifs.



27. Chevêchette d'Europe, Orcières, 3 mars 2019. © MCo



28. Chevêchette d'Europe, Laye, 30 avril 2019. © MCo

Hibou moyen-duc *Asio otus* – N, peu commun – 14 données

6 contacts concernant le Champsaur en particulier le plateau de Tresserre (MCo), 3 le Dévoluy (VPa, MCo), et 2 dans le Gapençais (GLa, MCo). Un oiseau en altitude le 19/07 à 2070 m au sentier des Crevasses (JBi). A signaler un individu retrouvé noyé au lac Escur à 2300 m le 15/08 (SPe).

Chouette hulotte *Strix aluco* – N, commun – 92 données

L'essentiel des observations se concentre dans le Champsaur (MCo, OAJ, GRo), le Gapençais (EDup, JFAz, MPr), le Guillevois (Renaud Le Roy) ou encore à Savournon (GLI, MCo). Une seule mention de reproduction au bord du Drac (MCo). Quelques données au-delà de 1700 m : 1710 m à Saint-Léger le 1/04 (MCo), 1730 et 1765 m à Saint-Michel-de-Chaillol le 21 et 30/04 (MCo), 1825 m à Molines le 14/08 (Philippe Colin). On peut s'étonner de la quasi-absence de données dans le Bochain, le Laragnais, le Rosanais, le Queyras et l'Embrunais.

Effraie des clochers *Tyto alba* – N, rare – 2 données

Rare dans le département mais probablement sous-détectée. 1 à Rosans le 17/03, 1 à Saint-Eusèbe-en-Champsaur le 22/11 (Johanna Deville).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* – N, rare – 9 données

Nidification probable ou possible sur deux sites dans le Gapençais et le Laragnais. Un contact le 16/09 à Savournon (GLI). Le statut de l'espèce mériterait d'être précisé et actualisé, de nombreux secteurs en déficit de données apparaissent favorables dans le sud du département.



29. Chevêche d'Athéna, la Roche-des-Arnauds, 21 février 2019. © RBe

Petit-duc scops *Otus scops* – N, commun – 123 données

L'essentiel des observations se concentre dans le val de Durance jusqu'à Briançon, le bassin gapençais et le Buëch. Aucune reproduction n'a pu être confirmée en 2019. Premier chanteur le 30/03 à Chorges (OEy), puis le 2/04 à Savournon (GLI). Il faut attendre le 12 pour les entendre à Briançon (EDuc). Derniers le 23/08 à Orpierre (Meike Albert)


Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* – N, peu commun – 49 données

L'essentiel des données se concentre sur le Serrois et le Laragnais (APa) notamment à Savournon (GLI) mais aussi dans le Gapençais (GLa, MCo, Edu,TFe) et le Guillestrois (GDa, MGS). A signaler dans le Dévoluy cette rare mention de nid avec 2 jeunes à 1530 m d'altitude (Guilhem Barneix) et ces 3 données d'altitude dans les adrets du Champsaur à 1720 et 1930 m d'altitude (MCo) ainsi qu'à 1630 m à Réallon (HRI).

Martinet noir *Apus apus* – NM, commun – 467 données

Tardif cette année. Premiers le 18/04 (!) à Eyglies (CCo), les suivants le 24 à Savournon (GLI), Serre-Ponçon (HRI), Eyguians (APa). Premiers nicheurs sur sites de nidification notés dès le 27/04 à Serres (Thomas Ruckli), le 30 à Remollon (Sylvie Bedjai Voisin). Nettes arrivées la dernière décade de mai, départs massifs dans les tout premiers jours d'août. Noté nicheur exclusivement en ville, donc classiquement très peu de données au-delà de 1500 m. Premier nid occupé le 25/05 à Barret-sur-Méouge (Francis

Lloret), un autre le 2/06 à Ceillac (LBo). Une cinquantaine de couples sur le lycée Dominique Villars à Gap (Valerie Enfoux). Un nid occupé le 17/07 à Saint-Véran (BDu). Mouvements migratoires notés le 3/08 à Saint-Julien-en-Champsaur (CME). Sporadique à partir du 6/08, désertent Briançon le 10 (RBa). Derniers le 29/08 à Pelvoux (Dominique Robin).



8. Phénologie de la nidification du Martinet noir en 2019

Martinet à ventre blanc *Tachymarptis melba* – NM, peu commun – 77 données

Bien peu de nicheurs, la majorité des données concernent des migrants. Premier le 21/03 à Eyglies (Gaëtan Jouvencez), les suivants à Eyglies aussi, le 26 (SPe). Une dizaine à Crots le 5/04 (HRI), 6 à Eyglies le 14 (EDuc). Au moins 40 en migration à Crots le 26/04 (HRI), 34 en migration active le 28 à Réotier (EDuc). Des nicheurs possibles notés dès le 17/04 puis le 22/04 à Saint-Martin-de-Queyrières (JPN, SMe), le 28 à Orpierre (Michel Maire), le 13/05 au Saix (PRo), le 26 à Espinasses (CCo), le 29 à Mont-Dauphin (OAJ), le 2/06 à Poligny (MCo), le 10 à Champcella (SPe), le 24 à Saint-Julien-en-Beauchêne, le 11/07 à Val-des-Prés (JPN), le 18 à Arvieux (BDu, Vincent Chauchet), le 23 à Champoléon (ACI). Un nid occupé le 31/05 à Agnières-en-Dévoluy (VPa). Mouvements postnuptiaux classiquement marqués : 42 à Vallouise le 7/08 (Edouard Dansette), 15 à Châteauroux le 11 (Edouard Ribatto), 50 à Névache le 19/08 (Yann Brillard), 30 en vallée étroite (Yann Brillard), 35 à Briançon et 20 à l'Argentière le 20 (EDuc), 50 puis 80 à Saint-Crépin le 29 (EDuc, LBi)... Une dizaine à Ailefroide le 9/09 (RBa), les derniers. Peut-être que ces importants groupes observés en fin d'été correspondent à des déplacements postnuptiaux de nicheurs locaux qui passeraient

inaperçus à haute altitude. Les nicheurs potentiels sont observés dès 700 m et jusqu'à plus de 2600 m d'altitude.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* - NMH, peu commun - 92 données

Données hivernales, printanières et estivales sporadiques. Nets mouvements à partir de la deuxième décennie d'août et jusqu'à fin décembre. 1 oiseau stationne aux Alberts du 11 au 24/01 au moins (JPN), 1 autre à Eyglers du 21 (Eric Belleau) au 26/02 (SPe). Quelques données isolées peuvent faire penser à des nicheurs, mais sans vraiment de suite : 1 le 27/03 à Saint-Bonnet (OAJ), 1 à Embrun le 29 (OEy), 1 le 25/04 à Valsesres (EDup). Quelques données plus tardives posent effectivement question : 1 le 30/05 à Lardier-et-Valença (Valerie Enfoux), 1 le 17/06 à Aspres-s/-Buëch (RBe), 1 le 20 à Jarjays (François Boca), 1 le 29/07 et le 13/08 à Eyglers (GBe, SPe), encore 2 à Jarjays le 22 (MCo)... Une donnée (non documentée) d'un adulte avec un jeune fraîchement envolé le 6/08 à Saint-Crépin (LBi) est douteuse sans plus d'éléments, car le Martin-pêcheur n'est qu'un nicheur occasionnel à Serre-Ponçon, et n'est pas connu nicheur plus en amont sur la Durance, bien que des habitats favorables soient présents. La date tardive n'aide pas, la dispersion ayant déjà commencé. Premiers mouvements dès la mi-août : 1 le 15 à Monétier (Stéphane Thomin), 1 le 19 à Saint-Bonnet (TJo), 1 le 22 à Châteauneuf-de-Chabre (APa), 1 à Villar-Loubière le 8/09 (Joachim Wimmer), 1 à Sigottier et 1 à Trescléoux le 13 (APa), qui -fait notable- se baigne dans le même trou d'eau qu'Aude Pappé ! 1 à 2 oiseaux à Eyglers du 29/07 (GBe) au 26/12 au moins (GDh). Régulier à Mison, 1 le 24/09 (ADe) et le 16/10 (MDa, PNa) par exemple. 2 le 25 à Chorges (Eric Belleau), 1 le 6/10 à Chadenas (HRI), 1 le 8 à Pelleautier (PRO), 1 au Casset le 12 (JPN), 1 à Veynes du 20 (Bruno Dielen) au 5/10, 1 au pont de l'Archidiacre à Valsesres le 10 et le 25/10 (MCo, ALé), 1 aux Alberts le 4/11 (JPN), 1 à Savournon le 6 (GLI)... Quelques oiseaux fréquentent l'amont de Serre-Ponçon et le plan d'eau d'Embrun du 15/11 (GDh) au 30/12 au moins (APa). Quelques observations plus inattendues : 1 le 26/11 sur la Cerveyrette à Briançon (EDuc), 1 posé dans la neige le 11/12 à la Chapelle-en-Valgaudemar (Guilhem Barneix). Noté à la Roche-de-Rame autour de la pisciculture du 12/12 (GDh) au 22/12 (SPe), et à Rama du 15 au 28/12 (SPe).

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* - NM, peu commun - 46 données

Premiers à Sigoyer le 17/04 (Mathieu Robert), le 26 à Lagrand (APa), le 30 à Chorges (OEy). Une vingtaine à Eyglers le 9/05 (SPe, GBe, APa), 14 en rémigration à

Mikéou le 10/05 (EDuc), et d'autres oiseaux en vallée le même jour : 20 à Embrun (Christian Couloumy), 20 à Risoul (anonyme), 4 à la Motte-en-Champsaur (TJo, Gabin Guillaume). Les nids relevés se situent dans le Buëch (APa) à Lazer et Aspres-sur-Buëch (RBe, APa). Le plus gros effectif relevé en vol est de 30 individus à Neffes (PSa). A signaler aussi un passage à 2840 m d'altitude à Crévoux le 10/05 (Cécile Dubois). Dernier oiseau particulièrement tardif le 23/10 à Embrun (HRI, phot.).

Huppe fasciée *Upupa epops* - NM, commun - 275 données

Localisée aux secteurs les plus secs : Laragnais, coteaux du Gapençais et du Champsaur, pays Caturige, bien présente en Haute-Durance jusqu'à Briançon. Deux données hivernales : 1 le 19/02 à Savournon (Anonyme *fide* GLI) et 1 le 27 à la Bâtie-Montsaléon (Anonyme *fide* GLI), des oiseaux hivernants ou des migrateurs précoces ? Première migratrice le 14/03 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ), suivante le 19 à Sigoyer (Mathieu Robert), puis 1 le 21 à Ribeyret (GFO), 1 le 24 à Neffes (AHu). Premiers chanteurs le 30/03 à Lazer (APa) et à Neffes (AHu). Premières en Haute-Durance le 31/03 à Saint-Crépin (EDuc) et à Crots (Paul Sarlin). Premier nourrissage le 10/05 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ), puis un nid occupé le 15 à Eyglers (CHuFGr), un autre à Mont-Dauphin le 29 (OAJ). Premiers jeunes le 2/07 au Bersac (GLI), puis le 11 à Gap (RBe), le 14 à Trescléoux (APa), le 1^{er} et 12/08 à Savournon (GLI). Dernières le 2/09 à Savournon (GLI), et le 16 à Chorges (MPR) et au Bersac (GLI). Les nicheurs montent jusqu'à 1600 m sur les adrets du Briançonnais et du Champsaur : 1500 m à Puy-Saint-Pierre (MMo) et Orcières (anonyme), 1530 m à Gap sous le col de Gleize (ADe), 1530 m à Saint-Martin-de-Queyrières (MCo), 1560 et 1580 m à Puy-Saint-André (ALe, MMo), 1500 et 1660 m à Saint-Chaffrey (AME, RBA).

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* - M, rare - 7 données

2 données printanières : 1 à Prunières le 10/05 (EDuc, GBR, APa), 1 à Rosans le 18/05 (Christian Tessier). Dispersion postjuvénile notée en été : 1 oiseau le 8/08 à Saint-Laurent-du-Cros (PMi), 2 le 11/08 à Ventavon (Elsa Huet-Alegre) et 3 à Etoile-Saint-Cyrice le 17/08 (Pascal Rochas).

Pic noir *Dryocopus martius* - N, commun - 226 données

Bien présent dans le Champsaur et autour du Gapençais, un peu moins en Haute-Durance, avec plusieurs reproductions suivies : 1 nid occupé le 29/03 au Noyer (MCo) et un nid probable le même jour au Noyer aussi (MCo), 1 nid occupé le 24/03 à Réotier (RBA), un autre le 27

et le 7/05 à Champoléon (MCo), une femelle couve le 28/05 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (FSp), un jeune au nid le 1/06 à Montmaur (VPa, Loïc David).



31. Pic noir, Champoléon, 27 avril 2019. © MCo

Pic vert *Picus viridis* – N, commun – 1071 données

Répandu et commun mais seulement une seule donnée de nidification certaine cette année, avec deux jeunes dont un prédaté le 3/06 à Saint-Eusèbe-en-Champsaur (MCo). Premiers chants le 16/01 à la Roche-des-Arnauds (EDup). Surtout noté entre mi-mars et début mai, un creux en juin, un peu mieux noté en été, puis creux hivernal. Des chanteurs en altitude : 1 le 8/02 à 1840 m à Abriès (David Mourier), 1 le 25 à 2220 m à Saint-Chaffrey (SMe), 1 le 28 à 2160 m à Saint-Chaffrey (SMe), 1 le 16/03 à 1815 m à Saint-Léger-les-Mélèzes (MCo) et à 1860 m à Puy-Saint-Vincent (CHuFGr), 1 le 15/03 à 2090 m à la Salle-les-Alpes (SMe), 1 à 1900 m aux Partias le 1/05 (VFi) et à 1860 m à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), 1 le 3/06 à 2230 m à Ceillac (LBo), 1 le 25/06 à 2200 m à Briançon (JPN), 1 le 24/07 à 2180 m à Pelvoux (Philippe Ayrat)...

Pic épeiche *Dendrocopos major* – N, commun – 842 données

Jeunes au nid le 11/06 à Saint-Eusèbe-en-Champsaur (MCo), le 13 à Antonaves (APa), un nid occupé le 17 à Arvieux (Françoise Chevalier) un jeune envolé à Laye (MCo), un jeune volant à Lagrand le 20 (APa), des jeunes le 10/07 à 1930 m à Monêtier (EDuc), derniers jeunes envolés le 11/08 à Sigoyer (EDup).

Pic épeichette *Dendrocopos minor* – NH, commun – 23 données

Surtout des données printanières pour cette espèce discrète. 1 le 10/02 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (David Veit), 1 le 28 à Sigoyer (EDup), revu le 11/04 (EDup). Bien

implanté à Eygliers, site classique : 1 le 1/03 (EDuc), 1 le 7/04 (JPN), 1 le 11 (EDuc), 1 le 13/05 (SPe). Un chanteur à Veynes le 24/03 (FSp). Un chanteur le 8/04 à Puy-Saint-André (RBa), puis un couple forant une loge le lendemain au même endroit (RBa). 1 chanteur le 21/04 à Saint-Bonnet (DTh), 1 le 29 à Théus (TGi), 1 le 7 et le 14/05 à Savournon (GLI), 1 à Chorges le 17/05 (MPPr). Dernier chanteur le 9/06 à Antonaves (APa). Données estivales et automnales isolées : 1 le 17/08 aux Piles (EDup), 1 à Crots le 23 (Marie-Agnès Larbot), 2 à Savournon le 15/09 (GLI), 1 le 27/10 à Veynes (HPo).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* – NM, commun – 274 données

L'espèce est signalée dans tous les secteurs du département à l'exception du Bochaine. Premier le 20 mars à Saint-Bonnet (BTh), puis le 22 à Eygliers (SPe), le 23 à Briançon (JPN) et Neffes (AHu), avec déjà des visites de cavités le 24 à Neffes (AHu). Derniers le 27/08 à Eygliers (GBE) et le 29 à Abriès (Laurent Mifsud). 8 nidifications ont pu être suivies dans le Champsaur (MCo), le Briançonnais (JPN), le Buëch (PAR) et le Gapençais (AHu), dont un envol de 7 jeunes à Neffes le 20 juin (AHu). A signaler aussi 4 mentions à plus de 2000 m d'altitude en Guisane et dans le Queyras à Saint-Véran.



32. Torcol fourmilier, Neffes, 4 avril 2019. © Ahu

Alouette des champs *Alauda arvensis* – NMH, commun – 457 données

Des hivernantes à Savournon : 10 le 3/01 (GLI), 50 le 13 (GLI). Quelques petits groupes de migratrices en halte notés en vallée : 107 le 11/04 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc), 1 en migration active le même jour à Réotier (EDuc). Premiers chants à Lazer le 16/02 (APa). Un chanteur précoce à 1530 m le 28/02 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (Samuel Talhoët). Un jeune le 13/07 au col de Moissière à Ancelle (MCo). Notée partout où il reste de belles prairies, y compris (et surtout !) en altitude. Les chanteurs les plus bas sur l'aérodrome de Tallard à 600 m (EDup), les plus hauts à 2570 et 2650 m à Molines le 4/06

(LBo), 2630 m à Arvieux le 6/07 (David Mourier), 2640 m à Cervières le 13/05 (JPN), 2720 et 2790 m à Cervières le 22/07 (EDuc).

Alouette lulu *Lullula arborea* – NMH, commun – 119 données

Notée dans le sud du département et en Haute-Durance où elle remonte au-delà de Briançon. Premiers chants le 1/02 à Savournon (GLI), notés jusqu'au 4/07 (GLI). 1 migrateur en halte le 24/02 à l'Argentière (EDuc). Chanteurs notés à Saint-Etienne-en-Dévoluy le 28/02 (Samuel Talhoët), à Embrun (FLe, EDuc) et Gap (Samuel Talhoët), le 1/03, le 2 à Ribeyret (FLe), du 3/03 au 16/04 à Sigoyer (EDup). Encore de petits groupes de migrants en halte en mars : 5 le 16 à Saint-Crépin (JPN). Des chanteurs à Saint-Disdier le 10/03 (Philippe Lebrun), à Mison le 17 (MDa), à Villar-Saint-Pancrace le 21/03 et 24/04 (JPN, EDuc), au Poët le 12/04 (TGi), à Forest-Saint-Julien le 15/04 (OAJ), à Saint-Chaffrey le 16 (SMe), à Orpierre (Guy Bourderionnet) et la Bâtie-Neuve (EDup) le 17, à Vitrolles et Ventavon le 18 (TGi), à Sigottier le 21 (David Maire), à Eyguians le 24 (APa), à Serres le 28 (Thomas Ruckli), à Prunières le 7 et 21/05 (APa, EDuc), à Tallard le 9 (EDup), à Crots le 12 (JPC), au Saix le 13 (PRo), à Espinasses le 21 (François Boca), à Rabou le 22 (Claude Mauroy), ou encore à Montmaur le 1/06 (VPa), à Réallon et Saint-Apollinaire le 2 (Kevin Guille), le 9 à Rosans (PRo), le 13 à Gréoliers (TGi), le 16 à la Haute-Beaume (PRo), le 11 à Valserrès (MCo) et sur le plateau d'Herbonne (EDuc)... Voilà un aperçu des secteurs de nidification de la lulu : toujours sur des secteurs secs, chauds et ensoleillés. Encore des chanteurs le 17/08 à Etoile-Saint-Cyrice (Pascal Rochas). Pas de reproduction certaine notée cette année. Hors période de reproduction, notée sur les mêmes sites : 1 à Sigoyer du 15/09 au 1/11 (EDup), 1 à Savournon les 26 et 27/09 (GLI), 1 à Eyguians le 4/10 (APa)... Max. : 50 puis 10 les 10 et 11/10 à Agnières-en-Dévoluy (PRo).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* – M, peu commun – 21 données

Presque uniquement des données printanières. Premières le 2/04 à la Saulce (OEy), le 4 à Pelleautier (Yannick Queyras), le 7 à Serre-Ponçon (HRI). Max. de 45 à Crots le 26/04 (EDuc). Dernières le 21/05 à Pelleautier (LBI). A l'automne, 3 oiseaux en migration active au-dessus du village de la Salle-les-Alpes le 13/08 (Kevin Guille, Laurent Rouschmeyer), et 150 à Pelleautier le 10/09.

Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* – NM, commun – 1164 données

Très présente dans le Briançonnais, le Queyras et la Haute-Durance, bien plus localisée hors des massifs internes, voire absente. Niche à la fois sur du bâti (cathédrales, églises, vieux chalets...) et en paroi. Premières dès le 8/02 à Mont-Dauphin (OEy), puis le 13 à Briançon (JPN), avec quinze bons jours d'avance sur les dates habituelles. Déjà 6 à Briançon le 15 (RBA), puis au moins 17 le 25 (EDuc). Bien présente en Haute-Durance en février : 2 à Pallon le 16 (RBA), 3 à Eygliers le 17 (Hervé Le Roy), 9 à Embrun le 22 (Paul Sarlin), 1 à Champcella le 23 sur la falaise du Ponteil (RBA)... Des mouvements migratoires détectés jusqu'à début mai, alors que des nicheurs sont déjà largement installés en vallée : 30 au plan d'eau d'Embrun le 4/03 (HRI), 30 à Saint-Bonnet le 7 (GLa, OAJ) puis 35 dans le même secteur le 9 (MCo), 50 à Embrun le 11 (JPN), 37 à Pelleautier (RBe, Yannick Queyras) et 50 au plan d'eau du Champsaur le 14 (OAJ), 35 à Embrun le 18 (JPC), 50 à Réotier le 19 (SPe). Belles arrivées le 4/04 : 97 autour de Saint-Bonnet (OAJ), au moins 110 à Crots (JPC). Encore 80 le 6 à Savines (JPC), 50 à Eygliers le 14 (EDuc), 18 en rétro-migration le 25 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc), 20 à Serre-Ponçon le 26 (EDuc), encore 18 à Saint-Crépin le 28 (EDuc), et 2 le 12 à Saint-Bonnet (TJo). Premier nid occupé le 17/04 au Ponteil à Champcella (RBA), puis le 1/05 à Prelles (MMo), le 13/05 à Pelvoux (CHuFGr), le 15 à Veynes (Loïc Delaye), le 28 à Crots (JPC), le 29 à Savines avec des poussins au nid (JPC), le 30 à la Cluse (VPa) et Briançon (JPN), le 31 à Agnières-en-Dévoluy (VPa), le 1/06 à Montmaur (VPa), le 2 à Ceillac (LBo), un nid garni le 5 à Monétier (Stéphane Gaillard)... Premiers jeunes hors du nid le 10/06 à Gap, puis le 12/07 au Casset (RBA), le 13 à la Grave (CLaTMI), le 15 à Chantemerle (SMe), le 17 à Briançon (CCo) et à Château-Queyras (BDu). Encore des jeunes au nid le 19 à Boscodon (GDh), le 28/07 à la Beaume (Sylvain Henriquet), le 15/08 à la Salle-les-Alpes (Kevin Guille, Laurent Rouschmeyer), le 16 à Villar-d'Arène (Kevin Guille, Laurent Rouschmeyer). Derniers jeunes au nid le 1/09 à la Rochette (EDup) et Puy-Saint-André (JPN), et le 3/09 à Abriès (Laurent Mifsud). Des jeunes envolés le 17/08 à Monétier (Stéphane Thomin), le 21 à Boscodon (LBI), le 29 à Gap (Valérie Enfoux). Comme d'habitude, on note que la nidification est toujours tardive chez l'Hirondelle de rochers par rapport à sa phénologie d'arrivée sur les sites de reproduction avec souvent 1 à 2 mois de latence avant le début des nichées. A l'automne, quelques mouvements décelés : une centaine à Eygliers le 11/09 (SPe), 200 à la Chapelle-en-Valgaudemar le 20 (Yvan Matthey), 100 à Champoléon le 21 (Yvan Matthey). A Briançon, dernières sur site de nidification le 7/10 (JPN), à

Mont-Dauphin, le 12 (JPC) et à Orpierre, dernières le 25/10 (SMe), classiquement plus tardives au sud.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* – NM, commun – 574 données

Première le 18/03 à Saint-Crépin (RBa), une date classique. Les suivantes le 19 à Embrun et Eyglis (OEy). Belles arrivées à partir du 4/04 : 30 à Pelleautier (ADe), une grosse quinzaine à Saint-Bonnet (OAJ), 40 à Rousset (Eric Belleau), 10 à Crots (JPC), puis une centaine à Pelleautier (Clotilde Sagot) et 50 à Crots le 7 (JPC). Nouvelle vague dès le 24/04 : 200 à Crots (JPC), puis le 26, 1000 à Pelleautier (EDup) et au moins 3000 à Serre-Ponçon (EDuc). Une centaine à Saint-Crépin (EDuc), 200 à Rousset (JPN), 300 à Lazer (APa) le 28. Encore une centaine à Crots le 10/05 (EDuc), puis 1500 à Pelleautier le 19/05 (EDup, PRo), dernier gros passage du printemps. Premiers nids occupés le 11/05 à Briançon (VFi), le 2/06 à la Bâtie-Vieille (anonyme), le 13 à Crots (DTo), le 16 à Ancelle (Luc Souret), le 19 à Gap (HCl, ADe). Premiers jeunes envolés le 27/06 à Savournon (GLI), les suivants le 29 à Crots (JPC), puis le 6/07 à Aiguilles (David Mourier), le 13 à Briançon (JPN), les 7 et 11/08 à Crots (JPC). Des jeunes au nid à Gap le 4/07 et encore le 20/08 (GLa). Quelques mouvements postnuptiaux notés : 40 à Saint-Crépin le 23/08 (LBi), 30 à Crots le 29 (EDuc), 40 à Eyglis le 5/09 (GBE), 200 à Pelleautier le 7 (ADe), 50 à Eyglis (SPe) et 9 en migration à Briançon (EDuc) le 11, une centaine à Savournon le 24 (GLI), les dernières au même endroit le 23/10 (GLI).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* – NM, commun – 344 données

Premières le 17/03 à Réotier (DTo), le 28 à Saléon (Vianney Bajart), le 30 à Châteauneuf-de-Chabre (Robert Bonfillon), le 31 à Eyglis (JPN), le 1/04 au Laus (CCo). Passage assez peu marqué au printemps, hormis 200 à Pelleautier le 8/05 (PSa). Premiers nids occupés le 14/05 à Ventavon (Elsa Huet-Alegre), le 30 à Serres (Jean-Marc Taupiac). Déjà des jeunes envolés le 31/05 à Serres et à Veynes (Thierry Naudet). La plus haute colonie d'Europe est toujours active dans la RNR des Partias : au moins 6 nids occupés à 2600 m sous Rocher Bouchard le 2/06 (YZa, Christine Bartei). Des nids occupés le 4/06 à Ceillac (LBo), le 7 au Roux d'Abriès (Jean-Marie Gres)... Au moins 55 nids occupés à Ribiers le 10/06 (PAR), 12 à Châteauneuf-de-Chabre le 11 (PAR), 3 à la Roche-des-Arnauds le 13 (EDup), 38 à Lagrand le 14 (APa), 1 à Ailefroide (RBa) et 10 à Montgenèvre sur le mur d'escalade (JPN) le 17, 10 à Gap le 20 (CMe), 29 à Lagrand (PAR) et 176 à Serres (PAR) le 24, 27 à Eyguans (APa) et 3 à Vars (Eric Belleau) le 7/07, 8 à Guillestre le 16 (DTo), 6 à Saint-Véran le 17 (BDu), 4 à

Embrun le 21 (JPC), 26 à Lazer le 31 (Christiane Seille). Des colonies encore très actives le 10 (anonyme) et 11/08 à Ristolas (Philippe Colin), le 13 et 31 à Saint-Véran (Christian Pacteau, TFe), le 26 à Château-Ville-Vieille (Marie Guerard), et encore des nids occupés le 1/09 à la Rochette (EDup, CMe), le 9/09 à Névache (JPN) et Trescléoux (PAR). 30 en migration le 7/09 à Orcières (Jean-Michel Bompar), 120 au Galibier le 14/09 (Mathieu Pélissié). Dernières le 12/10 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (AFI).

Pipit rousseline *Anthus campestris* – NM, peu commun – 25 données

Premier le 26/04 à Eyglis (EDuc), puis 2 le 7/05 à Saint-Laurent-du-Cros (TJo). 2 à Prunières le 12/05 (APa, EDuc), sur site de nidification classique, notés également le 12 (EDup), le 20 (EDuc) et le 29 (EDup, HCl). 1 chanteur sous le col de Gleize le 17, 19 et 20/06 (MCo, ADe). Des chanteurs le long de la route du Granon notés les 26, 28/06 et 15/07 (VPa, RBa, SMe). Un chanteur le 18/07 sur la crête entre Gleize et le col de Chétive à la Fare-en-Champsaur (ACI). Derniers le 25/07 à Gleize (ACI) et le 28/08 au Granon (SMe). Dans le département, 3 secteurs concentrent l'essentiel des données : le secteur de Gleize dans le Champsaur, les adrets de la Guisane, et ceux de Prunières dans l'Embrunais.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* – NMH, commun – 493 données

Un oiseau à Espinasses le 11/01 (MCo), un autre stationne sur le Drac autour de Saint-Bonnet du 16/01 (BTh) au 17/02 (GLa). Premiers retours dès la mi-février : 4 à Laye le 19 (OAJ), 12 à Manteyer le 22 (HPo), 13 puis 18 au plan d'eau du Champsaur le 25/02 et le 6/03 (OAJ). Au moins 54 autour de Saint-Bonnet le 4/04 (OAJ), bien noté dans le Champsaur et en Haute-Durance durant tout le mois d'avril et début mai. Des migrateurs en vallée notés jusqu'au 13/05 avec deux oiseaux à Cervières (JPN). Premiers chanteurs à Ancelle (ACI) et la Salle-les-Alpes (SMe) le 17/04, un autre le 19 à Orcières (MCo), alors que 90 cm de neige recouvrent encore le sol. Premiers nourrissages le 26/06 à la Salle-les-Alpes et Villar-d'Arène (VPa). Deux nichées avec des jeunes envolés le 6/08 à Villar-d'Arène (EDuc), les seules notées cette année. Derniers oiseaux territoriaux le 31/08 à Saint-Véran (TFe). Premiers mouvements postnuptiaux en vallée décelés dès le 5/09 avec un oiseau à Eyglis (LBi), plus nets à partir de mi-octobre : 3 à Eyglis le 16 (CHuFGr), 1 à Saint-Julien le 20 (ACI). Derniers en altitude le 28/10 au Galibier (SMe).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* – M, commun – 61 données

Petite année. Uniquement des migrateurs, non-nicheur dans les Alpes. Surtout noté en Haute-Durance, dans le Gapençais et le Champsaur. Des données hivernales : 10 à la Freissinouse (Cyrille Poirel) et 10 à Sigoyer (EDup) le 1/01, 15 à la Roche-des-Arnauds le 26/01 (Christine Grosbéty)... Passage plus marqué à partir de mi-mars : 4 à Pelleautier le 14 (Yannick Queyras), 20 à Saint-Crépin le 31 (EDuc), 20 à Chorges le 4/04 (GLa), 1 à Ribeyret le 5 (GFo), 15 à la Roche-de-Rame le 6 (LBi, GDh), 49 à Villar-Saint-Pancrace le 11 (EDuc). Dernier le 27/04 en migration active à Saint-Martin-de-Queyrières (EDuc). En migration active à Mikéou (EDuc) : 4 le 14/04. Premiers de l'automne le 9/09 à Cervières (JPN). Quelques données de petits groupes jamais très nombreux par la suite, par exemple une petite dizaine à Chorges du 13/10 (anonyme) au 30/12 (GLa), 2 à Saint-Bonnet le 26 (ACI), 4 à Crots le 12/12 (anonyme).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* – NM, commun – 340 données

Premier le 31/03 à Saint-Laurent-du-Cros (MCo), et 11 le même jour à Saint-Crépin (AMe, JPN), puis 5 à Saint-Crépin et 1 à Crots le 2/04 (JPN), 3 à Réotier le 7 (JPN). En migration active à Mikéou (EDuc) : 3 le 14/04, 1 le 28, 7 le 29, 2 le 30, 2 le 10/05. 1 le 16 à Saint-Chaffrey (SMe), 4 en migration active à Saint-Martin-de-Queyrières le 27 (EDuc). Premier chanteur le 28/04 à Mikéou (EDuc). Dernier chanteur le 25/07 à Saint-Chaffrey (SMe). Chanteur le plus bas le 1/05 à 735 m Chabestan (AHu), le plus haut à 2380 m à Val-des-Prés le 12/07 (JPN). La majeure partie des données entre 1200 et 2100 m.



9. Pipit des arbres, Orcières, 7 septembre 2019. © Jean-Michel Bompar

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* – M, rare – 1 donnée

1 en migration active le 10/05 à Réotier (EDuc).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* – NMH, commun – 1012 données

Quelques données hivernales : 1 le 4/01 à Saint-Bonnet (BTh), 1 le 11 à la Bâtie-Neuve (MCo), 2 le 16 à Tallard (AHu)... Record de précocité à Briançon, 1 oiseau le 9/02 (EDuc). Nombreuses en vallée entre février et début mai. Premiers nourrissages le 10/05 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ). Déjà des jeunes envolés le 27/05 à Eygliers (MCo), nourrissages le 2/06 à Lardier-et-Valença (Didier Ariagno), à la Salle-les-Alpes avec des jeunes envolés (GBE), le 3 au Casset et le 4 à Villar-d'Arène (EDuc), le 9 à Ceillac (David Mourier), le 23 à Arvieux (Marie-George Serie)... Des jeunes le 4/07 au Chazelet (Marie Françoise et James Illand), le 8 aux Guibertres (Willy Hugedet), le 11 à Savournon (GLI), le 14 à Chantemerle (SMe), le 15 à Château-Ville-Vieille (Julien Girard-Claudon) et Villar-Saint-Pancrace (JPM), le 16 à Saint-Véran (Julien Girard-Claudon)... Encore des nourrissages en août : le 2 à Arvieux, le 12 à la Grave, des jeunes le 6 et 13/08 à Villar-d'Arène (EDuc). Derniers jeunes le 18/08 à Eygliers (GBE). Nicheurs les plus hauts notés à 2500 m, le 23/07 à Saint-Véran (Laurent Mifsud).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* ssp. – M, commun – 96 données

Toute petite année. Comme d'habitude, la phénologie des sous-espèces est caractéristique. Les passages les plus précoces concernent la Bergeronnette d'Italie *M. f. cinereocapilla* qui passe à partir de fin mars et jusqu'à début mai, puis la sous-espèce type *M. f. flava* qui passe typiquement courant avril. Les oiseaux les plus tardifs sont les Bergeronnettes nordiques *M. f. thunbergi* qui passent à partir de fin avril et courant mai, parmi lesquels on peut trouver parfois un *feldegg*. Première le 28/03 à Crots (HRI). Première *cinereocapilla* le 31/03 à Eygliers (EDuc), puis 4 au Liou le 1/04 (EDuc). 1 *flava* et 2 *cinereocapilla* le 11 à Réotier (EDuc), 11 *ssp.* à Eygliers (JPN). Au moins 15 à Eygliers le 25 (GBE). Dernière *cinereocapilla* le 5/05 à Saint-Crépin (LBi). Première *thunbergi* le 26/04 à Crots parmi un groupe de 40 printanières dont au moins 1 *flava* et 4 *cinereocapilla*. 1 *thunbergi* le 5/05 à la Fare-en-Champsaur (TJo), dernière *thunbergi* le 11/05 à Serre-Ponçon (EDuc). Dernier oiseau du printemps le 20/05 à Villar-Saint-Pancrace (JPN), possiblement une Bergeronnette des Balkans *M. f. feldegg*. Quelques données postnuptiales : 2 oiseaux en halte le 28/08 au Granon (SMe), dont une Bergeronnette flavéole *M. f. flavissima*, non annuelle dans le département. Au moins 6 *ssp.* à Avançon le 12/09 (EDuc, MCo), dernières le 14/09 au Galibier (Mathieu Pélissié).

Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* - M, rare - 1 donnée

Un mâle tout jaune en halte le 11/05 en soirée à Embrun et Crots sur les vasières de Chadenas (EDuc) (phot.), qui repartira peu après en migration active. Cette observation constitue donc la deuxième mention haut-alpine de cette espèce orientale, qui devient de plus en plus régulière en Europe de l'Ouest.



10. Bergeronnette citrine mâle, probablement 2a, vasières de Chadenas, Embrun, 5 mai 2019. © EDuc

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* - NMH, commun - 305 données

Premiers jeunes le 10/05 à Eygliers (APa), puis le 31 à Théus (EDup), le 10/06 à Monétier (GBe), le 17 à Aspres-s/-Buëch (RBe), le 24 et 30/07 au Réou d'Arsine à Monétier (EDuc), le 14/08 au lac Fangeas à Freissinières (Renaud Le Roy). Nourrissage le 2/07 à Névache (Marie Portas) et encore des jeunes au nid le 3/09 à Abriès (Laurent Mifsud). Notée nicheuse dans l'ensemble du département jusqu'à plus de 2500 m : un chanteur le 8/07 à 2570 m au-dessus du refuge du Glacier Blanc à Pelvoux (ACI). A noter, des restes découverts dans une pelote de Chevêchette trouvée le 4/07 aux Infournas (MCo) et analysée par Yves Kayser.

Cincle plongeur *Cinclus cinclus* - NH, commun - 472 données



11. Cincle plongeur, Espinasses, 14 février 2019. © ALé

Des jeunes envolés le 4/04 à Valserres (TFe), puis le 5 à Embrun (JPC), le 28 à l'Argentière (EDuc), le 9/05 à Eygliers (APa), le 1/06 sur la Cerveyrette à Briançon (EDuc), le 23/06 à Névache (Jacques Hallot), le 5/07 à Vallouise (MCo), encore le 24 à Abriès (BDu) et le 5/08 à Villar-d'Arène (EDuc), derniers jeunes le 17/08 au Casset (Stéphane Thomin). Un nid occupé à Embrun les 16 et 18/04 (JPC), à Champcella le 20 (RBa), à Névache le 24 (RBa), sur la Cerveyrette à Briançon (une première !) le 11/05 (MMo), à Villar-d'Arène le 11/07 (AAu). Un nid en construction le 23/04 à Eygliers (JPN). En hiver, noté sur les mêmes sites.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* - NMH, commun - 387 données

Premier chanteur le 3/03 à Sainte-Colombe (APa). Une seule donnée de nidification certaine : un adulte vient nourrir un jeune tout juste sorti du nid entre les pieds d'Alain Hugues le 27/05 à Neffes (AHu). Un chanteur à 2245 m à Cervières le 22/07 (SMe), le plus haut noté cette année.

Accenteur mouchet *Prunella modularis* - NMH, commun - 294 données

Très noté dans les jardins en hiver. 1 oiseau passe l'hiver à 1285 m dans un jardin de Réallon du 3/01 (au moins) jusqu'au 26/02 (Timothée Grange). Premiers chanteurs les 8 et 10/04 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (LBi), derniers le 26/07 à la Chapelle-en-Valgaudemar (ACI). Chanteurs d'altitude : 1 le 17/07 à 2360 m au col d'Izoard (SMe), 1 à 2400 m à Cervières le 21/07 (EDuc), 1 le 4/06 à 2425 m à Molines (LBo). 5 oiseaux dans une friche enneigée à Villar-Saint-Pancrace le 12/12 (EDuc), rare en hiver dans le Briançonnais.

Accenteur alpin *Prunella collaris* - NH, commun - 175 données

Des hivernants en vallée et en station : 5 à Puy-Saint-Vincent le 2/02 (Kilien de Chateaufvieux). Déjà des retours précoces en altitude : 1 à 2765 m le 26/02 à Pelvoux (SMe), félicitations à l'observateur. Premier chanteur le 18/04 au même endroit (SMe), puis le 14/05 à Orcières (MCo). Nourrissages le 5/07 à la Motte-en-Champsaur (ACI), le 16 à Abriès (Frédéric Masson), le 21 à Cervières (EDuc, BDu). Des jeunes le 14/07 à Monétier (AAu), le 22 à Cervières (EDuc), le 5/08 à Embrun (RBa), le 19 à Ristolas (Christophe Rochaix), le 25 aux Partias (Dominique Robin). Chanteur d'altitude : 1 le 8/07 à 3040 m entre la pointe des Cinéastes et le pic Tuckett à Pelvoux (ACI). Retours en vallée précoces : 1 à Briançon le 20/09 (JPN), puis 6 à la Roche-

de-Rame le 17/11 (SPe), une vingtaine à Puy Chalvin le 20 (RBa)...

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* - NMH, commun - 1687 données

Premiers chanteurs le 27/02 à Eygliers et le 3/03 à Sainte-Colombe (APa), mais difficile de dire s'il s'agit d'hivernants ou de nicheurs locaux. Des nicheurs cantonnés avec certitude à partir du 24/03 à Chabottes (MCo) et 1/04 à Villar-Saint-Pancrace (JPN). Nourrissages le 20 et 27/05 à Neffes (AHu), le 5/06 à Rambaud (EDup), le 8 à Réotier (DTo), le 2/07 à Saint-Bonnet (ACI). Des jeunes à partir du 14/06 à Neffes (AHu), puis le 6/07 à Villar-d'Arène (Catherine Beciu) et Saint-Bonnet (ACI), Villar-d'Arène le 21/07 (EDuc), dernier juv à Briançon le 26 (JPM). Quelques nicheurs d'altitude au-dessus de 2000 m : 2 chanteurs le 3/06 à 2045 et 2130 m à Ceillac (LBo), 1 le 17/07 à 2090 m sur le sentier des Crevasses (SMe).

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* - NM, commun - 320 données

Premiers le 17/04 à Savournon (GLI) et Neffes (AHu), puis le 19 à Saint-Bonnet (ACI), le 20 à Moydans (Thomas Ruckli), le 26 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ) et Eygliers (EDuc). Très nettes arrivées à partir du 27/04, noté en de nombreuses localités du Laragnais et du Gapençais. 1 alarme à Jarjayes le 11/07 (MCo, EDuc), 1 chante le même jour à Saint-Bonnet (ACI), puis les derniers à Briançon les 16 et 22/07 puis le 5/08 (JPN), dernière donnée annuelle. Pas noté au-delà de 1400 m : 1 chanteur le 28/04 à 1345 m à Eygliers (SPe), 1 le 27/05 à 1315 m à la Rochette (MCo).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* - M, rare - 1 donnée

1 femelle à Baratier le 17/04 (Frédéric Spada). Une espèce discrète probablement sous-détectée en halte migratoire...

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* - NM, commun - 501 données

Premier le 22/03 à Eygliers (SPe), le suivant le 29 à Villar-Saint-Pancrace (JPN). Premier nid occupé le 9/05 à Saint-Bonnet (BTh), suivant le 21 à la Bâtie-Neuve (MCo), un nid garni le 30 à Saint-Bonnet (ACI). Premiers jeunes le 10/06 à la Motte-en-Champsaur (MCo) et à Gap, puis le 2/07 à Eygliers (GBe), le 6 à Puy-Saint-André (JPN). 1 chanteur d'altitude à 1855 m à Montmaur le 1/06 (VPa). Derniers jeunes le 18/08 à Eygliers (GBe). Dernier le 22/10 à Sigoyer (EDup).



12. Rougequeue à front blanc, Eygliers, 5 septembre 2019. © GBe

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* - NMH, commun - 1766 données

Très commun. Premiers chanteurs le 17/03 à Chabottes (VCo, MCo) et Neffes (AHu), le 18 à Rosans (GFO), le 21 à Saint-Bonnet (BTh) et Saint-Julien-en-Beauchêne (MCo). Un nid occupé puis des jeunes les 10 et 11/05 à Moydans, des nourrissages le 13/05 au pré de Madame Carle (CHuFGr), le 15 à Veynes (Loïc Delaye). Derniers jeunes le 31/08 à Chaillol (DTh). Remonte typiquement au-delà de 2500 m : 3 oiseaux territoriaux le 4/06 à 2580 m à Molines (LBo), 1 le 5 à 2560 m à Ceillac (LBo), des jeunes le 10/07 à 2640 m à Névache, 1 chanteur le 17 à 2610 m à Villar-d'Arène, 3 le 21 à 2710 m à Cervières, des nourrissages le 21 à 2580 m et le 22 à 2670 m à Cervières (EDuc). L'hiver, plus sporadique mais visible pratiquement partout en-dessous de 1300 m (en vallée), parfois 1500 m sur les adrets.

Tarier des prés *Saxicola rubetra* - NM, commun - 388 données

A priori, plutôt une bonne année pour l'espèce. Premiers le 20/04 à Eygliers (GBe), Saint-Crépin (SPe) et Savines (APa). Des arrivées plus nettes à partir du 23 : 8 à Eygliers (SPe), 3 à Réotier (JPN), 7 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc) et 3 à Champcella (JPN) le 24, puis 8 à Eygliers, 40 à Saint-Crépin, 7 à Crots (EDuc), 5 à Ancelle, 1 à Chabottes (MCo) le 26. Premier nicheur installé le 1/05 à Ancelle (MCo), puis le 2 avec au moins 5 oiseaux dans la vallée des Fonts (JPN). De nettes arrivées de nicheurs à partir du 7/05 : 9 à Saint-Laurent-du-Cros (TJo), 2 à Gap (TJo). Des migrateurs continuent d'affluer en vallée, jusqu'à fin mai : 13 à Crots le 8/05 (JPC), 10 à Eygliers le 9 (LBI), 8 à Prunières le 9 (OEy),

encore 9 à Eyglis le 20 (EDuc). Bien présent autour du col du Lautaret et en Haute-Clarée dès le 19/05 (JPN), autour de Villar-Saint-Pancrace (petit noyau nicheur relictuel en vallée), noté dès le 21 (JPN), sur la plaine d'Ancelle avec des chanteurs notés le 28/05 (MCo), très présent aussi en vallée des Fonts, nombreux chanteurs (probablement plusieurs dizaines de couples dans la vallée) notés le 29/05 par exemple (JPN). D'autres nicheurs notés à Saint-Chaffrey le long de la route du Granon à partir du 22/05 (JPN), au lac de Roue le 23 (APa), à Champoléon le 24 (MCo), à Saint-Etienne-en-Dévoluy et Orcières les 25 et 26 (Sylvère Corre), à Agnières-en-Dévoluy le 31 (VPa), de nombreux oiseaux à Ceillac le 3/06 (LBo) à Vars (Estelle & François Spaeth) et à Molines (LBo) le 4, à Chaillol et Orcières le 6 (MCo), à Ristolas (LBo) et Pré Chabert à Monêtier (Fabien Toulotte) le 7, au Noyer le 10 (ACI), à Manse le 11 (MCo). Premier nourrissage le 8/06 au Roux d'Abriès (Jean-Marie Gres), puis le 19 à Saint-Laurent-du-Cros (HCl, ADe), le 27 en vallée Etroite (Claude Fievet), le 8/07 aux Guibertès (Willy Hugedet), le 16 à Villar-d'Arène (Mathieu Pélissier), le 13 au lac du Pontet (CLaTMi). Premiers jeunes le 5/07 à Saint-Laurent-du-Cros (COd), puis le 7 à Manse (EDup), le 12 à Orcières (Sylvain Bouget), le 13 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), le 15 à Villar-Saint-Pancrace (JPM), le 17 à Saint-Michel-de-Chaillol (Patrick Benoit), les 18 et 24 à Arvieux (BDu, Vincent Chauchet), le 19 au Lautaret (MCo, EDuc) puis le 21 (Pierre Giffon), le 23 à la Grave (EDuc), le 26 à la Chapelle-en-Valgaudemar (ACI), encore le 28 à Ceillac (Olivier Labbaye). Derniers nourrissages le 17/08 au fond de la vallée des Ayes à Villar-Saint-Pancrace (EDuc). Derniers le 11/10 à Chorges (JFA), le 12 à Eyglis (JPC) et Gap (PMi), le 20 à Villar-Saint-Pancrace (JPN).



13. Tarier des prés, Saint-Crépin, 20 avril 2019. © SPe

Au moins 17 sites de reproduction identifiés dans le département en 2019, soit partout où il reste de belles prairies de fauche et des milieux agricoles exploités en

paysannerie (et épargnés du pâturage ovin et des fauches précoces), typiquement les extraordinaires prairies de fauche de Haute-Romanche et autour du col du Lautaret, celles, non moins extraordinaires, de la vallée des Fonts (certaines sont, ou au moins étaient jusqu'à récemment, fauchées à la main), le Champsaur (et notamment le bastion de la plaine d'Ancelle), le Queyras, mais aussi autour du canal de Rencurel à Villar-Saint-Pancrace, où quelques couples se maintiennent tant bien que mal en fond de vallée (grâce notamment au système d'arrosage par gravité des canaux, qui permet la pousse d'une végétation de prairie humide par endroits luxuriante).

Tarier pâtre *Saxicola torquata* - NMH, commun - 185 données

Niveau répartition, globalement l'inverse du Tarier des prés, les deux espèces cohabitent rarement, excepté parfois en vallée. Des hivernants : 2 le 3/01 à Sigoyer (EDup), 1 le 16 à la Roche-des-Arnauds (CMe), 1 au Bersac (GLI) et 1 à la Rochette (GLa) le 30, 2 à Lazer le 16/02 (APa), 4 à Rosans le 24 (FLe), 3 à Pelleautier (EDup) et 1 à Embrun (FLe) le 26, 1 à Chantemerle le 28 (SMe), un couple à Saint-Apollinaire (FLe) et 1 à Gap (Samuel Talhoët) le 1/03. Premiers oiseaux cantonnés le 3/03 à Manteyer (BEm), à Sigoyer le 5 (EDup). Quelques migrants en halte : 11 à Eyglis le 13/03 (CHuFGr). Un nid occupé le 11/05 à Moydans (Ginou Waeckel), des jeunes envolés le 5/06 à la Bâtie-Neuve (EDup), le 22/06 à Savournon (GLI), un nourrissage à la Roche-des-Arnauds le 26 (EDup), des jeunes au col de Manse (EDup) et à Rosans (APa) le 7/07, puis à Gleize le 25 (ACI), à Sigoyer le 27 (EDup), à Ancelle le 31 (ACI). Des oiseaux cantonnés aussi au Bersac et à Savournon (GLI), à Neffes (AHu) le 6/05, à Saint-Laurent-du-Cros le 7 (TJo), à Tallard (EDup) et à la Rochette (VCo) le 9, à Crots le 10 (EDuc), à Montrond le 12 (Claude Eminet), à Valenty (Ventavon) le 14 (Elsa Huet-Alegre), le 15 à Pelleautier (ADe) et la Roche-de-Rame (Christophe Gerrr), le 22 à Montmaur (EDup), le 2/06 à Rambaud, le 4 au Sauze-du-Lac (Estelle & François Spaeth), le 8 à Savines (JPC), le 14 à Lagrand (APa) et Eyglis (SPe), le 21/07 à Etoile-Saint-Cyrice (MCo)... cette année, les nicheurs ne remontent pas au-delà de la Roche-de-Rame en Haute-Durance. Hors période de reproduction, sporadique, noté à basse altitude toujours, comme à Chorges, du 10/10 au 22/12 (JFA), à Mison du 17 (PAR) au 26/09 (ADe), à Crots du 27/11 (GDh) au 12/12 (anonyme). 2 à l'Epine le 26/10 (Bruno Gravelat), 1 à Lazer le 7/11 (Julie Cabri).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* – NM, commun – 749 données

Premier le 30/03 à Prunières (OEy), puis 5 à Agnières-en-Dévoluy le 3/04 (Laurene Trebucq), 1 à Saint-Julien-en-Champsaur le 5 (OAJ), 5 à Villar-Saint-Pancrace le 11 (EDuc). Premiers nicheurs installés dès le 22/04 à la Salle-les-Alpes (SMe), Champoléon (BTh)... Encore de beaux passages fin avril : le 26, 60 à Eygliers, 60 à Saint-Crépin (EDuc, GBe), 5 à Ancelle (MCo), 28 à Crots le 27 (LBi), encore 30 à Eygliers le 6/05 (CHuFGr), encore 12 à Saint-Crépin le 20/05 (EDuc).



14. Traquet motteux, Pelvoux, 30 mai 2019. © SPe

Premiers nourrissages le 21/06 aux Partias (Robin Lhuillier), le 27 au Granon (JPN). Premiers jeunes le 29/06 à Saint-Michel-de-Chaillol (DTh), derniers le 25/08 au Lautaret (MMo). Parfois très abondant en montagne au moment de l'envol des nichées : au moins 61 oiseaux autour du col d'Arsine le 30/07 (EDuc), au moins 40 sur l'Alpe de Villar-d'Arène le 6/08 (EDuc). Quelques chanteurs d'altitude : 1 le 2/07 à 2760 m au col de l'Aup Martin à l'Argentière (Willy Hugedet), 1 le 7 à 2800 m au Col Vieux à Molines (Nicolas Parrain) et 1 à 2720 m à Réotier (SPe), et enfin 1 le 30/07 à 2900 m près du Pic Blanc du Galibier (Géraldine Le Duc). Encore des oiseaux sur site de reproduction jusqu'au 9 et 10 octobre dans la vallée des Fonts (JPN, Riccardo Alba), 2 au Galibier et 1 au Lautaret le 12 (JPN), 1 à Savournon le 13 (GLI), 1 à Gleize le 15 (MCo) et le dernier le 20 sur l'aérodrome de Saint-Crépin (LBi, GDh).

Traquet isabelle *Oenanthe isabellina* – M, rare – 1 donnée

Un oiseau le 29/04 à Réotier (EDuc) (phot.), plus probablement un Traquet motteux atypique. Sous réserves d'homologation par le CHN.

Gobemouche gris *Muscicapa striata* – NM, peu commun – 19 données


Premier le 25/04 à Neffes (AHu), puis 4 le 26 à Embrun (EDuc). Nicheurs notés sur le site classique d'Eygliers du 4/05 (GBe) jusqu'au 30/08 (GBe), avec un adulte et un jeune le 18/08 (GBe). Au moins 3 oiseaux le 21/07 au parc du Colombier à la Salle-les-Alpes (SMe), une nidification locale n'est pas à exclure. Dernier le 6/09 à Charance (PSa).



39. Gobemouche gris et Sittelle torchepot, Eygliers, 18 août 2019. © GBe

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* – M, commun – 146 données

Premier le 7/04 à Eygliers (LBi), suivants le 17 à la Bâtie-Neuve (EDup), le 18 à Saint-Chaffrey (SMe), le 19 à Eygliers (JPN), puis de belles arrivées à partir du 20 : 2 à Eygliers (RBa), 1 à Serres (Thomas Ruckli), 1 à Champcella (RBa), 1 à Saint-Crépin (LBi), 1 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ). Pic printanier fin avril. Max. printanier : 7 au plan d'eau du Champsaur le 8/05 (TJo) et 10 à Eygliers le 9 (APa), les derniers du printemps, avec d'autres oiseaux à Neffes (AHu), Prunières (OEy) et Briançon (JPN), un dernier tardif le 22/05 à Montmaur (EDup). Premiers de l'automne le 5/08 à Névache (Thibault Jourdain), le 6 à Villar-d'Arène (EDuc), à Abriès (Laurent Mifsud), le 9 à Ristolas (anonyme) et Saint-Laurent-du-Cros (OEy). Dès lors, noté tous les jours, pic la dernière décade d'août avec de belles arrivées à partir du 24/08 : 10 à Ancelle le 24 (GLa), 10 au sentier des Crevasses le 25 (MMo), 5 à Briançon le 28 (MMo), encore 6 à Méreuil le 9/09 (APa), 5 à Embrun le 23 (OEy), dernier le 29 à Eygliers (GBe).



Phénologie du passage du Gobemouche noir en 2019.

Grive musicienne *Turdus philomelos* – NMH, commun – 288 données

Plus répandue mais moins notée que la litorne du fait de sa plus grande discrétion, notamment hors période de reproduction. Premiers chants notés le 1/02 à Savournon (GLI), le 4 à Eyguians (APa), le 15 au Noyer (Josiane Innocente), le 16 à Chorges (GLa). Il faut attendre le 3/07 pour des nourrissages : 1 à Puy-Saint-Vincent (CHuFGr), puis un jeune le 22 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (Philippe Tirefort). C'est tout ! Quelques arrivées fin septembre : 10 à Saint-Chaffrey le 25 (JPN), 25 à Savournon le 28 (GLI), 50 à Saint-Laurent-du-Cros le 12/10 (PMi). Dernières le 2/11 à Eygliers (LBi).

Grive mauvis *Turdus iliacus* – MH, rare – 14 données

Dernière de l'hiver à Valserres le 27/03 (TFE). Premières automnales le 12/10, une vingtaine d'oiseaux à Saint-Laurent-du-Cros (PMi). Max. : 40 à la Roche-des-Arnauds le 22/02 (HPo).

Grive draine *Turdus viscivorus* – NMH, commun – 950 données

Premier chant le... 2/01 à Trescléoux (APa), puis le 8 à Briançon (JPN). Nourrissages à Eygliers le 29/04, 6 et 16/05 (GBE), puis des jeunes hors du nid le 19 (GDh) et le 18/06 (GBE). Nourrissages à Montmaur le 30/05 (VPa), aux Guibertès le 8/07 (Willy Hugedet), au Lautaret le 13 (CLaTmi), au Casset (AAu) et à la Salle-les-Alpes (JPM) le 14, à Villar-Saint-Pancrace le 17 (JPM). Des jeunes envolés aux Fonds de Cervières, 2250 m le 22/07 (EDuc), les derniers et plus hauts notés cette année. Un chanteur toutefois noté à 2460 m à Névache le 10/07 (RBa). Hors période de

reproduction, max. de 25 à Saint-Chaffrey le 7/03 (AMe), 35 à Saint-Martin-de-Queyrières le 23 (EDuc), 63 en halte à Villar-Saint-Pancrace le 11/04 (EDuc), puis 37 à Villar-Saint-Pancrace le 30/11 (EDuc). L'abondance du gui du pin dans le Briançonnais la rend très présente dans ce district.

Grive litorne *Turdus pilaris* – NMH, commun – 301 données

Bien présente en tant que nicheuse dans les hautes vallées du Briançonnais (Guisane, Romanche et Clarée notamment), et en fond de vallée dans le Guillestrois. Des hivernantes partout, y compris en altitude. Petit hiver 2018-2019, bien meilleure saison 2019-2020. En exergue : 7 à Saint-Chaffrey le 3/01 (Olivier Labbaye, SME), sur un adret sec et ensoleillé, site d'hivernage classique de l'espèce, 20 le 20/01 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (BTh), 20 le 10/02 à Ristolas (Jean Luc Mias), 30 aux Orres le 15 (Pascal Maire), 60 à Manteyer le 22 (HPo), 20 à Ancelle le 6/03 (MCo). Premiers nicheurs sur site de reproduction dès le 10/03 aux Alberts (JPN), avec fréquentation de nids le 30 (JPN), puis à Eygliers le 31 (EDuc, JPN). Première notée au Lautaret le 18/04 (SMe), puis au moins 8 oiseaux tout autour de la plaine du Bourget à Cervières le 2/05 (JPN). Premiers nourrissages le 17/05 au Pontillas à la Salle-les-Alpes (JPN), puis le 19 à Eygliers (GDh). Des jeunes au nid le 24/05 à Eygliers (GBE), puis hors du nid le 29, alors qu'un autre oiseau couve encore sur un deuxième nid au moins jusqu'au 18/06, avec des jeunes le 26 (GBE). 3 grands poussins à Monétier le 10/06, sur un emplacement de nid occupé depuis au moins 9 ans (GBE), des jeunes envolés le 13 aux Boussardes (EDuc, MCo). Des nourrissages en haute-Clarée le 2/07 (Marie Portas), au Lautaret le 11 (EDuc), puis le 16 avec des jeunes au nid (JPN), une famille envolée le 18 (JPM). Encore des jeunes fraîchement envolés le 29/07 à Eygliers (GBE), les derniers. De petits groupes, probablement familiaux, notés à partir de fin août : 20 au Lautaret le 25 (MMo), 10 à Cervières le 7/09 (RBa)... Nettes arrivées la deuxième décennie de novembre : 45 à Ancelle le 13 (MCo), 140 à Saint-Jean-Saint-Nicolas le 14 (MCo), 50 à Puy-Saint-André le 20 (RBa), 100 puis 80 à Villar-Saint-Pancrace le 28 et 30/11 (JPN, EDuc), 200 à Chorges le 3/12 (ADe, APa), 60 à Crots le 5 (JPC), 40 à Saint-Disdier le 6 (GLa), 120 à Cervières le 8 (EDuc), 100 au col de Moissière le 18 (MCo), 150 à Crots le 22 (LBi), au moins 250 le 23 (EDuc), 50 à Guillestre (Jean-François Baudin), 50 à Laragne (APa), 32 à Sorbiers (RBe) le 26, encore 100 à Chaillol le 27 (Patrick Benoit)...



41. Grives litorne, l'adulte avec un sac fécal, Monétier-les-Bains, 10 juin 2019. © GBe



42. Grives litorne, jeune et adulte, Eygliers, 3 juin 2019. © GBe

Merle noir *Turdus merula* – NMH, commun – 2728 données

Premier nourrissage le 15/04 à Eyguians (APa), un nid avec des jeunes le 17 à Gap, puis des jeunes envolés le 23 (HCl). Derniers jeunes le 24/08 à Vallouise (CHuFGr). Pas noté nicheur au-delà de 1360 m à Val-des-Prés (JPN), mais des chanteurs notés au-dessus de 2000 m : 1 à Ceillac, 2015 m, le 8/06 (LBo), 1 aux Fréaux (la Grave), 2060 m, le 14/07 (CLaTmi), 1 sur le sentier des Crevasses, 2100 m, le 21/07 (Pierre Giffon).

Merle à plastron *Turdus torquatus* – NM, commun – 154 données

Quelques hivernants : 1 à Névache en Haute-Clarée le 29/01 (Etienne Obino), 7 à Abriès le 5/02 (David Mourier), 1 à Saint-Etienne-en-Dévoluy le 11 (Germain Poignant), 3 à Crévoux le 6/03 (HRI). Des arrivées à partir de la deuxième décennie de mars : 2 à Saint-Disdier le 10/03 (Philippe Lebrun), 1 à Gap le 19 (MCo), des chanteurs et des parades

le 1/04 à Saint-Léger, Saint-Jean-Saint-Nicolas et Saint-Etienne-en-Dévoluy (MCo). Des oiseaux alarment le 27/05 à Briançon (MCo, EDuc), puis à la Fare-en-Champsaur le 2/06 (ACI), à Ancelle le 23 (MCo), à Saint-Jean-Saint-Nicolas le 27 (MCo). Des jeunes envolés le 9 puis le 11/07 à Villar-d'Arène (Mathieu Pélissier, AAu), et encore le 20 (JBi). Derniers jeunes à Pelvoux les 23 et 25/07 (Philippe Ayrat), le 26 à Val-des-Prés (RBA), et les 5 et 6/08 sur l'alpe de Villar-d'Arène (EDuc). Des oiseaux d'altitude : 1 le 29/06 à 2300 m à Saint-Jean-Saint-Nicolas (GLa), des jeunes le 26/07 à 2381 m à Val-des-Prés (RBA), 2 le 21/07 à 2400 m à Cervières (EDuc). Nicheurs potentiels les plus bas à Poligny, 1400 m, le 2/06 (MCo), dans le Dévoluy, 1420 m, le 4/04 (LBI). Dernier oiseau le 26/11 à Briançon (RBA).



43. Merle à plastron, Saint-Jean-Saint-Nicolas, 12 octobre 2019. © MC

Monticole bleu *Monticola solitarius* – N, rare – 4 données

4 mâles chanteurs contactés le 2/06 dans le sud du département (Olivier Tanga). Ces observations doivent inciter à rechercher cette espèce farouche, discrète et peu accessible dans le sud du département (le Monticole bleu est nicheur à Sisteron), par exemple sur les adrets de Remollon et Espinasses.

Monticole de roche *Monticola saxatilis* – NM, commun – 88 données

Premier le 17/04 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (ACI), puis une femelle le 1/05 à Rosans (PRO), 1 le 2 à Réallon (HRI), 1 le 3 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (OAJ). Premier nourrissage le 21/06 à l'Argentière dans le vallon du Fournel (EDuc, Fred Goulet), le suivant le 26 puis le 28 à la Salle-les-Alpes (VPa, RBA), puis le 17/07 à Pelvoux (Philippe Ayrat). Dernier chant le 24/08 à la Grave (Géraldine Le Duc). 2 chanteurs au-delà de 2500 m : 1 le 25/06 à 2540 m le long de la route du Galibier (VPa), 1 le 11/07 à 2550 m à Abriès (PBo). Dernier oiseau le 26/09 au lac Faravel à Freissinières

(Gaetan Brindejonc). A noter les restes d'un oiseau dans une pelote de Chevêchette récoltée à Orcières le 9/06 (MCo), analysée par Yves Kayser.

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* – NM, rare – 1 donnée

1 chanteur le 27/06 à Chabottes (MCo), 1070 m, sans suite...

Fauvette des jardins *Sylvia borin* – NM, commun – 117 données

Première le 7/05 à Saint-Firmin (LBi), puis le 15 à Saint-Julien-en-Champsaur (MCo), à Pelleautier le 18 (PSa), à Chaudun le 21 et à Rabou le 22 (Claude Mauroy). Une seule donnée de nidification certaine, le 18/07 au sentier des Crevasses (JPM). Dernières le 27/08 aux Alberts (JPN) et le 30 à Risoul (ALe) (oiseau retrouvé mort). Les chanteurs les plus hauts : au sentier des Crevasses, 2120 m, le 21/07 (Pierre Giffon), à Ristolas, 2160 m, le 2/08 (EDuc).

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* – NMH, commun – 1467 données

Premiers chants le 21/02 à Eyglers (LBi), le 23 à Savournon (GLI). Une seule donnée de nidification certaine cette année : le 24/05 à Vallouise (CHuFGr). Surtout notée entre 1000 et 1500 m, mais des chanteurs contactés au-dessus de 2000 m : 1 au sentier des Crevasses, 2100 m le 13 et 14/07 (EDuc, JPM), 2 le 14/07 à Saint-Michel-de-Chaillol, 2130 m (MCo), 1 le 23/06 à Briançon, 2200 m (JPN). En hiver, surtout notée sur les secteurs les plus chauds et secs : Laragnais et Haute-Durance jusqu'à Briançon.

Fauvette grisette *Sylvia communis* – NM, peu commun – 49 données

Des données de nidification probable obtenues dans le Laragnais, le Gapençais et le Champsaur. La Haute-Durance n'accueille que des migrateurs en halte. Première le 10/04 à Gap (GLa), la suivante le 25 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc), puis 1 à Crots et 1 à Eyglers (EDuc) et 1 à Neffes le 26 (AHu). Premiers chanteurs le 1/05 à Ancelle (MCo, VCo). 1 chanteur à Savournon le 5/05 (GLI), 2 à Saint-Laurent-du-Cros le 7 (TJo). Noté autour du col de Manse : 1 le 9/05 à la Rochette (VCo). Des chanteurs notés à Moydans (Ginou Waeckel), Eyguians (GLI), Rabou (Claude Mauroy), Chorges (EDup, HCl), Saint-Eusèbe-en-Champsaur (MCo, ACI), Rosans (PRo), Saint-Genis (APa), Gap (OAJ), la Roche-des-Arnauds (EDup), Trescléoux (APa)... Dernier chanteur le 7/07 à Rosans (APa). 3 oiseaux

notés en halte le 28/08 près de la confluence Biaysse/Durance (RBa).

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* – NM, commun – 140 données

Bien présente dans le Briançonnais, le Queyras, en Haute-Durance et dans le Champsaur. Premières le 25/04 à Gap (HCl), le 28 à Eyglers (EDuc) ; premier chanteur le 7/05 à Saint-Chaffrey (RBa). Nettes arrivées à partir de mi-mai, des chanteurs installés le 14 à Cervières (PBo) et la Salles-Alpes (JPN), le 17 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (MCo), le 24 à Montgenèvre (PBo) et au Lautaret (JPN), le 26 à Saint-Léger (CMe), le 28 à Ancelle (MCo), le 29 à Mont-Dauphin (OAJ), le 20 aux Infournas (ACI)... à noter des chanteurs notés en ville depuis quelques années, à l'image d'un oiseau au milieu des maisons à Briançon du 1^{er} au 30/06 (EDuc). Noté aussi le 2/06 à Poligny (MCo), Ceillac (LBo), le 4 à Molines (LBo), le 7 à Puy-Saint-André (JPN). Très présente dans la vallée des Fonts, nombreux chanteurs notés le 20/06 (JPN). Un jeune envolé le 18/07 au Lautaret (JPM), des jeunes le 20 à Cervières (BDu), des nourrissages au sentier des Crevasses le 21 (Pierre Giffon). Dernières le 24/08 à Névache (Guillaume Dumont) et le 25 au sentier des Crevasses (MMo). Au plus bas, notée à Mont-Dauphin, 1015 m (OAJ) et Saint-Jean-Saint-Nicolas, 1115 m (OAJ). Au plus haut, notée le 13/07 à Saint-Véran, 2300 m (Julien Girard-Claudon), le 4/06 à Molines, 2450 m (LBo).

Fauvette orphée *Sylvia hortensis* – NM, peu commun – 12 données

Quelques chanteurs notés au printemps : 1 le 7/05 à Rosans (Christian Tessier), 2 le 10/05 à Prunières (EDuc, APa), 1 à Lazer le 26/05 (APa), 1 à Veynes le 30/05 (Vincent Palomares), au moins 3 chanteurs à Rosans le 9/06 (PRo), 1 à l'Epine le 11 (GFo), et 1 à Savournon le 14 (GLI). A noter un chanteur le 1/06 à Villar Saint-Pancrace (EDuc). Cette espèce est discrète et difficile à contacter

Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* – NM, rare – 1 donnée

1 chanteur le 2/06 à Remollon (Olivier Tanga). L'espèce est à rechercher dans le sud du département.

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* – NM, peu commun – 21 données

Contactée quasi-exclusivement dans le Laragnais. Première le 14/04 à Serres (ACI). Des chanteurs contactés le 28/04 autour d'Orpierre (Michel Maire) et Remollon (Olivier Tanga), le 15/05 à Laragne-Montéglin (APa), le 16 à Trescléoux (APa), le 17 à Lagrand (APa), le 30 à Furmeyer

(Thierry Naudet) et le 31 à Serres (Thierry Naudet), le 10/06 à Savournon (GLI)... Un adulte avec trois jeunes fraîchement sortis du nid le 25/05 à Orpierre (Cyriac Jarrassier). Un couple alarme le 1/07 à Barret-sur-Méouge (APa), un mâle alarme le 3/07 à Laragne (APa). A noter un mâle chanteur en Haute-Durance le 30/04 sur l'adret de Réotier à 1220 m (EDuc), sur un site favorable à la nidification.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenbaenus* – M, rare – 3 données

1 le 10/04 à Curbans (EDup), 1 le 26/04 à Eygliers (EDuc), et 1 le 20/08 à Curbans (HPo). C'est tout !

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* – NM, rare – 12 données

Notée en Moyenne-Durance entre Remollon et Ventavon. Une donnée hivernale : 1 oiseau le 5/02 à Vitrolles (EDup). Des oiseaux notés le 18/04 à Ventavon (TGi). Chanteurs : 1 le 25/04 à Remollon (EDup), 1 le 11/05 aux Piles à la Saulce (RBa), 1 le 12 à Vitrolles (HCl)... pas de chanteur au-delà du 13/06 aux Piles (EDup). 1 le 20/08 à Curbans (HPo), 1 le 21/08 à Jarjayes (MCo) et 1 au pont de l'Archidiacre à Valsesres le 25/10 (ALé).

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* – NM, peu commun – 9 données

Toute petite année. Première migratrice le 15/04 à Eygliers (OEy), puis 1 le 1/05 à Neffes (AHu). C'est tout pour le printemps ! Quelques nicheurs potentiels : 1 chanteur le 5/06 à la Rochette (EDup), 1 le 13/06 aux Piles (EDup), 2 à Vitrolles le 8/07 (TGi), 1 à la Saulce le 10 et 1 en bord de Durance à Jarjayes le 11 (EDuc). 6 oiseaux dans la roselière de Curbans le 20/08 (HPo). Et c'est tout !

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* – NM, peu commun – 42 données

Première le 20/05 avec 2 oiseaux en halte, dont un chanteur, à Eygliers (EDuc). Un chanteur à Savournon le 23 (GLI), un à Avançon le 27 (MCo), 1 à Manteyer le 1/06 (HPo), 3 à la Bâtie-Neuve le 5 (EDup), encore 2 à Eygliers le 7/06 (APa), et 1 à Saint-Eusèbe-en-Champsaur le 9, encore là le 4/07 (ACI). Première à Villar-d'Arène le 13/06 (EDuc, MCo). Un chanteur au col Bayard du 17 au 20/06 (MCo), des chanteurs en Haute-Clarée le 24 (Claudine Strack, Claude Fievet) et jusqu'au 2/07 (Marie Portas). Bien notée au Lautaret à partir de fin juin, un nourrissage noté le 20/07 (JBi), derniers oiseaux le 22/08. Les secteurs les plus réguliers sont le Lautaret, la Clarée, Eygliers (où sa nidification reste à prouver), le Champsaur et notamment

le Col Bayard, la Bâtie-Neuve. Une seule mention de reproduction cette année.

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* – NM, peu commun – 55 données

Premières le 17/04 à Pelleautier (OEy). Une construction de nid notée le 17/05 à Charance (RBe). Un transport de nourriture à Pelleautier le 16/07 (GBe), et des jeunes envolés à Charance le 17 (RBe). Encore des nourrissages le 21/07 à Pelleautier (PSa). Dernière le 4/08 à Mison (PMi). Dans les Hautes-Alpes, la turdoïde ne niche avec certitude qu'à Pelleautier, Mison et aux trois lacs à Rochebrune, où des chanteurs sont notés à partir du 31/05 (EDup) puis courant juin (TGi) et encore le 11/07 (EDuc, MCo).



44. Rousserolle turdoïde, Pelleautier, 16 juillet 2019. © GBe

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* – NM, rare – 16 données

Premier le 2/05 à Neffes (AHu), cantonné au moins jusqu'au 28/06, date à laquelle deux oiseaux sont vus transportant de la nourriture (AHu). En halte, 1 le 8/05 à la Fare-en-Champsaur (TJo), 1 le 9 à Prunières (OEy), 1 le 20 à Eygliers (EDuc). 2 chanteurs à Eyguians le 13/05 (APa), 1 à Vitrolles et 1 à Ventavon le 4/06 (TGi), 2 à Bayard et 1 à Saint-Genis le 12/06 (GLa, APa), et c'est tout.



45. Hypolaïs polyglotte, Neffes, 28 juin 2019. © Ahu

Locustelle tachetée *Locustella naevia* – NM, rare – 10 données

Un chanteur cantonné dans les prairies de fauche de Pré Chabert à Monétier-les-Bains, au moins du 5/06 (Fabien Toulotte *et al.*) au 1/07 (Willy Hugedet), entendu par de nombreux observateurs durant plusieurs jours au début du mois de juin à l'occasion du congrès des Réserves Naturelles de France qui se déroulait tout proche. Un jeune oiseau récupéré sonné après un choc contre une vitre le 27/07 à Montgenèvre : migrateur de passage ou oiseau né localement ? La date n'aide pas à trancher. La Locustelle tachetée est probablement nicheuse dans le département mais aucune preuve certaine n'a pu être apportée jusqu'à présent...

Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides* – M, rare – 1 donnée

1 chanteur en halte le 11/05 dans les roselières du lac de Curbans (PSa).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* – M, commun – 22 données

Surtout noté en Haute-Durance et dans le Champsaur. Premier le 12/04 à Embrun (EDuc), dernier le 10/05 à Prunières (EDuc). Max. le 26/04 : 4 à Eygliers (EDuc) et 8 à Embrun (EDuc). Premier de l'automne le 7/08 à Embrun (EDuc), dernier le 15/09 à Pelleautier (PSa). 1 le 24/08 à 1600 m à Névache (Guillaume Dumont), 2 le 7/09 à 2020 m à Orcières (Jean-Michel Bompar).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* – NM, peu commun – 20 données

Premier le 19/04 à Eygliers (SMe), 2 oiseaux le 21 à Chadenas (HRI), puis 1 le 22 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ). Max du passage fin avril : 3 à Eygliers et 3 à Embrun le 26/04 (EDuc), 3 à Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ) et 1 à Serres (Thomas Rückli) le 27/04, 4 à Rochebrune le 29 (TGi). Des chanteurs entendus jusqu'en juin comme chaque année, mais toujours sans preuve de reproduction : 1 le 11/05 à l'Argentière-la-Bessée (Christophe Gerrier), 1 le 17/05 à Lagrand (APa), 1 le 27/05 à Eyguians (APa), 1 le 9/06 à Rosans (PRo), et encore un le 18 à Châteauroux-les-Alpes (Nicolas Delelis).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* – NM, commun – 986 données



46. Pouillot de Bonelli, Eygliers, 2 juillet 2019. © GBe

Noté à plusieurs reprises en mars, mais ces données précoces posent question. Premier le 12/04 au Poët (TGi), le 14 à Eygliers (EDuc) et à Serres (ACI). Des jeunes le 11/07 à Villar-d'Arène (AAu), le 19 à Abriès (Frédéric Masson) et le 29 à Eygliers (GBe). C'est tout ! Derniers le 18/08 à Eygliers (GBe) et le 20 à Vallouise (CHuFGr). Les plus hauts chanteurs : le 31/07 à Puy-Saint-Vincent, 2190 m (CHuFGr), le 23/06 à Briançon, 2190 m (JPN).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* – NM, commun – 773 données

Quelques données hivernales : 1 les 7 et 9/01 à la Saulce (Charlotte Mezzasalma), 1 le 12 à Gap (CMe), 1 à Chauffayer le 17/02 (Bruno Gravelat), 1 le 25 à Saint-Bonnet (OAJ). Premier chanteur le 28 à Saint-Bonnet (MCo). Mieux noté à partir de la deuxième décennie de mars. Des jeunes les 20 et 21/07 sur le sentier des Crevasses (JBi, EDuc), et le 3/08 au pré de Madame Carle à Pelvoux (EDuc). Des chanteurs d'altitude au-dessus de

2100 m : 1 le 14/07 à Saint-Michel-de-Chaillol, 2125 m (MCo), 1 le 3/06 à Ceillac, 2135 m (LBo), 1 le 18 et 21/07 à Puy-Saint-Vincent, 2195 m (CHuFGr), 1 le 5/06 à Ceillac, 2190 m (LBo), 1 le 4/07 à Vars, 2220 m (Corinne et Christophe Baudoin), et 1 le 18/07 à Réotier, 2300 m (CME). Quelques données au passage postuptial, max. de 9 à Briançon le 11/11 (JPN), derniers le 26/11 à Crots (HRI).

Roitelet huppé *Regulus regulus* – NMH, commun – 176 données

Surtout des données hivernales. 4 à Saint-Chaffrey le 3/01 (SME), 4 à Saint-Martin-de-Queyrières les 23 et 26/01 (MMo). Un oiseau construit un nid le 3/06 à Ceillac (LBo), des jeunes observés à Château-Ville-Vieille le 20 (Jimmy Enfru).

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* – NMH, commun – 184 données


Très présent dans le Champsaur et ponctuellement dans le Dévoluy, très rare ailleurs. Un chanteur noté dès le 9/03 à Eyguians (APa), les suivants à partir de début avril dans le Dévoluy (MCo), derniers chanteurs les 7 et 13/07 à Saint-Jean-Saint-Nicolas et Ancelle (MCo). A noter 1 les 8 et 23/11 à Crots (HRI) et 1 le 14/12 à Chorges (GLa).

Mésange charbonnière *Parus major* – NMH, commun – 2374 données

Premiers nourrissages le 3/05 à Gap (anonyme), un oiseau couve le 4 à Saint-Martin-de-Queyrières (MMo) et un nid occupé à Chabottes (MCo), premiers jeunes le 6 à Eygliers (CHuFGr), puis le 7 et le 8 à Vallouise (CHuFGr). Derniers jeunes le 9/08 à Saint-Véran (Edouard Ribatto) et le 18 à Eygliers (GBe).




47. Mésange charbonnière au nid dans un lampadaire avec un sac fécal, Monétier-les-Bains, 10 juin 2019. © GBe



48. Répartition altitudinale des données de Mésange charbonnière en 2019.

Mésange noire *Periparus ater* – NMH, commun – 1806 données

Deux cavités fréquentées à Briançon du 4/03 au 10/05 (JPN), mais toujours sans preuve de reproduction. Un nid en construction le 13/04 à Orcières (ACI).




49. Répartition altitudinale des données de Mésange noire en 2019.

Premier nourrissage le 9/05 à Saint-Bonnet (BTh), puis un nichoir occupé à Briançon le 14 (VFi). Nourrissage le 30 à la Cluse (VPa), premiers jeunes le 31 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc), puis un nid le 3/06 à Ceillac (LBo), un autre le 6 à Vars (APa), des jeunes le 20/06 à Château-Ville-Vieille (Jimmy Enfru), le 16 à Vallouise (Philippe Ayral), encore un nourrissage au nid le 18/07 au pré de Madame Carle (EDuc), des jeunes le 20 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (Vincent Lemoine), derniers jeunes le 22 et 24/07 à Pelvoux (Philippe Ayral) et le 24 à Saint-Julien-en-Champsaur (Philippe Tirefort).

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* – NMH, commun – 1538 données


Cavités fréquentées à Briançon du 4/03 au 4/07 (JPN), à Savournon le 17/03 (GLI) et à Réotier (DTo), construction d'un nid à Vallouise le 28/03 (CHuFGr), nid occupé le 30 à Réotier (DTo). Nid en construction le 9/04 à Gap (HCl), le 22 à Saint-Julien (OAJ), le 26 à Chabottes (MCo), nid occupé à Eyguians le 1/05 (APa), à Neffes le 6 (AHu), il faut attendre le 8/05 pour voir les premiers jeunes à Réotier (DTo), puis un nourrissage le 9 à Gap (COd). Nombreux nourrissages notés à partir de mi-mai : le 20 à Villar-Saint-Pancrace (JPN), le 21 à Neffes (AHu), le 23 à Réotier (DTo), le 28 à Briançon (JPN), le 30 à Veynes (VPa). Des jeunes à Rambaud le 5/06 (EDup), à Neffes le 9 (AHu), à Briançon le 12 (Catherine Defourneaux), à Gréoliers le 13 (TGi), à Réotier le 15 (DTo). Quelques nichées tardives en altitude : des jeunes à Abriès, 1560 m, le 19/07 (Frédéric Masson), à Pelvoux, 1760 m, le 25 (Philippe Ayrat), derniers le 23/08 à Sigoyer (EDup). La mésange bleue devient rare dès 1400 m, s'aventurant peu dans les boisements de conifères.



50. Répartition altitudinale des données de Mésange bleue en 2019.

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* – NMH, commun – 928 données


Fréquentation d'une cavité par un oiseau à Briançon du 4/03 au... 29/05 (JPN), sans preuve formelle de reproduction. Visite d'un nichoir le 24/03 à Vallouise (CHuFGr), construction d'un nid le 31 à Eyglies (EDuc), le 15/05 à Chaudun (GLa), le 16 à Villar-Saint-Pancrace (JPN), le 17 à Eyglies (GBe), le 22 à la Motte (DTh). Premier nourrissage le 5/05 à Vallouise (CHuFGr), premiers jeunes à Vallouise le 12 (CHuFGr), puis un nourrissage au nid du 14 au 22/05 à Eyglies (GBe, CHuFGr).



51. Répartition altitudinale des données de Mésange huppée en 2019.

Mésange nonnette *Poecile palustris* – NMH, commun – 679 données

Fréquentation d'une cavité le 25/03 à Briançon (JPN). Un jeune le 11/06 à Champcella (LBi), puis 3 le 29/07 à Eyglies (GBe). Bien présente, notamment dans le Gapençais, le Champsaur et en Haute-Durance, mais nicheuse fort rare au-delà de 1400 m, parfois notée plus haut en hiver. Nicheurs d'altitude, souvent sur des sites bien exposés : le 14/04 à Mikéou, Réotier, 1500 m (EDuc), 1 le 30/05 aux Infournas, 1590 m (ACI), 2 le 27/07 à Névache, 1595 m (SMe), 4 le 30/05 et 1/06 à Montmaur, 1600 m (VPa), des oiseaux le 3/04 à Ristolas, 1770 m (Anthony Le Nozahic). 1 oiseau le 17/08 à Crévoux, 1755 m (SPe), n'est peut-être pas nicheur local. Record d'altitude cette année : 1 à Ceillac, 2135 m, le 6/10 (SPe).




52. Répartition altitudinale des données de Mésange nonnette en 2019.

Mésange boréale *Poecile montanus* – NMH, commun – 385 données

Contrairement à la nonnette, bien rare en-deçà de 1200 m, les deux espèces cohabitent rarement, quand c'est le cas, cela a lieu le plus souvent entre 1200 et 1400 m, parfois plus haut à l'automne. Chanteurs les plus bas

contactés les 10 et 11/05 à la Motte-en-Champsaur (TJo, Gabin Guillaume). Premiers chanteurs le 19/02 à Monétier et Saint-Chaffrey (SMe). Un oiseau chante les 11 et 14/04 à Mikéou, Réotier, 1500 m, au même endroit qu'une Mésange nonnette et même en-dessous, à 1430 m, le 30/04 (EDuc). Construction d'un nid le 23/05 à Arvieux (APa), des parades aux Infournas le 30 (ACI). Une famille à Orcières le 17/07 (ACI), des nourrissages à Cervières le 20 (BDu), des jeunes le 22 dans le vallon du Sélé à Pelvoux (Philippe Ayrat), derniers jeunes le 15/08 à Orcières (BGr). En altitude, 1 le 16/03 à Vallouise, 2380 m (CHuFGr), 1 le 16/08 à Saint-Véran, 2455 m (Philippe Colin). Les données de cohabitation entre la Mésange nonnette et la Mésange boréale sont intéressantes, n'hésitez pas à saisir l'information en remarque.



53. Répartition altitudinale des données de Mésange boréale en 2019.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* - NMH, commun - 440 données

Première construction de nid signalée le 25/02 à Saint-Bonnet (Alexis Nouailhat *fide* MCo), puis le 16/04 à Saint-Genis (Nicolas Pietrenko), le 19 à Gap (HCl), le 27 à Serres (Thomas Ruckli) avec des jeunes envolés le même jour à Champcella (RBa). Des jeunes à Gap le 3/05 (anonyme), à Eyguians le 15 (APa), des nourrissages à Rabou le 22 (Claude Mauroy), encore des jeunes à Saint-Crépin le 10/06 (Nicolas Pointecouteau), derniers le 10/07 à Briançon (JPN). Max. : 21 à Rochebrune le 5/03 (SBV), 14 à Crots le 11/12 (HRI), 15 à la Bâtie-Neuve le 17 (anonyme). De possibles nicheurs en altitude : 1 à Chaudun, 1670 m, le 24/03 (MCo), 1 à Saint-Julien-en-Beauchêne, 1690 m, le 21/03 (MCo), et 1 le 3 et 8/06 à Ceillac, 2020 m (LBo).

Sittelle torchepot *Sitta europea* - NMH, commun - 1203 données


Un nid en construction le 20/02 à Charance (EBe). Premier nourrissage le 24/04 à Neffes (AHu), premier jeune le 1/05 à Eygliers (EDup), derniers le 29/07 à Eygliers (GBE). Des nicheurs potentiels dans le bois des Ayes à 2150 m d'altitude les 3 et 20/07 (Anne Loze, JPM).

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* - NMH, peu commun - 32 données

Nidification probable à Briançon, un couple le 11/04 (EDuc), sur site classique. Des données hivernales : 1 le 15/01 à Eygliers (SPe), 1 le 16 à Champcella (JPN). Noté classiquement en août-septembre à haute altitude lors de la dispersion postnuptiale : 1 le 19/08 à 3035 m au col de la Traversette à Ristolas (Christophe Rochaix), 1 le 26 et le 29 près de l'ancien Refuge Tuckett à Pelvoux autour de 2450 m (Thomas Guggemoos, Dominique Robin), 1 le 21/09 à Orcières à 2730 m (GRo).

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* - NMH, commun - 132 données


Premier chant noté le 26/02 dans le Dévoluy (Samuel Talhoët). Nourrissages le 27/05 à Briançon (EDuc, MCo), le 3/06 à Ceillac (LBo), puis des jeunes à Saint-Jean-Saint-Nicolas le 12/07 (MCo), d'autres à l'Epine le 8/08 (Emmanuel Ruchon), les derniers. Nicheurs potentiels les plus bas : 1 le 27/04 au plan d'eau du Champsaur, 1005 m (OAJ), 1 le 25/07 à Vallouise, 1270 m (CHuFGr), les plus hauts dans le bois des Ayes à Villar-Saint-Pancrace, 2060 m, le 3/07 (Eliane Manierere), à Cervières, 2065 m, le 21/07 (EDuc), à Ceillac, 2200 m, le 3/06 (LBo).



15. Répartition altitudinale des données de Grimpereau des bois en 2019.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* – NMH, commun – 350 données

Premiers chants le 25/02 à Embrun (FLe). Premier nourrissage le 16/04 à Saint-Genis (Nicolas Pietrenko), puis un le 5/06 à Monêtier, 1650 m (Tony Cargnelutti). Un adulte nourrit un jeune le 7, 10 et 29/07 puis le 23/08 à Eygliers (GBe).



16. Répartition altitudinale des données de Grimpereau des jardins en 2019.

D'autres oiseaux d'altitude : 1 le 26/05 à Laye, 1645 m, (MCo), 1 le 16/07 à Monêtier, 1650 m (EDuc), 1 le 31/05 à Chaillol, 1680 m (DTh), 1 le 21/03 à Saint-Julien-en-Beauchêne, 1690 m (MCo), et 1 le 11/10 à Chaillol, 1810 m (MCo).



17.

Jeune Grimpereau des jardins, Eygliers, 29 juillet 2019. © GBe

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* – MH, rare – 27 données


Très belle série de données pour l'un des passereaux nicheurs les plus menacés de France. Le col de la Saulce à l'Epine accueille un oiseau hivernant, présent en 2019 du 14/01 au 18/02 (GFo), puis de retour (le même ?) le 26/10 (Bruno Gravelat) et jusqu'au 20/11 (GFo), mais plus noté par la suite. Un oiseau est découvert au bout du Plan à Crots le 27/11 (EDuc) et sera revu régulièrement au même

endroit par de nombreux observateurs jusqu'au 3/03/2020 (EDuc), pour bel hivernage complet et un total d'au moins 97 jours de présence sur le site. Un oiseau est contacté à Manteyer le 9/12 (OEy), sans suite malgré des recherches le 31/12 (HPo).



18. Pie-grièche grise, Crots, 26 décembre 2019. © SPe

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* – NM, commun – 466 données



19. Phénologie de la Pie-grièche écorcheur en 2019

Bien présente dans le Briançonnais, le Champsaur, les balcons de Serre-Ponçon, la Haute-Durance, le Queyras et aussi le Laragnais, bref, partout où il subsiste de beaux

milieux agricoles avec quelques haies, arbres et buissons. Première le 1/05 aux Champs du Serre à Ancelle (MCo), puis le 6 à Serramande, Prunières (JPC), le 7 à Saint-Laurent-du-Cros (TJo), puis de nettes arrivées à partir du 9. Une offrande à Villar-Saint-Pancrace le 31/05 puis le 2/06 avec le premier nourrissage au nid (EDuc), un autre nourrissage le 6/07 à Cervières (JPN), puis aux Guibertès le 8 (Willy Hugedet) ; un nid occupé le 14 à Puy-Saint-Vincent (Daniel Malassingne). Des jeunes : le 15/06 à Saint-Martin-de-Queyrières (MMo), le 3/07 à Sigoyer (EDup). A partir du 10/06 et durant environ un mois, la quasi-totalité des données concernent des mâles : les femelles sont invisibles... Nombreux cas de nidification certaine à partir de mi-juillet : au moins 3 nourrissages et 1 nid occupé le 15 à Villar-Saint-Pancrace (JPM), des jeunes le 17 à Sigoyer sur un troisième nid local (EDup), une femelle nourrit le 19/07 à Arvieux (BDu), un autre nourrissage le 20 à Cervières, sur la plaine du Bourget (BDu), puis le 21, encore 2 nourrissages à Villar-Saint-Pancrace (JPM), 1 à Saint-Etienne-en-Dévoluy avec des jeunes tout juste sortis du nid (Vincent Lemoine), un nourrissage à Etoile-Saint-Cyrice (VCo, MCo), encore des jeunes à Ceillac le 27 (Olivier Labbaye), à Monêtier le 5 et 6/08 (Stéphane Thomlin), le 14 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (Stéphane Ledauphin) et Lazer (APa, RBe). Pas mal de jeunes signalés dans le Queyras en août : 4 à Molines le 14, une famille à Saint-Véran le 21, une autre le 26 à Aiguilles (Philippe Colin). Des jeunes au Lautaret le 25 (MMo). Derniers jeunes sur site de reproduction le 23/08 à Sigoyer (EDup), avec encore des oiseaux le 30 (EDup). Mouvements notés fin août : 4 oiseaux à Eygliers le 29 (CHuFGr) puis 1 jeune en dispersion le 30 (GBe). Derniers oiseaux : le 1/09 à Manse (EDup), le 5 à Champcella (SPe), et un tardif le 23 à Prunières (OEy).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* – M, rare – 7 données

Toujours rare dans le département. 1 oiseau le 4/05 à Prunières (OEy), 1 à Tallard (LBi) et 1 à Crots (JPC) le 9/05, revu jusqu'au 19 et 21/05 (SPe, GDh). 1 mâle le 21/06 à la Bâtie-Montsaléon (PRO).

Pie bavarde *Pica pica* – NMH, commun – 1655 données

Nid en construction le 28/02 à Sigoyer (Mathieu Robert), puis le 14/04 et les 19 et 20/05 à Briançon (JPN). Des jeunes le 21/06 aux Alberts (JPN), un nid occupé le 23/06 à Névache (Claude Fievet), une famille à Villar-Saint-Pancrace le 15/07 (JPM), une à Saint-Etienne-en-Dévoluy le 20 (Vincent Lemoine), derniers nourrissages de jeunes envolés le 18/08 à Baratier (LBi). Nicheurs les plus hauts : au Lautaret, 2090 m, notés le 18/04 (SMe) ou le 16/07 (JPN)

par exemple, et à Saint-Véran, 2040 m, le 17/07 (BDu), 2255 m le 16/08 (Philippe Colin).


Geai des chênes *Garrulus glandarius* – NMH, commun – 1323 données

Un nid en construction le 11/05 à Gap (GBr). Quelques données de jeunes : à Gap le 25/06 (Tom Delaporte), à Vallouise le 15/07 (Philippe Ayrall), à Pelvoux le 25 (Philippe Ayrall), à Trescléoux le 20/08 (PAR). Des données en altitude : 1 le 22/04 à Saint-Chaffrey, 2005 m (SMe), 1 le 21/08 aux Infournas, 2045 m (TJo), 1 le 5/06 à Ceillac, 2065 m (LBo), 1 le 17/06 à Montgenèvre, 2065 m (JPN), 1 le 21/07 au sentier des Crevasses, 2085 m (Pierre Giffon), 1 le 28/10 à Monêtier, 2085 m (SMe), 1 le 18/07 à Puy-Saint-Vincent, 2160 m (CHuFGr), 3 le 28/09 à Freissinières, 2105 m (SPe), 1 le 17/07 à Cervières, 2170 m (SMe). Pas d'arrivées automnales constatées cette année.

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes* – NMH, commun – 513 données

Très présent entre 1700 et 2200 m, en particulier dans le Briançonnais et le Queyras, et notamment dans les cembraies (mais pas seulement, visible aussi en mélèzin pur et en sapinière). Une seule donnée de nidification certaine cette année : 2 jeunes nourris par 2 adultes le 30/05 à Montmaur, 1565 m (VPA) : l'altitude basse pour l'espèce et la localisation à l'extrême limite de l'aire de répartition du cassenoix sont fort intéressantes. Quelques oiseaux à basse altitude : le 29/04 à Saint-André-d'Embrun, 1035 m (William Mourgues), le 19/11 et 11/12 à Saint-Bonnet, 1035 m (BTh), le 26/08 à Baratier, 1220 m (Marie-Agnès Larbot), le 22/04 à Saint-Martin-de-Queyrières, 1235 m (SMe), le 25/08 à la Fare-en-Champsaur, 1240 m (ACI). D'autres oiseaux en altitude : 1 autour de 2400 m à Crévoux le 2/04 (Paul Sarlin), 1 autour de 2400 m à Orcières le 11/07 (Sylvain Bouget), 2 le 11/08 à Molines-en-Queyras, 2645 m (Philippe Colin), 1 le 13/08 à Champoléon autour de 2400 m (BGr), 3 le 16/08 à Saint-Véran, 2455 m (Philippe Colin), 2 à Cervières, 2515 m, le 7/09 (RBA), puis 1 le 15/12 (JPN). Notez que tous les oiseaux notés à haute altitude le sont en fin de saison, ce qui correspond probablement à de la dispersion postnuptiale.

Choucas des tours *Corvus monedula* – NMH, commun – 114 données



20. Répartition altitudinale des données de Choucas des tours nicheurs en 2019

Bien présent en Haute-Durance, les nicheurs du gouffre de Gourfouran et de Mont-Dauphin essaient jusqu'à la Roche-de-Rame (en amont) et jusqu'à l'Embrunais (en aval). Nicheurs installés le 26/02 à Mont-Dauphin (JPN), le 2/04 à Gourfouran (JPN), le 28/04 à Remollon (Olivier Tanga) et Orpierre (Michel Maire). Max. hivernal : 100 à Eyguians le 3/01 (APa). Quelques oiseaux en altitude : 4 le 18/04 à Orcières, 1440 m (Ajo), 7 le 26/04 à Ancelle, 1315 m (MCo).

Crave à bec rouge *Pyrrhocorax pyrrhocorax* – NMH, commun – 356 données

Premiers nids fréquentés le 4/05 à Céüse (Valerie Enfoux), le 10 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), le 11/06 à Névache (JPN), le 16 à Ancelle (GLa), et c'est tout. Pas de nidification certaine notée cette année. Max. cette année : 100 le 5/03 à Gap (MCo), 101 à Sigoyer le 21/09 (EDup).

Chocard à bec jaune *Pyrrhocorax graculus* – NMH, commun – 443 données

Des nidifications constatées à Poligny, 1915 m, le 21/07 (ACI), à Monêtier, 2450 m, le 23/07 (JPN), et aussi à Monêtier, 2545 m, le 4/08 (SMe). Max. cette année : 400 à Crévoux les 7 et 19/12 (HRI), 450 à Cervières le 8/12 (EDuc) et 500 à la Chapelle-en-Valgaudemar le 4/04 (PSa). Certains bien bas en hiver : 1 le 26/02 à la Motte, 1230 m (Sébastien Bara), 10 le 24/01 à Gap, 1025 m (Philippe Geniez), 80 le 32/12 à Pelvoux, 1265 m (Cindie Arlaud). Des nicheurs à basse altitude, aussi, dans le Dévoluy (et à

Céüse, mais pas notés cette année) : des nids fréquentés les 17/05 et 22/07 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (MCo, Vincent Lemoine). Typiquement, des oiseaux montent à haute altitude : 10 le 1/08 à la tête de Couleau à Châteauroux, 3040 m (RBa), 1 le 14/07 puis 2 le 4/09 au col des Ruillans à la Grave, entre 3155 et 3190 m (CLaTMi, LBo), 4 le 8/07 au col du Monêtier, 3340 m, à Pelvoux (ACI), 3 le 9/07 au col de la Girose à la Grave, 3525 m (Sylvain Cretin), et enfin 1 le 16/08 au Pic Coolidge à Pelvoux, 3681 m, record d'altitude annuel pour l'espèce (et pour l'observateur ! plus haute donnée saisie cette année) (Rémi Maison).

Corneille mantelée *Corvus cornix* – NMH, peu commun – 172 données

Hybride C. noire x mantelée *C. corone x cornix* – NMH, peu commun – 149 données

Quasi-exclusivement notée en Haute-Durance entre Embrunais et surtout Guillestrois. Des hivernants notamment au plan de Phazy à Risoul (LBi), sur la décharge de Pralong (LBi). Max. : 7 au plan de Phazy le 16/09 (LBi). Pas de nidification notée cette année. 149 données supplémentaires concernant des hybrides, notées dans l'Embrunais, le Guillestrois et le Briançonnais, typiquement parmi des groupes de Corneilles noires.

Corneille noire *Corvus corone* – NMH, commun – 1474 données

Un nid occupé le 28/05 à Ancelle (MCo), des jeunes juste volants le 21/07 au sentier des Crevasses (EDuc). C'est tout ! En altitude : 1 à Ceillac, 2215 m, le 3/06 (LBo), 2 le 18/07 à Abriès, 2300 m (Laurent Mifsud). Max. : 350 en prédortoir à Crots le 14/08 (LBi).


Grand Corbeau *Corvus corax* – NMH, commun – 659 données

Constructions de nid notées le 17/02 à la Rochette (GLa), le 26 à Saint-Etienne-en-Dévoluy (Samuel Talhoët), un nid occupé le 3/05 à Saint-Bonnet (Quentin Febvay), le 7 à Ancelle (TJo), le 30 à l'Argentière (RBa), le 3/06 à Ceillac (LBo). Des jeunes le 11/07 à Savournon (GLI). Max. : 30 sur la décharge de Pralong le 26/02 (FLe), 40 le 24/08 (LBi), 60 sur la décharge de Sorbiers le 26/10 (PMi) et 50 le 9/11 et 7/12 (PMi).

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* – NMH, commun – 294 données

De beaux passages en février-mars : 30 à Savournon (GL) et 14 à l'Argentière (EDuc) le 24/02, 30 à Manteyer (EDup) et 300 à Pralong (FLe) le 26, 50 à Monêtier le 28 (FLe), 40 à

Baratier (Paul Sarlin), 20 à Chauffayer et 50 à Gap (Samuel Talhoët) le 1/03, 400 (max. annuel) à Eyglies le 3 (LBi), 150 le 4 (SPe) et 30 à Villar-Saint-Pancrace (JPN), 100 à Embrun le 6/03 (Yannick Mourgues), 70 à Eyglies le 14/03 (GBe), 26 à Jarjayes le 15 (RBe). Premier nid occupé le 24/03 à Chabottes (MCo), puis le 5/04 à Villar-Saint-Pancrace (JPN), et le 28/05 à Ancelle, 1330 m (MCo). Un nid en construction le 29/04 à Eyglies (GBe), un autre le 21/05 à Saint-Eyrié (Savines) (GDh), puis le 25/05 à Pelleautier (LBi). Un nourrissage le 8/05 à la Motte (TJo), le 9 et le 12 à Saint-Bonnet (BTh, TJo), le 11 à Saint-Laurent-du-Cros (Shamgar Brook), le 20/05 à Briançon (JPN). Nids occupés le 14/05 à Savournon (GLI), à Villar-Saint-Pancrace (JPN), premiers jeunes à la Roche-de-Rame le 24/05 (RBa), puis le 14/06 à Villar-Saint-Pancrace (JPN), le 16 à Sigoyer (EDup), les derniers. Nicheurs les plus hauts : les 9 et 26/04 à Saint-Chaffrey, 1480 m (AMe), le 17/05 à la Salle-les-Alpes (JPN), le 17/06 à Gap, 1440 m (MCo).



21. Répartition altitudinale de l'Etourneau sansonnet nicheur en 2019

Etourneau roselin *Pastor roseus* – M, rare – 2 données


2 oiseaux isolés le 29/05 à Prunières (EDup, OEy). Une petite réplique de l'invasion de 2018 ?

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* – NM, rare – 54 données

Premier le 11/04 à Réotier (EDuc), le suivant le 17 à Savournon (GLI). Premier chanteur le 30/04 à Saléon (APa). Au moins 3 chanteurs seront suivis sur ce secteur (autour de la confluence Buëch/Céans à Saléon, Lagrand et Eyguians) jusqu'au 16/07 (APa), où la nidification est très probable. Hors de ce site, peu de données de nicheurs : 1

le 2/05 à Savournon, sans suite (GLI), 1 le 12/05 à Vitrolles (HCl), 1 le 16 à Remollon (ALé), 2 le 21 au Poët (TGi), 2 le 25 à Lazer (APa), 1 le 31 à Rochebrune (EDup), 1 le 2/06 à Lardier-et-Valença (Didier Ariagno), 1 le 9 à Antonaves (APa), 1 le 10 et 4 le 12 à Théüs (BTh, TGi), 1 le 17 à Chorges (GLa), 1 à Espinasses le 28 et 29 (SBV). Encore 3 le 8/07 à Lardier-et-Valença (TGi), 1 à la Saulce et 1 à Valserres le 10 (TGi, ALé), 1 à Remollon, 1 à Jarjayes et 1 à Valserres le 11 (MCo, EDuc). Un migrateur en halte le 10/08 au pied du col à Villar-d'Arène (Stéphane Ledauphin) à 1700 m


Moineau domestique *Passer domesticus* – NMH, commun – 1672 données



22. Répartition du Moineau domestique en 2019

Le Moineau domestique est rare dans le Briançonnais et le Queyras, les données saisies se rapportent plus probablement à des oiseaux hybrides. Premiers nids en construction le 4/03 aux Alberts (JPN), puis le 22 à Eyglies (LBi), dernier le 2/06 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc). Nids occupés le 30/03 à Chabottes (MCo), le 22/04 à Crots (JPC), à Sigoyer le 10/05 (EDup), à Briançon le 18 (JPN), à Barret-sur-Méouge le 25 (Francis Lloret), à Ceillac le 2/06 (LBo)... Premier jeune le 9/06 à Ceillac (David Mourier) et à Villar-Saint-Pancrace (JPN), puis en exergue le 8/07 à la Chapelle-en-Valgaudemar (Valerie Enfoux), le 12/07 à Villar-d'Arène (CLaTMi). Derniers jeunes le 24/08 à Aiguilles (Laurent Mifsud), mais encore un nid occupé le 25 à la Rochette (EDuc) et le 29 aux Alberts (JPN). Quelques nicheurs d'altitude : à Villar-d'Arène, 1800 m (CLaTMi), à Château-Ville-Vieille, 1820 m (Laurent Mifsud), à Orcières, 1825 m (BGr), à Montgenèvre, 1840 m (JPN), à Molines, 1910 m (Laurent Mifsud), à Saint-Véran, 2025 m (Edouard Ribatto, SME).

Moineau cisalpin *Passer italiae* – NMH, commun – 62 données




23. Répartition du Moineau cisalpin en 2019

Moineau hybride cisalpin x domestique *P. italiae* x *domesticus* – NMH, commun – 100 données

Contacté dans le Queyras et le Briançonnais, surtout dans les villages, moins fréquent en agglomération, où l'on retrouve plutôt des hybrides. Premier nicheur probable le 7/03 aux Alberts à Montgenèvre (JPN). Des transports de matériaux notés le 31/05 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc), un nid occupé le 3/05 à Monétier-les-Bains (EDuc). Transports de nourriture notés le 12/07 à Molines (Julien Girard-Claudon) et le 16 à Saint-Véran (Julien Girard-Claudon). Encore un nid occupé le 7/08 à Saint-Véran (Christian Pacteau). Deux données occidentales : 1 à Baratier le 29/03 (Paul Sarlin), un le 11/11 à Chorges (JFA). Cette espèce reste encore peu connue et difficile à identifier notamment en plumage internuptial frais. 100 données supplémentaires concernent des hybrides.



24. Moineau hybride cisalpin x domestique, Ceillac, 24 juillet 2019. Un mâle hybride tout à fait typique. © Edith Senes




25. Répartition du Moineau hybride cisalpin x domestique en 2019

Moineau friquet *Passer montanus* – NMH, peu commun – 202 données

Belle série de données. Encore bien présent dans le département, notamment dans le bocage champsaurin (bastion de l'espèce), mais aussi sur les coteaux du Gapençais et du pays Caturige, ainsi qu'en Haute-Durance, où il remonte jusqu'à la Roche-de-Rame, parfois l'Argentière et très irrégulièrement jusqu'au fond de Vallouise (à moins que l'information sur cette espèce en Vallouise soit déficiente, car le microclimat doux de la vallée, son vieux bâti et son activité agricole avec de vieux vergers sont très favorables au friquet). Des nichoirs visités dès le 25/02 à Saint-Bonnet (ACI), où une construction de nid est notée le 12/04 (ACI). D'autres cavités fréquentées le 19/04 à Eygliers (JPN) et Saint-Julien-en-Champsaur (OAJ), le 26 à Chabottes (MCo), le 1/05 à Ancelle (VCo, MCo). Premier nid occupé le 24/05 à la Roche-de-Rame (RBa), puis le 28 à Ancelle, dans un nid de torcol (MCo), puis deux nichoirs occupés à Saint-Bonnet le 30 (ACI). Un nid en construction le 7/06 à Eygliers (APa), des nourrissages à Saint-Bonnet du 2/07 au 2/08 (ACI), les derniers. A noter la construction d'un nid dans un nichoir par un couple le 28/12 à Saint-Bonnet (ACI). Hors nidification, généralement contacté à l'unité ou en petits groupes, max. de 15 à Embrun le 24/11 (LBi). Même si des groupes plus importants ont pu être notés ces dernières années (100 le 21/12/2014 à Baratier, EDuc, CLa), on est loin des effectifs et des densités que l'on retrouve -encore- en certains endroits du Cantal, par exemple...



26. Moineau friquet, Neffes, 4 avril 2019. © AHu



27. Répartition du Moineau friquet en 2019


Moineau soulcie *Petronia petronia* – NMH, commun – 193 données

Une quinzaine de sites de reproduction identifiés dans le département. Comme toujours, cette espèce thermophile typique des Alpes du Sud est restreinte aux secteurs les plus secs : Briançonnais, Guillestrois et surtout Queyras, où le soulcie, immanquable, est l'espèce emblématique des vieux villages du massif. Noté aussi dans le Laragnais, où il est moins commun. Premières constructions de nid le 30/03 aux Alberts (JPN). Des petits groupes hivernaux sont encore notés jusqu'à début avril : 55 à Prunières le 7 (OEy), 46 à Villar-Saint-Pancrace le 11 (EDuc), encore 70 à Eygliers le 22/05 (SPe). Un nid occupé du 27/04 au 10/06 à Eyguians, sur le barrage du Riou (APa), un autre le 24 aux Alberts (JPN), puis à Monêtier du 3/06 au 30/07 (EDuc), à Aspres le 17/06 (RBe). Au moins 2 terriers de guêpiers sont occupés par des soulcies à Oze le 29/06 (APa). Premiers nourrissages le 14/07 à Arvieux (Vincent Chauchet) et Monêtier (AAu), puis à Saint-Véran, 2034 m (record annuel d'altitude), le 17 (BDu), à Eygliers le 20 (SMe), à Villar-Saint-Pancrace le 21 (JPM). D'autres sites de nidification potentiels ou déjà connus mais mal suivis notés cette année : 2 à la Vachette le 23/04 (EDuc), 20 oiseaux fréquentent des cavités à Chabestan le 1/05 (AHu), 1 à

Ceillac le 3/06 (LBo), 2 à Mont-Dauphin le 9/06 (SPe), sur site de nidification historique (remparts de Mont-Dauphin), mais pas suivi cette année ; 1 oiseau fréquente un nid probable le 23/06 à Névache (Claude Fievet). Typiquement, les nids observés dans le département se situent soit dans les tubes carrés métalliques et creux des poteaux électriques EDF (le nec plus ultra du soulcie), soit dans les innombrables trous de mur et interstices du vieux bâti des villages de montagne (le Queyras est l'exemple parfait). Sans surprise, les records d'altitude pour les nicheurs sont observés dans le Queyras : des oiseaux territoriaux le 4/06 à Saint-Véran, 1935 m, et à Molines, 1920 m (LBo), mais aussi 1 à Montgenèvre, 1880 m, le 8/07 (Daniel Malassingne). Hors nidification, souvent en groupes, max. de 161 à Eygliers le 9/10 (LBi). A noter un groupe d'une trentaine d'oiseaux le 23/03 aux Combes, 1870 m, à Puy-Saint-André (EDuc), se nourrissant dans des pentes sèches récemment déneigées : l'altitude remarquable pour l'espèce (qui plus est aussi tôt) souligne son potentiel d'adaptation lorsque le sol est encore enneigé ou gelé en de nombreux endroits.



28. Moineau soulcie, Mont-Dauphin, 15 février 2019. © SPe



29. Répartition du Moineau soulcie en 2019

Niverolle alpine *Montifringilla nivalis* - NH, commun - 83 données

Une quinzaine d'oiseaux autour du tunnel du Galibier, 2530 m, le 24/05 (JPN), sur site de nidification. 1 oiseau le 21/06 à Orcières, 2490 m (MCo), qui semble nicher dans un pylône de télésiège, et un couple au fond du vallon du Fournel, 2350 m (EDuc, Fred Goulet). Premiers jeunes le 4/07 à Névache au col du Chardonnet, 2640 m (Marie Portas), puis le 13, 14 et 19 au Galibier, 2640 m (AAu, JPM, JBi), avec encore un couple nourrissant des jeunes au nid le 20 (JBi). Encore des nourrissages à Cervières, 2800 m (EDuc) et à Val-des-Prés, 2550 m (GDh) le 22/07 et des jeunes à Châteauroux, 2500 m, le 1/08 (RBa). Encore des jeunes au nid le 4/08 au Galibier (SMe), puis des jeunes nourris par des adultes le 10/08 à la Salle-les-Alpes, 2590 m (Stéphane Thomin). Derniers jeunes nourris hors du nid le 22/08 au Galibier (anonyme). Hors nidification, souvent en jolis groupes, à partie de la fin d'été : 37 au col Agnel les 22 et 23/08 puis 63 le 26 et 27 (Philippe Colin), 30 sur le plateau de Bure le 7/09 (Laurent Majorel). Pas notée en-deçà de 1900 m cette année : 1 à Saint-Etienne-en-Dévoluy, 1910 m, le 2/02 (Guilhem Barneix), 15 à Crévoux, 1970 m, le 7/12 (HRi). Quelques oiseaux au-delà de 3000 m : 5 à la Chapelle du Mont Thabor, entre 3085 et 3130 m, le 23/07 (Cyrille Poirel) et 25 le 21/08 (Yann Brillard). A noter une lecture de bague le 13/07 au Galibier (AAu) : un mâle bagué patte droite, déjà contrôlé par RBa en 2015. Il s'agit d'un oiseau bagué en 2013 (donc âgé d'au moins 6 ans) près de Toses dans la province de Girona en Espagne (juste derrière le Puigmal et les crêtes frontalières des Pyrénées-Orientales), à environ 465 km de là ! Cette lecture de bague assez extraordinaire nous prouve une fois encore que des échanges existent entre les populations alpines et pyrénéennes, ce qui avait déjà été supposé il y a quelques années avec des observations de Niverolles sur les sommets de l'arrière-pays audois.



30. Niverolle alpine baguée, détail sur la bague, Monêtier-les-Bains, 13 juillet 2019. © AAu

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* - NMH, commun - 2885 données

Sans surprise l'espèce la plus notée. Un nid en construction le 23/04 à Eygliers (APa), puis le 29 à Briançon (JPN). Premiers jeunes au nid le 22/05 à Eygliers (CHuFGr), puis des jeunes en Haute-Clarée le 2/07 (Marie Portas), le 8 au Lautaret (Sébastien Leclerc), le 14 à l'Argentière (EDuc), le 23 à Pelvoux (Philippe Ayrat), le 3 à Monêtier (Olivier Soldi), le 3 et 4 à Pelvoux (EDuc), un nourrissage à Freissinières le 18/08 (Renaud Le Roy), derniers jeunes le 25 à Eygliers (GBe). Des chanteurs notés au-delà de 2300 m, à l'extrême limite de la zone de combat : 1 le 13/07 à Saint-Véran, 2330 m (Julien Girard-Claudon), 1 le 5/06 à Ceillac, 2340 m (LBo), 1 le 17/04 au col du Prorel à Puy-Saint-André, 2350 m (SMe), 1 le 31/05 au Granon à Saint-Chaffrey, 2355 m (JPN). Max. hors nidification : 150 le 9/10 à Saléon (APa), 350 le 5/11 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* - MH, peu commun - 414 données


Max. de début 2019 : 300 à Saint-Disdier le 9/02 (Fabien Quétier), derniers oiseaux le 11/04 à Mikéou (EDuc). Premiers de l'automne le 4/10, date classique, à Chorges (MPr), puis de beaux groupes : déjà 100 à Saint-Laurent-du-Cros le 12 (PMi), 80 aux Infournas le 23 (MCo), 200 à Orcières le 24 (GRo), 161 à Villar-Saint-Pancrace le 5/11 (EDuc). Max. aux mangeoires : 30 à Briançon le 1/12 (JPN) et 29 le 20/12 (EDuc).



31. Pinsons du Nord, Réotier, 30 janvier 2019. © DTo

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* - NMH, commun - 425 données

Bien présente en montagne dans les massifs internes, devenue bien plus rare à plus basse altitude. Construction de nid le 11/05 à Saint-Laurent-du-Cros (Shamgar Brook), puis le 8/06 à Névache (François Mézenge). Premiers jeunes et nourrissages aux Partias le 21/06 (VFi, Robin Lhuillier), puis des jeunes le 17/07 à Pelvoux (Philippe Ayrat), le 30 sur l'Alpe de Villar-d'Arène, et encore les 5 et 6/08 (EDuc), derniers jeunes le 22 au Galibier, 2535 m (anonyme), le 24 à la Grave (Géraldine Le Duc). En altitude, 2 le 11/07 au col de Laurichard, 2585 m, à Villar-d'Arène (EDuc), 1 le 4/06 à Molines, 2680 m (LBo). Hors nidification, quelques groupes : 20 le 1/03 à Gap (Samuel Talhoët), 30 au Granon (SMe) et 150 à Montmaur (Pierrick Giraudet) le 28/08, 30 le 26/09 à Fressinières (Gaetan Brindejonc), 50 le 9/10 à Cervières (JPN), 50 le 18 à Savournon (GLI).



32. Répartition altitudinale de la Linotte mélodieuse nicheuse en 2019

Sizerin cabaret *Carduelis cabaret* - NMH, rare - 44 données

Nicheurs notés sur les deux principales stations : le sentier des Crevasses à Villar-d'Arène et le pré de Madame Carle à Pelvoux. En Haute-Guisane, un couple le 16/07 à Monêtier-les-Bains dans le vallon du petit Tabuc (EDuc). A noter 2 oiseaux le 26/07 à la Chapelle-en-Valgaudemar (ACI), 1 le 3/08 au col d'Izoard (Thibault Jourdain). Pas d'oiseaux notés en Haute-Clarée cette année. Peu de données hivernales : une dizaine d'oiseaux à Réallon le 25/02 parmi une troupe de fringilles (FLe), 1 le 6/04 à une mangeoire à Briançon (JPN).



33. Sizerin cabaret mâle, Pelvoux, 13 mai 2019. © CHuFGr

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* - NMH, commun - 1421 données

Nourrissages le 6/05 à Eyglers (CHuFGr), le 27 à Neffes (AHu), un nid le 10/06 à Saint-Crépin (Nicolas Pointecouteau), premiers jeunes le 3/07 à Gap (RBe), puis à Savournon le 4 (GLI), le 8 au Lautaret (Sébastien Leclerc), le 21 à l'Argentière (RBa), le 27, le 1 et 9/08 à Sigoyer (EDup), le 6/08 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo), derniers le 17/08 à Villar-Saint-Pancrace (EDuc). En altitude, 3 le 22/04 au col de Vars, 2115 m (GDh), puis le 8/06 (Catherine Defourneaux), puis le 4/07 (Corinne et Christophe Baudoin) ; 2 le 21/07 au sentier des Crevasses, 2155 m (Pierre Giffon), et 3 oiseaux dont 1 jeune le 24/08 à la Grave, 2245 m (Géraldine Le Duc). En hiver, les plus gros effectifs sont notés aux mangeoires, mais restent rares. En exergue : 29 à Réotier le 11/02 (DTo), 30 à Sigoyer du 12 au 31/01 (EDup), 33 à Eyguians le 3/02 (APa), 33 à Risoul (ALe) et 35 à Réotier (DTo) le 4/04, 40 à Sigoyer le 17/11 et le 26/12 (EDup).

Verdier d'Europe *Carduelis chloris* - NMH, commun - 679 données


Un nid occupé le 26/04 à Embrun (LBi), des jeunes du 8/05 au 14/07 à Réotier (DTo), un nourrissage le 27/05 à Neffes (AHu). Surtout noté en vallée, commun entre 1000 et 1400 m. Quelques nicheurs au-delà de 1600 m : 1 le 17/07 à Orcières, 1610 m (ACI), 1 le 2/06 à Ceillac, 1650 m (LBo), 1 le 13/07 à Orcières, 1730 m (Sylvain Bouget), 1 le 4/06 à Molines-en-Queyras, 1735 m (LBo). Hors nidification, max. hivernaux généralement notés aux mangeoires : 25 le 13/02 à Eyguians (APa), 30 à Embrun le 24/08 (Marie-Agnès Larbot), 30 à Saint-Jean-Saint-Nicolas le 7/03 (OAJ), et 39, 55 et 80 du 21 au 23/12 à Briançon (EDuc).

Tarin des aulnes *Carduelis spinus* – NMH, commun – 437 données

Pratiquement que des données hivernales cette année. 5 données en période de reproduction : 1 le 20/05 à Briançon (JPN), 2 au col de Gleize le 21 (Claude Mauroy), 1 le 16/07 à Monétier (EDuc), 1 à Montgenèvre le 29 (SMe), et à noter 25 oiseaux à Ristolas le 27 (BDu), probablement un groupe ayant niché localement. Assez peu présent en début d'année, max. de 30 à Bénévent-et-Charbillac le 4/01 (ACI), 25 à Névache le 30 (Etienne Obino), 30 le 2/03 à Risoul (ALe) et à Briançon (JPN). De plus beaux effectifs (logiquement) en automne et début d'hiver : 80 à Névache le 22/09 (Josée de Luca), 200 à Eygliers le 25/10 (LBi), 40 le 4/11 à Champoléon (OAJ).

Venturon montagnard *Serinus citrinella* – NMH, commun – 212 données

Des hivernants en vallée : 2 à Embrun le 11/01 (HRI), 15 puis 9 à Savournon du 14 au 22/01 (GLI), 11 à Saint-Martin-de-Queyrières le 23 (MMo). Nicheur bien présent dans la partie supérieure de l'étage subalpin. Un nid occupé le 8/06 à Ceillac (David Mourier), des jeunes à Val-des-Prés le 29/06 (RBa), des nourrissages de jeunes envolés dans la RNR des Partias le 19/07 (JPM). Au plus bas, noté nicheur possible à l'Argentière, dans le bois de France, 1155 m, le 28/05 (Alexandre Crégu), au plus haut, à la Grave, 2405 m (CLaTMi). Hors nidification, max. de 24 au Granon le 28/08 (SMe).



34. Répartition altitudinale du Venturon montagnard en 2019

Serin cini *Serinus serinus* – NMH, commun – 608 données

Quelques hivernants : 10 à la Roche-de-Rame le 13/01 (SPe) sur un adret chaud et sec, mais ces données sont anecdotiques. Premier chanteur le 15/02 à la Bâtie-Neuve (anonyme), puis 3 à Risoul le 2/03 (ALe), 1 à Guillestre le 3 (Jean-François Baudin), 1 à Gap le 23 (Valerie Enfoux). De nettes arrivées à partir du 6/04, noté quasi

quotidiennement dès lors. Construction de nids notées le 30/03 à Briançon (JPN), le 21/05 à Neffes (AHu). Nourrissages le 6/05 à Eygliers (CHuFGr), un nid occupé le 7/06 à Neffes (AHu), puis des jeunes le 10 à Gap (anonyme), un nid le 7/07 à Saint-Bonnet (ACI), dernier jeune le 1/08 à Saint-Firmin (Gilles Boyer). Quelques chanteurs au-delà de 2000 m : 2 le 5/06 à Ceillac, 2050 et 2105 m (LBo), 1 le 2/08 à Ristolas, 2155 m (EDuc). Max. hors période de nidification : 40 à Briançon le 31/10 (JPN).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* – NMH, commun – 252 données

Pas de donnée de nidification cette année pour cette belle espèce discrète mais répandue dans les bois frais des massifs (Briançonnais et Champsaur surtout). Au plus bas, autour de 1100 m : 1150 m le 6/05 à la Motte (TJo), 1160 m le 29/06 à la Beaume (MCo), 1165 m le 6/04 à Chabottes (MCo). Au plus haut : 2025 m le 10/06 à Névache (Claude Fievet), 2055 m le 20/06 à Cervières (RBa), 2110 m le 11/07 au sentier des Crevasses (AAu).



72. Bouvreuil pivoine mâle, Chorges, 15 novembre 2019. © MPr

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* – NMH, commun – 161 données

Peu d'oiseaux au début de l'année. Derniers le 14/03 à Chorges (MPr) et le 16 à Eyguians (APa). Arrivées notables à la mi-octobre et jusqu'à fin décembre. Premiers de l'automne le 8/10 à l'Epine (Emmanuel Cosson), le 11 à Chorges (MPr), le 12 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo). Surtout contacté en-dessous de 1300 m, mais jusqu'à 1770 m à Orcières le 26/02 (MCo), 1800 m à Vallouise le 25/10 (CHuFGr), 1810 m le 12/10 à Saint-Jean-Saint-Nicolas (MCo) et 1860 m à Puy-Saint-Pierre le 31/12 (JPN). Max. : 8 le 26/10 à Chauffayer (Bruno Gravelat). On a connu plus ! Une donnée de nidification possible : un couple le 2/06 à l'Argentière-la-Bessée (EDuc) (phot.).



73. Grosbec casse-noyaux, la Roche-de-Rame, 14 décembre 2019. © SPe

Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus* – NM, rare – 2 données

1 femelle le 20/07 dans la mégaphorbiaie du sentier des Crevasses à Villar-d'Arène (JBi). Donnée intéressante puisque le Roselin cramoisi a très probablement niché sur le col du Lautaret en 2009 (Zabardi *et al.*). L'oiseau n'a pas été revu le lendemain mais une nouvelle nidification dans le secteur n'est pas à exclure...

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* – NMH, commun – 454 données

Construction de nid le 7/01 à Cervières (JPN), puis des jeunes le 21/04 à Saint-Chaffrey (SMe), le 2/05 à Cervières (JPN), le 28/06 à Puy-Saint-Pierre (JPN), le 3/07 dans le bois des Ayes (Anne Loze). Max. : 25 à Névache le 7/08 (Elsa Huet-Alegre), 40 en vallée Etroite le 20/08 (Yann Brillard), 40 à Ceillac le 13/10 (SPe), 100 dans la RNR des Partias le 18/10 (VFi), 50 à Orcières le 15/11 (MCo), 94 à Villar-Saint-Pancrace le 30/11 (EDuc), 50 le 21/12 à Cervières (PBo), 50 puis 60 le 23 et 27/12 à Ceillac (Stéphane Cohendoz), 70 à Saint-Chaffrey et 50 à Monétier le 27/12 (Jimmy Enfru).

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* – M, commun – 38 données

Petite année. Des hivernants notés : 2 à la Freissinouse le 1/01 (Cyrille Poiré), 6 le 5/02 à Vitrolles (EDup), 6 dans les roselières de Curbans à la Saulce (BEm) et 2 à Mison (BEm) le 16/02. Premiers migrateurs notés le 19 et 25/02 à Saint-Bonnet-en-Champsaur (ACI, OAJ), le 26 à Pelleautier et Manteyer (EDup), le 1/03 à Gap (Samuel Talhoët) et Embrun (EDuc, FLe)... Passage printanier peu marqué, avec un « maximum » décelable autour de la mi-mars : 3 à Eygliers le 15/03 (SPe), 1 le même jour à Risoul (LBi), 4 à Saint-Bonnet (OAJ) et 4 à Pelleautier le 17/03 (PSa). Quelques oiseaux (1 à 3) du 24 au 31/03 à Eygliers (JPN,

ADe). Derniers du printemps le 19/04 à Gap (RBe). Premier de l'automne le 19/10 à Villar-Saint-Pancrace (JPN). Max. fin octobre et début novembre : des oiseaux à l'unité à Eygliers, Embrun, Villar-Saint-Pancrace... Total de 6 oiseaux le 5/11 sur les terres agricoles de Villar-Saint-Pancrace (EDuc). Derniers migrateurs fin novembre : 1 à Eygliers le 24 (LBi), 1 le 25 à Villar-Saint-Pancrace, 1 le 27 à Rochebrune (EDuc), 2 à Ventavon le 28 (APa). Un le 4/12 à Crots (GDh), le 12/12 à la Roche-de-Rame (GDh), quelques oiseaux à Mison à partir du 15/12 (MDa, PNa).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* – NM, commun – 103 données

Toute petite année. Seulement dix sites occupés dans le département en 2019. Premiers migrateurs le 19/04 à Champcella (JPN), puis le 9/05 à Eygliers (LBi). Premiers chanteurs le 10/05 à Prunières (APa, EDuc, GBr). 2 chanteurs à Saint-Laurent-du-Cros le 11/05 (Shamgar Brook), 1 le long de la route du col de Gleize à Gap le 16/05 (GLa).




74. Bruant ortolan, Gap, 20 juin 2019. © MCo

1 à Saint-Martin-de-Queyrières le 30/05 (MMo). Arrivée à priori tardive sur le site traditionnel de l'adret de Saint-Chaffrey et la Salle-les-Alpes, le long de la route du col de Granon, seulement 1 chanteur le 22/05 (JPN), mais au moins 2 chanteurs le 22/06 (JPN), 4 le 26 (VPa), et plusieurs oiseaux jusqu'à fin juillet (JPN). 6 ou 7 chanteurs le long du canal de Rencurel à Villar-Saint-Pancrace où un transport de nourriture est noté le 27/06 (EDuc), seule donnée de reproduction certaine obtenue cette année... 1 chanteur à Névache le 3/07 (Marie Portas), un autre le 20 à Cervières (BDuc). 2 chanteurs le 11/07 sur le plateau d'Herbonne à Châteauroux-les-Alpes (EDuc), ces nicheurs et ceux de Villar-Saint-Pancrace constituant des reliques en vallée... Plus surprenant, un chanteur le 12/07 à l'entrée de Montgenèvre côté français (Olivier Drouard). Derniers chants le 25/07 à Saint-Chaffrey (SMe), derniers locaux le 20/08 au même endroit (RBa). Pas de migrateurs postnuptiaux notés.

Bruant jaune *Emberiza citrinella* – NMH, commun – 696 données

Premier nid en construction noté le 2/04 à Saint-Crépin (JPN). Nourrissage le 26/06 à Névache (Claude Fievet), puis des jeunes au Lautaret le 13/07 (CLaTMi), le 31/07 à Laye (PMi), et encore le 17/08 à Monétier (Stéphane Thomin), les derniers.



35. Répartition altitudinale du Bruant jaune nicheur en 2019

Au plus haut, noté à 2335 m à Molines le 12/07 (Julien Girard-Claudon), à 2340 m à Val-des-Prés le 19/07 (Bernard Anglaret). Les nicheurs les plus bas sont localisés entre 870 et 900 m dans le Guillestrois et également dans le Rosanais avec un chanteur à Moydans, 815 m, le 11/05 (Ginou Weckel). Hors nidification, 20 le 1/01 à Villar-Saint-Pancrace (JPN), belle donnée en plein hiver ; également 20 le même jour à la Freissinouse (Cyrille Poiriel), 30 le 6/02 à Villar (JPN), puis 40 le 17/03 (JPN), 25 le 15/05 à Eygliers (JPC), 60 le 19/12 à Chorges (anonyme).

Bruant zizi *Emberiza cirlus* – NMH, commun – 234 données

Surtout contacté entre 700 et 1100 m dans le Laragnais et le Gapençais ainsi qu'en Haute-Durance, où des nicheurs potentiels remontent de plus en plus fréquemment jusqu'à Briançon et au-delà. Premiers chants le 4/02 à Eyguians (APa), derniers le 8/09 à Gap (AJo). Nombreuses données (129) de nidification possible un peu partout, mais sans suite. Un mâle chanteur le 13/06 à 1630 m à Laye (GLa), un autre le 16/06 à Ancelle à près de 1700 m (GLa), et un à 1530 m à Monétier-les-Bains le 5/08 (Stéphane Thomin). Un oiseau construit un nid le 7/05 à Savournon (GLI). Une seule donnée de nidification certaine cette année : un transport de nourriture le 1/08 à Sigoyer (EDup). Hors période de nidification, noté sur les mêmes sites.

Bruant proyer *Emberiza calandra* – NM, peu commun – 32 données

Noté dans le Laragnais (val de Channe, Upaix, Lazer), dans l'est gapençais et surtout sur le bastion historique de l'espèce dans le département, le sud-Champsaur, en particulier sur la plaine d'Ancelle mais aussi près du col de Manse. Rien en Haute-Durance cette année. Premiers chants le 16/02 à Lazer (APa) avec 6 chanteurs. Des oiseaux cantonnés ou des migrateurs en halte ? Difficile à dire. 1 ou 2 chanteurs réguliers autour du lac de Mison à Upaix, notés du 7/03 (APa) au 11/05 (GLI). Un chanteur sur l'aérodrome de Tallard du 9/05 au 13/06 au moins (LBi). Dans le Champsaur, des chants le 1/05 sur la plaine d'Ancelle (MCo, VCo), le 27/05 à la Rochette (MCo), le 2/06 à Rambaud et la Bâtie-Vieille (JFA), durant tout le mois de juin à Savournon (GLI)... Encore des chanteurs autour du col de Manse fin juin (MCo) : le 27/06 à Forest-Saint-Julien, le 30/06 et 2/07 à la Rochette. Des jeunes au pied du Puy de Manse à la Rochette le 7/07 (EDup) à 1280 m. Le Bruant proyer est imprévisible et peut apparaître tardivement en saison sur certains sites (report de nicheurs ?). Dans le département, il semble se maintenir tant bien que mal sur quelques zones agricoles très ouvertes du sud et du Champsaur, avec toutefois un déclin marqué dans ce dernier du fait de l'extension des cultures de maïs sur ses sites historiques de reproduction (MCo).

Bruant fou *Emberiza cia* – NMH, commun – 333 données

Nicheurs surtout notés entre 1200 et 2200 m dans les massifs internes secs du Briançonnais et du Queyras, mais aussi dans le Dévoluy, le Champsaur et ponctuellement dans le Laragnais à basse altitude. Premier transport de nourriture le 30/05 à la Cluse (VPa). Premiers jeunes le 11/07 à Villar-d'Arène (AAu). Des transports de nourriture notés jusqu'au 29/07 à Ceillac (Olivier Labbaye) et 19/08 à Saint-Véran (Samuel Desbrosses). Hors nidification, visible partout dans les friches, les jardins, les milieux agricoles, notamment en Haute-Durance, dans le Briançonnais, le Gapençais, le Champsaur...

6. Liste des oiseaux des Hautes-Alpes (actualisée 2021)

 : Nicheur /  : Migrateur /  : Hivernant

CC : Très commun / C : Commun / PC : Peu commun / R : Rare / RR : Très rare / E : Exceptionnel
- : sans statut (espèces échappées)

Légende des listes rouges (LR)

 **RE** – Disparue au niveau régional ou national
 **CR** – En Danger Critique d'extinction
 **EN** – En Danger
 **VU** – Vulnérable
 **NT** – Quasi-Menacée
 **LC** – Préoccupation Mineure
 **DD** – Données insuffisantes
 **NA** – Non applicable

Sources listes rouges

PACA : 2020
France : 2016

Espèce		Statut et rareté				Liste rouge		Commentaires
						PACA	France	
Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>				R	LC	LC	
Cygne de Bewick	<i>Cygnus bewickii</i>				E	EN	EN	
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>				E	NA	NA	
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>				E	EN	VU	
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>				PC	LC	LC	Régulier en nov. et printemps, parfois hiver.
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>				CC	LC	LC	
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>				PC	VU	LC	
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>				R	NA	LC	
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>				PC	CR	LC	
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>				R	NA	LC	
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Canard carolin	<i>Aix sponsa</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Canard de Chiloé	<i>Anas sibilatrix</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Canard des Bahamas	<i>Anas bahamensis</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Sarcelle bariolée	<i>Anas versicolor</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>				C	NA	VU	
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>				PC	NA	VU	
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>				R	VU	VU	
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>				RR	NA	NA	
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>				PC	EN	NT	
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>				RR	NA	NT	
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>				RR	NT	LC	
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>				E	NA	CR	
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>				RR	NA	EN	
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>				RR	NA	NA	Serre-Ponçon : 1998, 2019
Harle piette	<i>Mergus albellus</i>				E	NA	VU	

Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>				PC	NA	NT	Nicheur récent (2014)
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>				E	NA	CR	
Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Lagopède alpin	<i>Lagopus muta</i>				PC	EN	NT	
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>				PC	VU	NT	
Gélinotte des bois	<i>Bonasa bonasia</i>				RR	NT	NT	Sous-détectée
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>				PC	NT	LC	
Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>				PC	NT	NT	
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>				RR	NA	LC	
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>				C	NT	LC	
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>				C	LC	LC	
Faisan doré	<i>Chrysolophus pictus</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>				E	NA	DD	
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>				E	NA	VU	
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>				RR	CR	LC	
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>				R	LC	LC	
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>				C	LC	LC	
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>				E	NA	CR	
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>				CC	NT	LC	
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>				RR	EN	VU	
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>				PC	VU	NT	
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>				RR	EN	EN	
Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>				PC	LC	LC	Annuel
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>				R	VU	LC	Quasi-annuel
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>				PC	LC	LC	
Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>				PC	VU	NT	
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>				C	LC	LC	
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>				PC	VU	LC	
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>				PC	VU	LC	
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>				RR	NA	EN	annuelle
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>				E	NT	NT	
Ibis chauve	<i>Geronticus eremita</i>				E	NA	NA	
Spatule blanche	<i>Platalea leucordia</i>				E	VU	VU	Curbans (2016), Serre-Ponçon (2020)

Flamant rose	<i>Phoenicopterus roseus</i>				E	VU	VU	
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>				R	CR	EN	
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>				C	VU	LC	
Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>				R	CR	EN	
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>				RR	CR	EN	
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>				E	NA	CR	1 donnée à Remollon
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>				R	NA	VU	annuel
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>				C	VU	VU	
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>				C	NT	LC	
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>				E	NA	NT	
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>				PC	EN	VU	
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>				C	LC	LC	
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>				PC	EN	NT	régulier
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>				R	NA	LC	
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>				R	CR	NT	
Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>				E	NA	NA	Une donnée historique dans le Champsaur et 2021 à Crots
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>				C	LC	LC	
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>				E	NA	NA	
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>				C	LC	LC	
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>				C	LC	LC	
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>				PC	LC	LC	
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>				E	NA	VU	
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>				C	NT	NT	
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>				E	VU	VU	
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>				R	NA	NA	
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>				PC	NT	LC	
Faucon d'Eléonore	<i>Falco eleonora</i>				E	NA	NA	2 mentions dont une à Serre-Ponçon
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>				PC	EN	LC	
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>				RR	NA	DD	Très rare, mais passe sans doute inaperçu
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>				PC	NT	NT	
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>				RR	CR	EN	
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>				E	NA	VU	
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>				E	NA	CR	Quelques données dans le 05 dont Curbans
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>				PC	LC	LC	

Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>				C	LC	LC	
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>				R	NA	CR	
Outarde canepetière	<i>Tetrax tetrax</i>				E	NT	EN	
Huîtrier pie	<i>Haemantopus ostralegus</i>				E	CR	LC	
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>				E	NT	LC	Dernières obs : 1992, 2005 et 2019
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>				R	LC	LC	
Œdicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>				E	LC	LC	A rechercher au printemps
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>				C	VU	LC	
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>				R	NA	VU	régulier
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>				RR	NA	LC	
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>				PC	NT	RE	Très régulier en montagne
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>				RR	NA	LC	
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>				PC	EN	NT	
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>				E	NA	NT	
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>				E	NA	LC	
Tournepierre à collier	<i>Arenaria interpres</i>				E	NA	LC	1 donnée dans le 05
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>				PC	NA	LC	régulier
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>				RR	NA	LC	
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>				RR	NA	NA	
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>				R	NA	LC	
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>				E	NA	NA	
Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>				E	NA	NA	
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>				PC	NA	LC	
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>				C	NA	LC	commun
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>				CC	VU	NT	typique des iscles de la Durance
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>				E	NA	NA	Espèce néarctique notée à Curbans en 1998
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>				RR	EN	LC	
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>				RR	NA	DD	Noté à Curbans et à Serre-Ponçon
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>				PC	NA	LC	régulier
Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>				E	NA	NA	
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>				RR	VU	VU	
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>				E	NA	LC	
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>				RR	NA	VU	

Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>				E	NA	VU	
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>				PC	DD	LC	Statut inconnu, mais sans doute rare
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>				PC	NA	CR	
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>				RR	NA	DD	Sous-détectée
Bécassine double	<i>Gallinago media</i>				E	NA	NA	
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>				E	NA	NA	1ère donnée le 20.11.20 à Embrun
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>				E	NA	NA	
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>				RR	NA	NT	
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>				E	NA	LC	
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>				E	NA	VU	
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>				CC	VU	NT	
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>				R	NA	EN	
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>				R	NA	LC	
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>				CC	LC	LC	
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>				RR	NA	NA	Sous-détecté
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>				PC	NA	LC	Hivernant et migrateur annuel (Serre-Ponçon)
Mouette pygmée	<i>Hydrocoleus minutus</i>				RR	NA	LC	
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>				E	EN	LC	2 données dans le 05
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>				RR	VU	LC	
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>				E	NA	CR	
Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>				RR	NT	NT	Régulière en migration
Guifette noire	<i>Chlidonia niger</i>				R	RE	EN	
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>				E	NA	NA	
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>				E	VU	VU	
Pingouin torda	<i>Alca torda</i>				E	NA	CR	1 mention à confirmer ~1980 à Serre-Ponçon
Pigeon biset domestique	<i>Columba livia domestica</i>				CC	NA	DD	
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>				R	VU	LC	
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>				C	LC	LC	
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>				CC	LC	LC	
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>				PC	VU	VU	
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>				CC	VU	LC	
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>				E	VU	LC	
Hibou grand-duc	<i>Bubo bubo</i>				PC	LC	LC	Bien implanté localement

Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>				R	VU	LC	
Chouette chevêchette	<i>Glaucidium passerinum</i>				R	VU	NT	
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>				R	LC	LC	Probablement sous-détecté
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>				E	NA	VU	Probablement sous-détecté
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>				C	LC	LC	
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>				RR	EN	LC	Probablement sous-détectée, mais reste rare et irrégulière
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>				RR	NT	LC	Probablement sous-détectée
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>				C	LC	LC	
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>				C	LC	LC	
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>				E	LC	LC	
Martinet noir	<i>Apus apus</i>				CC	NT	NT	
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>				C	LC	LC	
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>				C	LC	LC	
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>				PC	LC	VU	
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>				PC	LC	LC	
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>				RR	NT	NT	
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>				C	LC	LC	
Pic vert	<i>Picus viridis</i>				C	LC	LC	
Pic cendré	<i>Picus canus</i>				-	NA	EN	Présence à confirmer dans le Briançonnais
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>				CC	LC	LC	
Pic tridactyle	<i>Picoides tridactylus</i>				E	NA	CR	Présence régulière à confirmer, 4 données : 1915 (Champsaur), 1970, 1986 (Cervièrès) et 2008 (Briançon). Nicheurs les plus proches en Hte-Maurienne
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>				PC	LC	VU	
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>				C	NT	LC	
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>				C	LC	NT	
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>				E	EN	EN	
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>				C	NT	LC	
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>				PC	NT	LC	
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>				CC	LC	LC	
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>				CC	NT	NT	
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>				E	VU	VU	
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>				CC	LC	NT	
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>				PC	LC	LC	De plus en plus fréquent
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>				CC	LC	LC	

Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>				C	NA	VU	Parfois abondant en migration
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>				CC	LC	LC	
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>				E	NA	NA	Sous-détecté
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>				CC	LC	LC	
Bergeronnette de Yarrell	<i>Motacilla alba yarrellii</i>				RR	NA	NA	Semble assez régulière (mars), mais sous-détectée
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava flava</i>				C	LC	LC	
Bergeronnette flavéole	<i>M. f. flavissima</i>				RR	NA	NA	
Bergeronnette nordique	<i>M. f. thunbergi</i>				PC	NA	NA	
Bergeronnette d'Italie	<i>M. f. cinereocapilla</i>				C	NA	NA	
Bergeronnette ibérique	<i>M. f. iberiae</i>				E	NA	NA	
Bergeronnette des Balkans	<i>M. f. feldegg</i>				RR	NA	NA	
Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i>				RR	NA	NA	
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>				CC	LC	LC	
Cincla plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>				C	LC	LC	
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>				E	NA	NA	
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>				C	LC	LC	
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>				C	LC	LC	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>				CC	LC	LC	
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>				C	NT	LC	
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>				RR	NA	LC	Sous-détectée
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>				CC	LC	LC	Hôte typique des villages et hameaux anciens
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>				CC	LC	LC	
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>				CC	NT	NT	
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>				PC	VU	VU	Pop. relictuelles en vallée (Briançonnais), en déclin
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>				PC	NT	NT	Localisé
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>				CC	LC	LC	
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>				R	NA	LC	rare
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>				CC	LC	LC	
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>				C	LC	LC	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>				CC	LC	LC	
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>				C	LC	LC	
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>				RR	NT	LC	Sous-détecté
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>				PC	LC	NT	
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>				C	VU	NT	

Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>				CC	LC	LC	
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>				PC	LC	LC	Assez méconnue localement
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>				C	LC	LC	Commune, localement abondante
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>				PC	LC	LC	Discrète et méconnue, sous-détectée
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>				RR	LC	NT	à rechercher (Laragnais, Embrunais, Guillestrois)
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>				PC	LC	LC	à rechercher (Embrunais, Embrunais, Guillestrois)
Fauvette des Balkans	<i>Sylvia albistriata</i>				E	NA	NA	
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>				RR	VU	EN	Qqs nicheurs dans le sud du dpt., autrement d'apparition très rare. 1 mention hivernale en Haute-Durance (St-Crépin)
Fauvette sarde	<i>Sylvia sarda</i>				E	NA	LC	1 donnée dans le Champsaur en 1998
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenbaenus</i>				R	NA	LC	
Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>				E	NA	VU	
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>				R	LC	VU	Nicheur probable (Pays Caturige, Briançonnais)
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>				R	NA	NT	Nicheur probable (Guisane)
Locustelle lusciniöide	<i>Locustella luscinioides</i>				RR	EN	EN	Pbmt régulière à Curbans
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>				R	NT	NT	Nicheur probable (Serre-Ponçon)
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>				PC	LC	LC	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>				PC	VU	LC	
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>				R	VU	VU	
Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>				E	NA	NA	
Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i>				RR	NA	VU	
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>				PC	LC	LC	
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>				C	NA	NT	
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>				PC	DD	NT	
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>				CC	LC	LC	
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>				CC	NT	LC	
Pouillot de Sibérie	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>				RR	NA	NA	
Pouillot verdâtre	<i>Phylloscopus trochiloides</i>				E	NA	NA	Potentiellement moins rare qu'il n'y paraît, les nicheurs les plus proches sont à peine plus à l'Est
Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>				RR	NA	NA	A rechercher en oct. Meilleur site : ripisylve du Liou
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>				CC	NT	NT	
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>				PC	LC	LC	
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>				CC	LC	LC	
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>				PC	VU	NT	
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>				C	NA	VU	

Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>				RR	NA	NT	
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>				CC	NA	LC	
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>				CC	LC	LC	
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>				CC	LC	LC	
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>				CC	LC	LC	
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>				C	LC	LC	
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>				C	VU	VU	Se raréfie, en déclin
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>				CC	LC	LC	
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>				RR	RE	CR	
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>				CC	LC	LC	
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>				PC	LC	NT	
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>				C	LC	LC	
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>				CC	LC	LC	Gagne de l'altitude
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>				RR	NA	EN	Devenue rarissime. 1 hivernant à Crots 2019-2020
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>				E	CR	CR	2 données à Ventavon en 1987
Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>				E	EN	EN	Exceptionnelle, y c. sur sites autrefois classiques (sud du dpt)
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>				C	VU	NT	Se maintient en vallée sur quelques sites
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>				RR	CR	VU	Très rare mais régulière sur quelques sites
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>				CC	LC	LC	
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>				CC	LC	LC	
Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>				C	LC	LC	
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>				C	LC	LC	
Crave à bec rouge	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>				C	NT	LC	
Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhonorax graculus</i>				C	LC	LC	
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>				RR	NT	LC	Très rare, surtout noté en mars et oct./nov., notamment dans le Champsaur
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>				PC	NA	NA	Implantée localement (Guillestrois)
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>				CC	VU	LC	
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>				CC	LC	LC	
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>				C	LC	LC	
Etourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>				E	NA	LC	
Etourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>				RR	NA	NA	
Martin triste	<i>Acridotheres tristis</i>				-	NA	NA	Echappé de captivité
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>				PC	LC	LC	
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>				C	LC	LC	Statut à préciser

Moineau cisalpin	<i>Passer italiae</i>				C	NA	LC	Statut à préciser
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>				PC	EN	EN	Localisé, se maintient en vallée sur quelques sites (Baratier, St-Crépin, la Roche de Rame). Bastion dans le Champsaur. Absent du Briançonnais. A rechercher en Vallouise
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>				C	NT	LC	Localement abondant, encore bien présent en vallée
Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>				C	LC	LC	
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>				CC	LC	LC	
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>				PC	NA	DD	irrégulier
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>				C	VU	VU	
Sizerin cabaret	<i>Acanthis cabaret</i>				R	DD	VU	
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>				CC	LC	VU	
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>				CC	VU	VU	
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>				CC	DD	LC	
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>				PC	LC	NT	
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>				CC	NT	VU	
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>				C	VU	VU	
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>				PC	NA	LC	
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>				CC	LC	LC	
Roselin cramoisi	<i>Carpodacus erythrinus</i>				RR	NA	DD	Nicheur occasionnel (Lautaret)
Roselin githagine	<i>Bucanetes githagineus</i>				E	NA	NA	
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>				C	EN	EN	
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>				RR	NA	NA	Probablement sous-détecté en montagne
Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>				E	NA	NA	
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>				PC	VU	EN	
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>				C	VU	VU	
Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i>				RR	NA	NA	Sous-détecté. Qqs hivernants réguliers en Camargue. 1 bagué en 1992 à Montgenèvre (les Alberts), 1 vu en 2013 (Champsaur)
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>				C	LC	LC	
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>				RR	NA	NA	Nicheur occasionnel
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>				R	NT	LC	Rare nicheur vagabond
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>				C	LC	LC	

La faune de la région PACA

Le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est le plus riche et le plus diversifié en nombre d'espèces en France métropolitaine. La région PACA abrite 245 espèces d'oiseaux nicheurs sur 275 espèces recensées en France, 70 % des 143 espèces de mammifères, 80 % des 34 Reptiles, 61 % des 31 Amphibiens, 85 % des 240 papillons de jour et 74 % des 100 libellules.

Le projet

www.faune-paca.org

En janvier 2021, le site <http://www.faune-paca.org> a dépassé le seuil des **9 millions de données** portant sur les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les libellules et les papillons diurnes. Ces données zoologiques ont été saisies et cartographiées en temps réel. Le site <http://www.faune-paca.org> s'inscrit dans une démarche collaborative et mutualiste de mise à disposition d'un atlas en ligne actualisé en permanence. Faune-paca.org est un projet développé par la LPO PACA et consolidé au niveau national par le réseau LPO sur le site www.faune-france.org

Ce projet est original et se caractérise par son rôle fédérateur, son efficacité, sa fiabilité, son ouverture aux professionnels de l'environnement et aux bénévoles. Chacun est libre de renseigner les données qu'il souhaite, de les rendre publiques ou non, et d'en disposer pour son propre usage comme bon lui semble. Il est modulable en fonction des besoins des partenaires. Il est perpétuellement mis à jour et les données agrégées sont disponibles sous forme de cartographies et de listes à l'échelle communales pour les acteurs du territoire de la région PACA.

Faune-PACA Publication

Cette publication en ligne Faune-PACA publication a pour ambition d'ouvrir un espace de publication pour des synthèses à partir des données zoologiques compilées sur le site internet éponyme www.faune-paca.org. Les données recueillies sont ainsi synthétisables régulièrement sous forme d'ouvrages écrits de référence (atlas, livres rouges, fiches espèces, fiches milieux, etc.), mais aussi, plus régulièrement encore, sous la forme de publications distribuées électroniquement. Faune-PACA Publication est destiné à publier des comptes-rendus naturalistes, des rapports d'études, des rapports de stage pour rythmer les activités naturalistes de la région PACA. Vous pouvez soumettre vos projets de publication à Amine Flitti, rédacteur en chef de la publication amine.flitti@lpo.fr.

Faune-PACA Publication n°110

Édition :

LPO PACA
Villa Saint-Jules
6, avenue Jean Jaurès
83400 HYERES

Tél : 04 94 12 79 52 • Fax : 04 94 35 43 28
Courriel : paca@lpo.fr • Web : paca.lpo.fr

Directeur de la publication : Amine FLITTI

Rédacteur en chef : Amine FLITTI

Comité de lecture du n° 110 : Amine FLITTI & Thomas GIRARD.

Administrateurs des données faune-paca.org : Amine FLITTI & Thomas GIRARD.

Photographies couverture : photo 1 une Mouette mélanocéphale, un Harle bièvre et une Échasse blanche © Steeve Peyron /Photo 2 Jeune Gypaète barbu lâché en 2018 dans les Baronnies © Pascal Saulay

ISSN en cours

La reproduction de textes et d'illustrations, même partielle et quel que soit le procédé utilisé, est soumise à autorisation.

Afin de réduire votre impact écologique nous vous invitons à ne pas imprimer cette publication. Partenaires techniques et financiers du site www.faune-paca.org sur la page accueil du site.