

Caille des blés

Coturnix coturnix

Information générale, biologie :

En France, il existe deux populations : les migrateurs au long cours et ceux au moyen cours. Les premiers hivernent en zone sahélienne et se reproduisent dans la moitié nord de la France et les seconds hivernent et se reproduisent au Maghreb, mais également dans la partie sud de la France pour la nidification.

Habitat :

La Caille des blés a besoin pour sa sécurité au sol ainsi que pour ses vols nocturnes de milieux ouverts avec une strate herbacée assez haute pour se cacher : champs cultivés, prés, pelouses alpines et parties sèches du bord des marais.

Protection :

Espèce chassable (oiseaux de passage)
Annexe II de la Directive Oiseaux
Annexe III de la Convention de Berne
Annexe II de la Convention de Bonn

Situation sur la zone d'étude :

Sur le fleuve Var, on retrouve cette espèce principalement dans le haut Var où elle est nicheuse. L'absence de prés ou de cultures dans la basse et moyenne vallée explique son absence. Quelques individus sont notés en halte migratoire sur la basse vallée.

Vulnérabilité :

Espèce classée vulnérable sur liste rouge régionale PACA.



Caille des blés
© Ron Knight CC BY 2.0

Évolution des populations

- ▶ En France, les effectifs sont fluctuants d'une année sur l'autre, dû à la détérioration des milieux, à la pression de la chasse, à la sécheresse dans les zones d'hivernage, etc.
- ▶ En PACA, les tendances sont les mêmes que celles constatées en France.
- ▶ Sur le fleuve Var, l'espèce est régulièrement contactée comme nicheuse dans le haut Var.

HIVERNANT

NICHEUR

MIGRATEUR

Période de présence

jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

Répartition de l'espèce sur le bassin versant du fleuve Var

