

# Cassenoix moucheté

*Nucifraga caryocatactes*

## Information générale, biologie :

Son plumage est brun tacheté de blanc sur le dos et la face inférieure du corps. Le bec est robuste. Le Cassenoix est répandu dans les forêts de conifères des régions boréales et des montagnes boisées d'Europe et d'Asie. Ces corvidés forestiers sont essentiellement sédentaires. Leur distribution est liée à la présence de certains végétaux dont les graines constituent l'essentiel de leur alimentation. Ce sont, en Europe, le Pin aréole et le noisetier.

## Habitat :

En région PACA, le Cassenoix habite les cembraies ou autres forêts plus ou moins mêlées de Pins aréoles, qui s'étendent irrégulièrement sur les versants des Alpes internes, le plus souvent entre 1600 et 2200 mètres d'altitude.

## Protection :

Espèce protégée au niveau national  
Annexe II de la Convention de Berne

## Situation sur la zone d'étude :

Le Cassenoix moucheté niche dans le haut Var. Les quelques individus contactés dans la basse vallée ne concernent qu'un mouvement exceptionnel ayant eu lieu en 2012.

## Vulnérabilité :

Espèce classée en préoccupation mineure sur liste rouge régionale PACA.



Cassenoix moucheté  
© Giuseppe Calsamiglia CC BY-ND 2.0

## Évolution des populations

- ▶ En France, l'espèce est considérée en déclin depuis les années 1970.
- ▶ En PACA, les effectifs de Cassenoix mouchetés semblent stables.
- ▶ Sur le fleuve Var, la population de Cassenoix mouchetés dans le haut Var semble stable.

HIVERNANT

NICHEUR

MIGRATEUR

## Période de présence

jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

## Répartition de l'espèce sur le bassin versant du fleuve Var

