





Coucou ! Moi, c'est Mara, je suis dessinatrice et scénariste de BD, et j'adore les oiseaux.

Depuis 2016, je travaille de temps en temps comme bénévole au centre de la Vaux-Lierre (situé à Etoy, en Suisse), qui recueille les oiseaux sauvages en détresse.



J'ai pu remarquer que cette passion pour les oiseaux m'a rapidement été associée, et on me sollicite régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment pour donner quelques conseils lorsqu'un oisillon en détresse est découvert, situation qui nous est tous arrivée au moins une fois.




Je me suis dit qu'il valait peut-être la peine de faire une petite BD sur le sujet. Et la voici !

Que faire si vous trouvez... UN OISILLON EN DÉTRESSE ?

Par Mara



Première règle fondamentale : **observez avant de le toucher** ! Votre petit oiseau n'est pas nécessairement en danger ! Voici quelques questions à se poser, si vous vous trouvez face à un possible oisillon en détresse !



Est-il plumé ?

A-t-il les yeux ouverts ?

Quelle est sa taille ?

A-t-il l'air vraiment blessé
(sang, plaie) ?

Hm... ..



Voici trois étapes du développement d'un poussin
(avec comme exemple le **moineau**, espèce que l'on rencontre le plus fréquemment, c'est un bon repère et son cas peut s'appliquer à de nombreuses espèces communes comme le merle, la mésange, l'étourneau...)


CAS I

S'il est tout nu façon « chewing-gum mâché »
ou « mini poulet rôti pas cuit »

L'oiseau a entre
1 et 7 jours environ

Besoin d'aide ?

- ☒ oui
- ☒ non
- ☒ peut-être



Il faut savoir
qu'à cet âge-là,
l'oiseau n'a
qu'une chance
infime de
survivre, même
lorsque des
professionnels
s'en occupent...

CAS 2

S'il a quelques plumes qui commencent à sortir de leurs fourreaux et les yeux ouverts

L'oiseau a entre
12 et 14 jours environ

air de punk
ébouriffé

petite queue trop
choupiée qui se forme



pattes qui
font nimp

Besoin d'aide ?



oui



non



peut-être

Les chances de
survie de ce p'tit
gars sont déjà
plus grandes...


CAS 3

S'il est complètement plumé, mais paraît pataud,
semble voler maladroitement, avec les coins du bec
encore bien jaunes voire orange

L'oiseau a entre
15 et 25 jours environ

air « grumpy »
de petit vieux

quoi, ma gueule?



Besoin d'aide ?



oui



non



peut-être

Ce gaillard-là vient
peut-être de tenter
son premier envol !
A moins d'être
visiblement blessé,
cet oiseau n'a
souvent pas besoin
d'aide et les parents
ne sont pas loin.

J'ai trouvé un oisillon
en détresse !
Je fais quoi ?



Je veux
pas qu'il
meure !



Si l'oiseau a visiblement besoin
d'aide, la meilleure solution reste
de contacter un centre
de soins pour oiseaux
proche de chez vous et
de leur confier le poussin !



Mais il arrive parfois que
l'on n'ait pas le choix, et
qu'on doive garder l'oiseau
chez soi, notamment
en attendant de pouvoir
l'acheminer vers
un centre de soins.

grmpf...



Une dernière chose avant de vous décider à
ramasser l'oisillon... **Vérifiez d'abord si le
nid n'est pas loin !** En général, découvrir un
poussin, surtout s'il est très jeune, indique
souvent que le nid est juste sous votre nez !
Ou au-dessus...

En plus, le type de nid et son
emplacement sont **des indices
supplémentaires** sur l'espèce
que vous venez de trouver !

Qui niche où ?



Mais pourquoi retrouve-t'on des oisillons, d'abord ?



Oui parce que bon, ça arrive quand même assez souvent, dites-le !

Pour mon plus grand bonheur !





Si le nid n'a pas été déplacé, endommagé voire carrément détruit, et qu'il est accessible, vous pouvez sans hésiter remplacer le petit dans son nid.



Faites-le rapidement, éloignez-vous, attendez et regardez si les parents reviennent (ça peut prendre de quelques minutes à une bonne demi-heure...)




Si remettre l'oiseau dans son nid est impossible, si les parents ont été tués, si le nid a été complètement détruit, ou que le centre de soins est trop loin et/ou inaccessible pour vous, que vous n'avez pas le permis ou que vous êtes paumé dans un trou perdu, dans ce cas, il est temps de s'occuper correctement de votre petit pensionnaire provisoire !




Voici le kit de base pour bien démarrer

OUTILS



ou




Un bol pour les petits oiseaux (moineaux, rouges-gorges, mésanges)

Un carton (pour les corneilles, par exemple) fermé, et percé de trous




ou




Une ampoule chauffante en céramique (vendue en animalerie)

Un radiateur




Du papier
essuie-tout

ou



Un vieux torchon
de cuisine propre
(mais pas de
coton, ça se prend
dans les pattes !)



ou



Une paire de
pincettes
(plastique ou métal)
aux pointes pas
trop effilées

Un bâton
de glace
propre


NOURRITURE DE BASE

Le mot d'ordre est **PROTEINES !!!**


Valable pour les espèces comme
le moineau, la mésange, l'étourneau, le merle, les corvidés




Les vers de
farine (on les
trouve en
animalerie)




De la viande
hâchée de boeuf
MAIGRE
(ex : coeur)



De la pâtée pour chat
(si possible diététique,
achetée chez le véto)
au poulet ou au boeuf
(mais ça leur donne la
diarrhée un peu...)



Du jaune d'oeuf
cuit (oeuf dur
émietté en tout
petits bouts).
Le jaune cru,
ça colle.



Les croquettes pour chien et chat sont souvent beaucoup trop salées et grasses. Il en existe des pas trop mal, diététiques et bien protéinées, mais ultra-chères, en vente chez le véto, pas en grande surface.




Le lait et le pain sont à proscrire absolument ! Les oiseaux ne digèrent pas le lait, et le pain n'apporte aucun nutriment.



Un conseil : **VARIEZ LES REPAS !** Dans certains centres, les soigneurs alternent un repas vers de farine, un repas steak haché/coeur, un repas croquettes pour chat imbibées d'eau. Cela évite les carences !

Marche à suivre



Une fois le piaf installé dans son nouveau petit berceau, il va falloir le nourrir, entre 2 et 6 fois... par heure !




Pffff, quel boulot !




Heureusement qu'il fait ses nuits !

Plus l'oiseau est jeune, plus il mangera souvent !

Sachez donc que ce sera un boulot à plein temps, de 7h à 19h. Vous ne pourrez pas laisser l'oiseau tout seul la journée chez vous, le nourrir une fois le matin et une fois en rentrant le soir. En faisant ainsi, vous le condamnez.



Coucou poussin !
je suis rentrée !
... Ah... Meeerde...



Réfléchissez bien à vos disponibilités, et à celles de vos proches qui pourraient peut-être prendre le relais.

Comment ça se nourrit, un oisillon ?!

1



Tout d'abord, si vous avez opté pour les vers de farine achetés vivants, **congelez-les**, cela les tuera et vous pourrez les garder plus longtemps (on sait jamais, et franchement, frit, c'est pas dégueulasse en apéro. Oui, j'ai essayé).

2




Ensuite, pour une demi-journée de nourrissage, prenez une petite poignée de vers gelés, mettez-les dans une passoire et passez-les sous l'eau chaude pour les décongeler et les humidifier, ce qui constituera un apport en eau suffisant pour l'oiseau.

3



Coupez les vers en deux pour les plus petits oiseaux comme les moineaux ou les mésanges ! Et pour la viande, coupez de toutes petites lanières. N'oubliez pas d'humidifier la viande aussi !

4



Saisissez les morceaux de nourriture avec les pincettes, dans le sens de la longueur. Ce sera plus simple pour l'oisillon de les avaler !




Les tout petits oiseaux sont en général faciles à nourrir, ils ouvrent le bec instinctivement dès qu'ils sentent une présence au-dessus d'eux.

Coucou !



Fastoche, quoi...



Souvent, les oiseaux plus âgés refusent d'ouvrir le bec. C'est tout à fait normal, ils ne sont pas bêtes, ils ont grandi, tout simplement !



Il suffit parfois de caresser doucement les commissures, pour qu'il ouvre le bec par réflexe.



S'il est toujours réticent (les moineaux sont particulièrement têtus), prenez l'oiseau dans votre main, ouvrez son bec de force, en y glissant vos ongles, puis donnez la nourriture.



Les oiseaux même très jeunes sont des animaux intelligents.



Une fois qu'ils ont compris que c'est vous leur nouveau parent...



...ils vont ouvrir leur bec d'eux-mêmes, après un, deux, ou trois nourrissages forcés, et vont réclamer dès qu'ils vous verront !




Une chose à ne pas oublier :
qui dit manger, dit digestion,
dit **CACA** ! Eh oui !

Un conseil : un jeune
oiseau en bonne santé
va faire des crottes
enveloppées dans un
espèce de petit sac,
très facile à enlever
dès la sortie et qui ne
tachera rien !



Regardez bien le
comportement de l'oiseau
lorsque vous vous
apprêtez à le nourrir :
s'il se retourne, vous
montre ses fesses
(ce petit malpô!),
préparez-vous, le petit
caca va sortir !



Retirez-le avec de l'essuie-tout, ou une
autre pincette (dans la nature, les
parents se saisissent du **sac fécal** dans
leur bec, pour le balancer loin du nid !)




Cas particulier : la **huppe fasciée**. Ce magnifique oiseau, tout en
grâce et en élégance, cache un pouvoir maléfique : le petit qui se
sent menacé peut projeter un mélange d'excréments et de
sécrétions putrides jusqu'à 4m de distance. Vous voilà prévenu.





Quand petite
huppe fâchée,
elle toujours
faire ainsi !



Quand l'oisillon
ressemblera à ça,
au bout d'environ 15-20
jours, il sera plus
agité, et essayera
même de voler...



Il aura alors atteint
l'âge de se sevrer,
ce qui veut dire qu'il
va commencer à
manger tout seul !






Une chose à ne pas oublier :
qui dit manger, dit digestion,
dit **CACA** ! Eh oui !

Un conseil : un jeune
oiseau en bonne santé
va faire des crottes
enveloppées dans un
espèce de petit sac,
très facile à enlever
dès la sortie et qui ne
tachera rien !



Regardez bien le
comportement de l'oiseau
lorsque vous vous
apprêtez à le nourrir :
s'il se retourne, vous
montre ses fesses
(ce petit malpô!),
préparez-vous, le petit
caca va sortir !



Retirez-le avec de l'essuie-tout, ou une
autre pincette (dans la nature, les
parents se saisissent du **sac fécal** dans
leur bec, pour le balancer loin du nid !)




Cas particulier : la **huppe fasciée**. Ce magnifique oiseau, tout en
grâce et en élégance, cache un pouvoir maléfique : le petit qui se
sent menacé peut projeter un mélange d'excréments et de
sécrétions putrides jusqu'à 4m de distance. Vous voilà prévenu.




Quand petite
huppe fâchée,
elle toujours
faire ainsi !



Quand l'oisillon
ressemblera à ça,
au bout d'environ 15-20
jours, il sera plus
agité, et essayera
même de voler...



Il aura alors atteint
l'âge de se sevrer,
ce qui veut dire qu'il
va commencer à
manger tout seul !



Vous pouvez petit à petit cesser de le nourrir à la main, et commencer à lui mettre des vers et quelques graines pour oiseaux sauvages dans une petite coupelle, ainsi que de l'eau, donnée dans un tout petit récipient, type couvercle de bocal.
ATTENTION ! L'oiseau pourrait se noyer dans un récipient trop profond !

Surveillez régulièrement
mais **DERANGEZ-LE**
LE MOINS POSSIBLE !!!

Attention : votre oisillon reste un animal sauvage. Il est fort possible que vous vous y attachiez. Mais n'allez surtout pas lui faire des caresses, des câlins. En agissant ainsi, vous risquez d'habituer trop votre oiseau à la présence humaine.



De plus, il est illégal de garder un animal sauvage chez soi, même s'il s'agit d'un simple moineau !

Si vous intervenez le moins possible, n'interagissez avec l'oiseau que pour le nourrir, il ne sera pas imprégné par l'homme et pourra être relâché.

Si vous faites correctement les choses, en admettant que vous soyez obligé de garder l'oiseau chez vous quelques jours, il se passera un déclic, triste mais nécessaire.

Jour 3-4

Maman !



Deux semaines plus tard...

AAAAAAAAHHH !



L'oisillon, au départ, semblera attaché à vous. Puis plus les jours passeront, moins vous aurez à le nourrir, et donc à interagir avec. Et presque du jour au lendemain, l'instinct prendra le dessus, et l'oiseau aura peur de vous.

FELICITATIONS !
L'oiseau est alors prêt à être relâché !



Et ça, c'est un moment que vous n'oublierez jamais, croyez-moi !

CAS PARTICULIERS *

* (sous-entendu 'surchiants à nourrir, à refiler à des pros direct')



Penchons-nous maintenant sur des espèces d'oiseaux qui demandent des soins plus particuliers que les autres...

Hiboux et chouettes

Comment les reconnaître?
C'est simple, c'est une histoire d'aigrettes....

Pas d'aigrettes ?
Chouette !




Petite chouette effraie


Aigrettes ?
Hibou !



Petit hibou moyen-duc



Placez le rapace dans un carton fermé (et troué !) ou recouvert d'une serviette. Un oiseau dans le noir est un oiseau qui stresse moins ! N'oubliez pas qu'ils sont nocturnes, donc le noir, ils kiffent !




Ne leur donnez que de la viande !
Si possible, de l'émincé ou du cœur
de bœuf, très protéiné et maigre,
coupé en fines lanières !

Prenez des gants !
Ils ne vous attaqueront
pas avec le bec, mais
avec leurs serres !
C'est aussi pour éviter
une éventuelle imprégnation
de l'homme...



D'expérience personnelle au centre de soins, les ef'fraies
reçues en âge de se sevrer, je m'en méfie. Elles vous
accueillent sur le dos, en soufflant, les serres en avant,
prêtes à vous arracher la gueule, même si c'est la
2376542837^{ème} fois que vous les nourrissez... Breeeef...



C'est pour
qui le bon
miam miam ?



100% vécu !

T'approches pas
connasse, ou j'te
che-tran !

WOUAAIII !!!



SA MERE !



J't'avais
prévenue,
hahaha !



Dans la catégorie "chiants à nourrir, mais je les aime bien quand même", passons maintenant à une espèce injustement mal-aimée, et très commune...

Les pigeons

"Mon Dieu, c'est quoi ce machin dégueulasse ?"



Oui, alors cette espèce de patate flasque avec des poils jaunes ridicules, c'est un pigeon. Ils sont moches. Très moches. Mais tellement choupi à la fois. C'est indescriptible.




Dans la nature, les parents pigeons régurgitent dans le bec de leur petit, et remplissent leur jabot (une poche située en amont de l'estomac) avec une espèce de purée laiteuse de graines broyées.



Pour reproduire au mieux cette technique il vous faut :




Des céréales en poudre pour bébé sans lactose ou du Nutribird, préparation spéciale pour oisillons de compagnie



Une seringue, sur laquelle vous fixerez un embout en plastique courbé d'environ 4-5cm de long (au centre, on les fabrique à partir des petits tuyaux qui font des bulles dans les aquariums !)




De l'essuie-tout, parce qu'il va s'en foutre partout, le bougre.




Mélangez de la poudre à préparation avec de l'eau tiède, jusqu'à obtenir une pâte lisse et pas trop liquide.

Maintenez l'oiseau d'une main, tout en tirant son cou vers le haut et l'embout courbé vers le bas : cela peut éviter un étouffement... Il ne faut pas hésiter à l'enfoncer très profond !



Il suffit de jeter un oeil sur le jabot. S'il paraît vide, il est temps de le nourrir !

15 à 20 ml de préparation peuvent être donnés (1 à 2 seringues entières) environ une fois toutes les deux heures. Attention à ne pas le nourrir trop souvent, la nourriture peut pourrir dans le jabot !




L'astuce du pro !

Si au bout de quelques heures le jabot ne se vide pas, il suffit de donner une à deux gouttes de vinaigre de pomme bio au pigeon !



Mélange de
graines



Quand l'oiseau atteint presque sa taille et son apparence d'adulte (à part des yeux très noirs, signe qu'il est encore petit), il sera en cours de sevrage et vous pourrez le nourrir moins à la main, et lui donner un mélange de graines dans son carton.

Dans la catégorie "surchiants à nourrir", la palme est remportée par...




Les martinets




Vous savez, ces machins qui ressemblent à des hirondelles, mais en fait non, qui font PIIIIII au-dessus de vos têtes les soirs d'été...

Alors le petit martinet est souvent trouvé au sol. Mais s'agit-il vraiment d'un petit ? Oui parce qu'un martinet à terre peut être un adulte.



Il faut savoir que le martinet ne se pose quasiment jamais dans sa vie, il fait tout en l'air (même crac-crac ! S'envoyer en l'air, il connaît, quoi)




Tombé à terre, il aura une peine folle à redécoller, même adulte. Donc un martinet qui se plante est un martinet quasi condamné !



Alors, jeune ou adulte ? Voici comment différencier un petit d'un adulte (cette technique permet aussi de savoir si le petit est prêt à être relâché après un séjour chez vous ou dans un centre).


Jeune martinet
(qui a la dalle)



☒ PAS PRÊT

- ailes qui ne dépassent pas la queue
- poids en-dessous de 40 grammes

Martinet adulte (ou jeune assez âgé et assez gros pour être lâché)



☒ PRÊT

- ailes qui dépassent la queue d'au minimum 4,5 cm
- poids au-dessus de 40 grammes




Si vous trouvez un adulte ou un jeune qui semble en pleine forme et qui réunit les conditions nécessaires pour être directement relâché, il suffit de le ramasser et de le lancer en l'air !



Et sinon, on le met où ?

Il est recommandé de mettre le martinet dans une boîte, en suivant un système précis.




Une installation de ce type permet à l'oiseau de ne pas s'abîmer les plumes, ce qui est essentiel pour son vol (vu qu'il fait tout en l'air, quoi.)

Et pour le nourrir, alors ?

Rien de plus simple !

Non je rigole. De ma propre expérience le martinet est un des oiseaux les plus compliqués à nourrir.

Déjà, il n'ouvre pas le bec de lui-même quand on lui présente la nourriture.




On dirait même qu'il n'a pas de bec...

...Sauf quand il l'ouvre (SUPER RARE).



Ouais, ça surprend, un bec de martinet, la première fois.

Niveau nourriture, le mieux, ce sont les **grillons** (car les martinets sont strictement insectivores). On peut aussi donner des vers de farine, même si ce n'est pas recommandé. N'oubliez pas d'humidifier la nourriture !



Grillons (on les trouve en animalerie). Il faut les congeler, puis enlever les pattes.



Vers de farine
(urgence uniquement, mais vous pouvez donner jusqu'à 8 vers à la fois !)

o schlop
o schlop !



Il faudra réussir à lui ouvrir le bec (alors que les commissures sont à peine visibles...) et faire en sorte qu'il vous "tête le pouce". Et là, vous pourrez le feinter en glissant de la nourriture à la place de votre pouce, soit à la main, soit à la pincette. **Mettez des gants !**



Il est aussi recommandé de donner les grillons la tête en bas !
Simple comme bonjour tout ça, hein ?




Cette petite BD touche à sa fin !
Quelques derniers rappels et précisions.

Idées reçues et précisions

L'eau

Donner de l'eau à un oisillon, ou pas ? C'est compliqué. Ne forcez jamais l'oiseau à boire, car dans leur bec, avant l'oesophage, se trouve un trou, la trachée, et une seule goutte suffit à noyer l'oiseau et à le tuer. Vous pouvez déposer quelques gouttes sur les commissures, ou simplement imbiber d'eau toute forme de nourriture que vous lui donnerez.



Mort subite de l'oisillon

Malheureusement, cette situation est très courante. Même dans les centres, où les soins sont constants et de qualité, un oiseau sur deux va mourir subitement, alors qu'il semblait péter la forme. Même si vous avez tout bien fait, c'est normal. Il s'agit vraisemblablement de sélection naturelle. Ne vous culpabilisez pas.

JOUR 3

pleine forme



JOUR 4

mort...



Les croquettes pour chien et chat

Les croquettes pour chien et chat, à moins qu'elles ne soient de très bonne qualité (achetées chez le véto, type "chaton", "chiot" ou "diététiques" pas grasses, peu salées et donc à trouze mille balles le kg) sont à éviter. Et des chips ? Vous donneriez des chips à votre bébé, là comme ça ? Non ? Eh ben voilà.



* (même si, oui, les corneilles sont des vraies poubelles capables de digérer n'importe quoi ou presque...)

Le lait

Le lait est à proscrire. Les oiseaux n'ont pas les enzymes nécessaires à la digestion du lactose. Mais beaucoup de gens continuent de donner du pain trempé dans du lait...



Le pain

Le pain n'est pas bon pour les oiseaux, du tout ! Y compris les canards ! Déjà, ce n'est pas nutritif. Et ça gonfle dans leur estomac et peut provoquer tout un tas de maladies. En gros, vous donneriez des bouts de carton humide à votre bébé ? Non ? Ben là c'est la même chose.



Le pain

Le pain n'est pas bon pour les oiseaux, du tout ! Y compris les canards ! Déjà, ce n'est pas nutritif. Et ça gonfle dans leur estomac et peut provoquer tout un tas de maladies. En gros, vous donneriez des bouts de carton humide à votre bébé ? Non ? Ben là c'est la même chose.



L'odorat des oiseaux

La plupart des oiseaux ont un odorat **POURRI** ! La légende raconte que les parents d'un oisillon refuseraient de s'occuper d'un rejeton touché par vos sales pattes. Ce n'est pas vrai ! Les oiseaux ont un odorat, mais pas de **flair** ! Nuance !

Hmm ! Ça sent bon la mousse au chocolat, dis-donc !



Euh....



Et voilà ! J'espère que ces quelques pages vous auront été utiles et que vous en avez apprécié la lecture !



Maintenant, vous avez les bases nécessaires pour vous occuper d'un oisillon en détresse ! Bon courage !

Gary 2017

Merci à :

Maëlle Beck
sauvetagespigeons.wordpress.com

Margaux Deman
www.parole-de-plume.com

Audrey Krommenacker
www.abeilleaplumes.com

Agatha Liévin-Bazin
www.leniddepie.com

Sandy Bozon
www.vaux-liette.ch

Sylvain Rivaud
www.lepithec.com

Nadine Baudelet

Le site Ornithomedia
www.ornithomedia.com

Liste des centres de soin de France :
www.hegalaldia.org/liste-des-centres-de-soins-pour-animaux-sauvages-en-france/

www.lpo.fr/oiseaux-en-detresse/centres-de-sauvegarde

Centre de sauvegarde près de Paris :
www.vet-alfort.fr/web/fr/33-faune-sauvage.php

Licence Creative Commons : CC-BY-NC-ND
Partage autorisé avec crédit des auteurs, sous réserve
de non-exploitation commerciale ni de modification.



Article original publié sur
margauxmaha.com