



## J'ai trouvé une Hirondelle (de rivage, de rochers, rustique, de fenêtre, rousseline)

### A savoir :

Les hirondelles se nourrissent presque uniquement d'insectes capturés en vol. Elles se perchent et se posent fréquemment (contrairement aux martinets). Elles aiment se poser sur les fils aériens. La plupart des hirondelles ne sont présentes qu'entre Mai et Octobre en France.

Les jeunes restent une vingtaine de jours au nid et sont nourris par les deux parents. Les jeunes de cette espèce ne quittent le nid que lorsqu'ils sont capables de voler. A ce stade ils sont encore nourris quelques jours par les adultes et reviennent au nid pour dormir.

### + LES PLUS FRÉQUENTES :



#### Hirondelle de fenêtre :

Niche souvent sur une avancée de toit. C'est un oiseau largement aérien qui se nourrit en plein ciel souvent au-dessus des édifices, et ne vient au sol que pour y récolter la boue nécessaire à la réalisation du nid.

**Identification:** C'est une hirondelle à queue courte. Elle a le croupion blanc pur. La tête, le dos, les ailes et la queue sont noirs.

Les juvéniles ont parfois les côtés de la poitrine grisâtres.

#### Hirondelle rustique :

Très populaire en Europe, elle niche au plafond d'une grange, d'un hangar, d'un garage. Elle chasse au-dessus des champs et des prés et capture des insectes plus gros que les autres hirondelles. L'accès aux bâtiments lui est indispensable pour pouvoir nicher.

**Identification:** Le dessus du corps est noir avec des reflets bleus. Le front et la gorge sont roux. C'est une hirondelle à queue fourchue et très échancrée.

## 🔍 AUTRES HIRONDELLES PRESENTES EN PACA :



### ← Hirondelle de rochers :

Elles construisent un nid de boue séchée sous un surplomb rocheux ou une corniche de bâtiment. Se nourrit d'insectes capturés en vol. Elle réalise des virages adroits en vol, et évolue au ras des falaises, en battant des ailes ou en planant. Elle est présente toute l'année en France.

Photo : Frédéric Guerteau



### Hirondelle rousseline : →

Niche au plafond d'une grotte ou sous un pont. Surtout présente dans le Var et l'Hérault. Capture des insectes en vol. Elle est moins souple que l'hirondelle de fenêtres avec des ailes plus déployées.

Photo : Céline Luciano



### Hirondelle de rivage :

Nichent dans des tunnels creusés dans un talus. Se nourrit de petits insectes volants souvent au-dessus de l'eau. C'est la plus petite des hirondelles.

## 🔍 DISTINCTION AVEC LE MARTINET :



Martinet juvénile



Martinet adulte

### **MARTINET NOIR :**

**Le martinet reste sur le poitrail, l'hirondelle se tient sur ses pattes.**

Le martinet est un oiseau avec une particularité unique : adulte, les ailes dépassent de la queue. Il passe sa vie en vol et ne se pose que très rarement (pour nicher et nourrir ses petits). Il est incapable de décoller du sol.

Il a de très petites pattes atrophiées avec des griffes en forme de serres de rapace. Il est noir avec la gorge et le dessus du bec blanc.

Si vous avez trouvé un Martinet, veuillez vous référer à la fiche correspondante.



### **JEUNES :**

#### **En fonction de l'environnement :**

Présence de prédateurs, sur une route, sur la place du village... si l'animal n'est pas blessé, vous pouvez lui porter secours en le plaçant dans un nid d'hirondelle occupé, peu importe lequel à proximité de l'endroit où vous l'avez trouvé. Les autres parents hirondelles le prendront en charge. Si aucun nid n'est accessible, suivez la procédure de prise en charge ci-dessous.

#### **En fonction de l'état de l'animal :**

Si vous apercevez une blessure apparente et/ou les deux ailes ne sont pas plaquées de manière symétrique contre le corps et/ou l'oisillon ne se tient pas sur ses pattes et/ou vous trouvez les cadavres d'autres hirondelles aux alentours : dans ce cas, l'oisillon est en détresse, suivez alors la procédure de prise en charge ci-dessous.

### **ADULTES :**

Si vous pouvez attraper l'oiseau et/ou si il est blessé, suivez la procédure de prise en charge ci-dessous.

### **PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE :**

**Contactez le Centre régional de Sauvegarde de la faune sauvage au 04 65 09 02 20**

#### **Préparez le conditionnement de l'animal :**

1. Préparez une boîte à chaussure avec des petits trous d'aération.
2. Déposez du papier journal propre au fond et/ou un tissu **non effiloché** (pour ne pas que l'oiseau se blesse avec).

#### **Capturez l'animal:**

1. Munissez-vous d'un petit tissu,
2. Recouvrez-le du tissu afin que la tête soit masquée,
3. Saisissez l'animal, toujours recouvert du tissu, en serrant les ailes contre le corps,
4. Déposez-le dans la boîte à chaussure déjà équipée,
5. Retirez le tissu calmement et fermez la boîte à chaussure,
6. Posez une bouillotte ou une bouteille (de préférence en verre) d'eau chaude contre un des côtés du carton à l'extérieur ou enroulée dans un draps sauf en période de canicule.

#### **Conditionnez l'animal:**

1. Ne lui donnez pas d'eau ou de nourriture tant que vous n'avez pas eu les conseils d'un centre spécialisé.
2. Gardez la boîte dans une pièce tempérée et au calme en attendant les directives d'un centre spécialisé.
3. En période estivale, couvrez le carton d'une moustiquaire ou d'un tissu très fin afin d'éviter que les mouches viennent pondre sur l'animal.





## GESTES A NE PAS FAIRE

- **Ne pas parler, exhiber ou caresser l'animal:** les animaux sauvages sont très stressés au contact de l'homme, ce qui peut aggraver leur état.
- **Ne pas nourrir:** en fonction de son état, l'oiseau n'aurait pas la force de digérer et pourrait en mourir. En interagissant avec sa nourriture, vous pouvez entraver son bon développement (voir ci-dessous).
- **Ne pas donner à boire à l'animal:** les oiseaux ont un trou relié à la trachée sur la langue. Le passage d'un liquide dans ce trou pourrait étouffer l'animal. Le dépôt d'une gamelle d'eau dans le carton peut entraîner des risques d'hypothermie.
- **Ne pas scotcher les ailes:** il est ensuite très difficile de retirer le scotch sans arracher des plumes.
- **Ne pas conditionner un oiseau sauvage dans une cage à barreaux:** l'animal peut se prendre les ailes entre les barreaux et aggraver son état. De plus, l'oiseau est moins stressé lorsqu'il est plongé dans le noir.
- **Ne pas laisser de tissu avec l'animal dans le carton:** le tissu peut être enroulé autour des pattes et de l'aile, ce qui peut aggraver l'état de l'oiseau.
- **Ne pas essayer d'élever un jeune :** Vous pouvez le condamner à la mort suite aux conséquences d'une mauvaise prise en charge (carences dues à une mauvaise alimentation, blessures suite à un mauvais conditionnement, fragilisation des os et du plumage, application de traitements non adaptés pour traiter une maladie...). Les soins à la faune sauvage sont très différents des soins à la faune domestique.



## Quelles sont les conséquences d'un non respect des consignes précédentes ?

Les conséquences du non-respect des consignes précédentes sont nombreuses. Si vous tentez d'élever vous-même un jeune oiseau voici quelques unes d'entre elles:

-> Un mauvais conditionnement: Le plumage s'abîme, les plumes se cassent, l'oiseau se blesse, blessures pouvant s'infecter, des os pouvant se fracturer.

-> L'animal est stressé, il peut mourir d'une crise cardiaque, ne pas s'alimenter...

-> Une nourriture mal adaptée: Cause des carences, le plumage se casse, les os vrillent, le système digestif s'abîme, voir est détruit.

-> De mauvaises manipulations: Vous fracturez un ou plusieurs os, vous le stressez.

-> Un problème d'imprégnation qui peut entraîner un rejet auprès d'un groupe de congénères (ce sont des espèces grégaires, c'est-à-dire qui vivent en groupe).

