



J'ai trouvé un jeune oiseau des jardins

L'oisillon est emplumé, il tient debout et se déplace

A ce stade, pour la plupart des espèces, l'oisillon est en phase d'émancipation au sol. **Un oisillon qui n'est pas en détresse, doit être laissé dans son environnement**, en éloignant les animaux domestiques.

Si nécessaire, déplacez-le à l'abri des dangers. Le fait de toucher un oisillon n'entraînera aucun rejet des parents contrairement aux mammifères.

Il peut ainsi se développer naturellement. Les deux parents viennent régulièrement le nourrir au sol.

Dans le cas d'un danger immédiat, vous pouvez suivre les conseils de la page suivante.

Seul un oisillon en détresse doit être pris en charge, c'est-à-dire s'il présente une blessure apparente et/ou une asymétrie lorsque les ailes sont refermées, et/ou un problème à la patte et/ou vous trouvez la présence des cadavres des deux parents.

Dans le cas où l'un des parents meurt, le second continue le nourrissage. Vous pouvez l'aider en lui mettant à disposition une coupelle d'eau, une coupelle avec des vers de farine (disponibles en animalerie ou magasins de pêche) et une coupelle de petites graines à disposition sur votre rebord de fenêtre.

L'oisillon semble très jeune, n'est pas ou peu emplumé

A ce stade, les oisillons se trouvent normalement au nid et leur présence au sol est accidentelle (chute ou destruction du nid, mort ou rejet des parents etc.).

Installez l'oisillon en hauteur idéalement en le remettant dans son nid ou dans un nid artificiel (voir page suivante) dans les 30 mètres aux alentours, éloignez-vous, et surveillez afin de vous assurer que les parents reprennent en charge l'élevage.



Jeune Merle noir emplumé



Jeunes mésanges charbonnière emplumées



Jeunes étourneaux sansonnet pas emplumés

La faune sauvage et la loi

Certaines espèces d'oiseaux des jardins sont protégées par la loi et leur détention en captivité est interdite sans autorisation. N'hésitez pas à contacter le centre de sauvegarde ou l'ONCFS de votre département pour plus de renseignements.

La création d'un nid artificiel

Pour mettre en sécurité un oisillon, munissez-vous :

- D'un carton **large** à bords hauts
- De papier journal ou sopalin
- D'une corde

1. Ouvrez le carton et placez le sopalin ou le journal au fond,
2. Accrochez la corde en forme d'anse de panier sur le dessus du carton,
3. Placez l'oisillon dans le carton,
4. Pendez le carton au bout d'une branche fine et à 1m30 de hauteur dans un rayon de 30m autour du lieu de découverte.

En l'absence d'arbre vous pouvez déposer ou accrocher le carton à un volet, sur le bord d'une fenêtre, sur un toit,...dans un rayon de 30 mètres autour de l'endroit où vous l'avez trouvé.

Attention le carton doit rester ouvert afin que les parents puissent venir nourrir l'oisillon à l'intérieur.

L'oisillon sortira de lui-même lorsqu'il aura la masse musculaire suffisante pour se mettre à l'abri.

Ne mettez ni eau ni nourriture dans le carton.

En cas de grosses pluies, vous pouvez rentrer le carton pour le ressortir ensuite.



La prise en charge d'un jeune oiseau des jardins

1 Conditionner l'oisillon

Installer l'oisillon dans une boîte en carton dont le fond est recouvert d'essuie-tout propre.

Disposer l'oisillon dans une pièce au calme, à une température de 25 à 28 °C (utilisez une bouillotte ou une bouteille d'eau chaude emmitouflée dans un tissu si besoin).

Les jeunes oiseaux des jardins s'imprègnent très facilement au contact de l'homme ce qui réduit considérablement ses chances de retrouver la liberté. Pour optimiser ses chances de s'envoler en toute sécurité, il est essentiel d'éviter tout contact visuel (faire en sorte que l'oisillon voit le moins possible la présence humaine) et auditif (ne pas parler à l'animal).

⚠ ATTENTION !

N'utiliser ni tissu, ni coton dans lesquels l'oisillon pourrait s'emmêler les pattes et se blesser.

Maintenir l'oisillon à distance des animaux domestiques.

2 Nourrir l'oisillon : Pour les jeunes pigeons et tourterelles, ne pas suivre ce protocole (cf. Fiche pigeon, tourterelle)

Nourrir l'oisillon « à la becquée » (à l'aide d'une pince à épiler en plastique) avec des croquettes pour chat réhydratées dans de l'eau ou des vers de farine ébouillantés. Nourrir seulement en journée.

Lorsque le jabot, en dessous du bec, se gonfle, arrêter le nourrissage et recommencer dès qu'il s'est vidé.

Ajouter une goutte par jour de Tonivit (disponible en clinique vétérinaire) sur la première croquette. Une étape très importante pour limiter les carences.

Alimenter l'oisillon **en petite quantité très régulièrement**.

En fonction de l'espèce, l'alimentation devra varier. Le centre de sauvegarde peut apporter plus de renseignements au 04 65 09 02 20.



⚠ ATTENTION !

Ne donner en aucun cas du pain ni du lait.

Ne jamais nourrir un animal sans l'avoir réchauffé au préalable.

À gauche: Nourrissage d'un jeune Bergeronnette grise

3 Hydrater l'oisillon

L'eau contenue dans l'alimentation proposée ci-dessus représente normalement un apport hydrique suffisant.

En cas de très grosses chaleurs, nous hydratons l'oisillon en déposant délicatement une goutte d'eau sur son bec à l'aide de notre doigt.



⚠ ATTENTION !

Ne jamais verser d'eau directement dans le bec, au risque d'étouffer l'oisillon!

À gauche: Hydratation d'une jeune hirondelle de fenêtre

4 Relâcher l'oiseau

Le développement de la masse musculaire est une étape importante avant de relâcher l'oiseau. Si l'oiseau commence à voler, il faut lui placer des perchoirs en hauteur. Une fois qu'il se perche facilement, il doit voler dans une pièce pendant plusieurs jours. Lorsque l'oiseau vole dans la pièce, on peut lui ouvrir la fenêtre et le laissez partir de lui-même. Les premiers jours, il devrait revenir, il ne faut pas hésiter à lui mettre des graines à disposition et de l'eau. Lorsque la fenêtre est fermée, on doit le signaler à l'oiseau en mettant des images sur la vitre, autrement il risque de rentrer en collision avec cette dernière, ce qui peut lui être fatal.